





658

50382/A



well.

th

PHARMACOLOGIA

S E U

MATERIA MEDICA.



Digitized by the Internet Archive
in 2015

PHARMACOLOGIA

SEU

MATERIA MEDICA,

EXHIBENS

COGNITIONEM MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM ANALYTICAM,

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M. D.

PARS PRIMA.

Editio altera correcta et aucta.

P A R I S I I S ,

Apud LEVRAULT; apud J. J. FUCHS; et apud GABON;
LONDINI, apud Joann. CALLOW;
LIPSIÆ, apud Gerard. FLEISCHER;

M DCCC III.

EX TYPIS GUILLEMINET, NATU MAJORIS.

Nullum exemplar hujus libri genuinum agnosce
nisi manu mea signatum.



CONSPECTUS.

SÆCULUM fere dimidium elapsum est, quo prima *Materiae Medicæ LINNÆANÆ* editio prodiit, in qua auctor lingua elegantius et concisa qualitates et virtutes *Vegetabilium medicas* exposuit. Multæ plantæ, tunc temporis obæuræ, hodie bene cognitæ et exacte descriptæ sunt : Multa simplicia æque ac præparata, tunc penitus ignota, hodie *analisi chemica* exactiori stabilita, et non pauca demum quoad usum et præparationem medicamentorum a *Botanicis, Chemicis, et Medicis practicis* aut nova inventa aut antiqua correctæ fuerunt. Hæc pluribus abhinc annis sedulo et attente in diversis *Europæ regionibus* notare cœpi, sicque gradatim opusculum natum fuit, in quo fixa a vagis, vera a falsis, dubia a certis acutius distinguerentur, verbo, quod *EPICRISIN ANALYTICAM* cognitionis omnium quæ ab antiquis ad hodierna usque tempora circa qualitates, vires, et usum *Medicamentorum simpliciorum, vegetabilium non solum et animalium, sed et mineralium* vere cognita essent, fideliter lingua concisa et magis

severe exacta quam quidem hactenus factum fuit, sub uno intuitu exhiberet. Parvulum hunc librum, ultima quantum licuit lima politum, hic publico iuri trado.

Quod nomenclaturam spectat, Medicorum Europæ hodie vix ullum Botanices; aut Chemiæ adeo ignarum credo, ut non mecum ardentem desideret, nomina plantarum æque ac præparatorum chemicorum pharmaceutica, vaga et sæpe absurda, ex Medicina et scriptis medicis expungere, eorumque loco magis propria et fixa substituere. Idcirco pro vegetabilibus et animalibus nomina Linnæi systematica, pro mineralibus præparatisque chemico-pharmaceuticis nomenclaturam elegantem et omnino philosophicam, ab eximiis Galliæ chemicis nuper confectam, lubens adoptavi; nullusque pronunciare hæsito, essentialem versus perfectionem scientiæ medicæ gradum poni ab æpocha, qua practici ac scriptores medici terminos in arte usitatos vagos relinquere, et linguam magis fixam et rationalem in medicinam introducere cœperint.

Medici qui hodierna, in Historia naturali

Physica et Chemia inventa spernunt et progressus in scientiis hisce, medicinæ vere auxiliatricibus, recenter factos ad Medicinam adplicare recusant, limites artiponere, ejusque perfectionem minime curare videntur.

Ordinem in vegetabilibus et animalibus alphabeticum, utpote practico commodissimum; in mineralibus, systematicum cum alphabetico junctum, secutus sum.

Methodo usus sum conformi eaque compendiosissima, plantam unamquamque sub sequentibus titulis complectens, ordine eodem semper positis, scilicet:

1. Nomen Linnæi systematicum. 2. Pars plantæ usitata. 3. Classis et Ordo sub quibus in systemate Linnæano occurrit. 4. Duratio plantæ et locus ubi naturaliter crescit. 5. Nomen pharmaceuticum s. officinale vulgo usitatum, subjuncto ubique nomine Gallico, Germanico, Anglico, et, ubi illud a latino Linnæano differt, Hispanico. 6. Qualitates physicæ, nec non principium **ACTIVUM** in quo præcipua plantæ virtus residet, ubicumque illud analysi chemica exacta determinatum novi. 7. Virtus medica. 8. Usus internus et ex-

ternus; nec non Forma sub qua communiter propinatur. 9. Dosis. 10. Præparata.

Qualitates physicæ sunt attributa sensibus obvia, ut odor, sapor etc.; Chemia vero analysi principia constitutiva corporum revelat. Ubi qualitates hæ incertæ aut mihi saltem incognitæ erant, nihil potuis quam vaga asserere malui.

Quod virtutes seu vires simplicium spectat, in iis admittendis circumspectionem multo et difficilioremme esse decuit, quam quidem hactenus generaliter a plurimis materiæ medicæ scriptoribus factum fuit: in hisce designandis quoque vocabula vaga, impropria, aut absurda omnia rejeci; fixis solum et propriis memet adstringens.

Erunt tamen fortassis quidam qui me in admittendo et numero et viribus plantarum non satis severum fuisse objeient; sed hos meminisse quæso, me non pro solis Medicis magnarum Europæ urbium, ubi optima quæque et efficacissima facile comparantur, sed pro practicis variorum climatum et regionum et qui sæpe in locis a Metropoli longe dissitis, praxin exercent, librum conscripsisse. Hos non raro,

præcipue dum optimâ ad manus non sunt, aut cum pauperibus consulendum est, plantas adhibere juvat quæ aut facilius aut meliori pretio comparantur, etsi virtute paulo inferiori gaudentes: Præterea pro varietate climatum et regionum latitudinem quandam suppellectilis medicæ commodam non solum sed et necessariam esse nemo qui peregrinatus est, inficias ibit.

Cæterum, quod virtutes plantarum in genere spectat, hic pauca quædam observare placet.

Plures in Europa, præprimis in Anglia, medicos novi, qui usum vegetabilium negligunt, plantasque omnes fere, tribus quatuorve solum exceptis, ex praxi medica sine ulla artis jactura exulare posse persuasum habent. Id quidem, re propius investigata, non miror. Multæ plantæ medicinales hodie, in pluribus regionibus prope Metropolim, præcipue lucri causa, in campis aut hortis coluntur, fumigato optime et irrigato indies solo: Gigantææ sic nascuntur soboles, splendidissima florum varietate superbientes, sed virtute debiles aut effætæ omnino et oleracæ. Quid mirum si Medicus tales plantas in

praxi adhibitas inefficaces inveniat, illasque ut inertes ex thesauro pharmaceutico sine damno proscribendas esse existimet; præprimis si Botanices ignarus easdem in locis natalibus ipse nunquam vidit. Judicium sane longe diversum ferret si easdem plantas in regionibus calidis, in Alpibus aut in locis demum quibuscumque, ubi natura illas sponte producit, proprio anni tempore decerptas examinasset. Hoc quidem adeo verum est ut feles noverim, quæ Valerianam officinalem sibi adeo amicam ut illam continua frietione brevi destruant, æstivo tempore dum effæta radix est, negligenter præcreant et ne quidem intueri dignentur.

Quæ circa vires plurium vegetabilium ratione anni temporis, regionis et soli natalis mox observavi, id quoque valet ratione curæ in iisdem exsiccandis et conservandis adhibitæ. Si plantæ cæterum effeacissimæ ex solo nativo, proprio anni tempore collectæ, in sole male siccantur; vel etiam in umbra sub atmosphæra sicca et sæpius mutata probe siecatæ, dein nudæ insectorum corrosioni aut in vasis vitreis radiis solaribus expositæ adservantur, fre-

quenter omnem omnino virtutem perdunt et pulverem terreum potius quam medicamentum æquant.

In locis præterea, ubi pharmacopolæ legibus nullis adstricti, botanices ignarant ex aliis demum causis, plantas medicinales ipsi nunquam colligunt sed a mulierculis sub nominibus, quibus offeruntur, promiscue cœmunt, sæpe fit, ut planta una pro altera vendatur; aut plantæ recentes in officinis in cumulo diutius asservatæ, fermentantes, corruptæ vel effætæ pro parandis extractis, tincturis, etc., adhibeantur. Taceo fraudem voluntariam qua medicamenta vel inertia vel corrupta aut noxia bonis et efficacibus toties in officinis pharmaceuticis, in opprobrium Medici et perniciem ægri, sponte et impune substituuntur. Hoc cum Valeriana officinali, cum Conio maculato, cum Polypodio filice, cum Arnica montana aliisque multis non semel ipse deprehendi. Inde fit ut Medici cæterum sagacissimi sæpissime decipiantur; et inde non raro circa virtutes medicamentorum saluberrimorum male sceptici, aut omnino increduli evadant.

Quæ de viribus simplicium mox memini,

non quidem ita intelligi velim, quasi causas allatas solas agnoscerem, nullasque præterea alias, cur remedia cæterum præstantissima toties fallant. Probe enim novi, Empiricos et Medicastros frequenter ineffaciæ medicamentorum adscribere, quod propriæ ignorantiae aut judicii defectui potius attribuere deberent. Falluntur sæpe practici, quod simplicia aut inertia aut ambiguae virtutis, vel demum farraginem medicamentorum indigestam promiscue præscribant: Decipiuntur sæpissime, quod medicamenta, licet efficacissima et vere heroica, causa vel natura morbi male cognita, administrent, minime ut videtur conscii, quod ad recte medendum non sufficit ut remedia generi morbi et speciei cuique aut etiam varietatibus quibusdam apprime accommodata sint; sed quod practico præterea in adplicatione remedium ratio primaria habenda sit Habitus ægri, id est, virium naturæ reagentium, utpote a quibus effectus medicamentorum in corpore ægroto præprimis dependent. Hi effectus diversissimi sunt in subjecto forti aut debili, torpido aut morbose irritabili, cachectico aut antea sano; et inde

fit quod remedia cæterum eximia , male aut præpostere adplicata , modo nullos modo tremendos , aut plane exitiales producant effectus. Tyrones hinc facile mecum sentient , quod ad artem salutarem probe exercendam , plura omnino requirantur quam quidem vulgus et ægrorum et practi-
corum sibi communiter persuadet. Non vestitus affectatus , non frons rugosa aut faciei gravitas , nec superficiale demum pulsus , linguæ , urinæ etc. , examen , aut servilis formularum imitatio et præscriptio Medicum constituunt. Ut morbi graviores debellentur , habitus ægri et natura ægritudinis probe investiganda , causæ morborum rite determinandæ , et remedia iisdem ad amussim adplicanda sunt : hæc sedulam post studium multorum annorum , ad lectum ægri attentionem et meditationem , examen profundum , iudicium sanum et ingenium acutissimum sæpe requirunt.

Hæ sunt qualitates quæ Medicum philosophum a practicis vulgaribus , et empiricis (spuriis eheu artis filiis) , linea acuta distinguunt. Hic solus novit , vires multorum medicamentorum magis certas esse , quam quidem Medicastrum sibi vulgo persuadent :

Hic solus, quidquid contra ignari declament, convictus est, multos hodie curari morbos, quos Hippocrates suo tempore curare non potuisset, et gravissima intra paucos sæpe dies debellari mala, quæ ab ignaris non infrequenter vel frustra tentantur, vel per menses et annos misere trahuntur.

Præmissis hisce observationibus quæ Tyronibus satis inculcari non possunt, ad seopum meum redeo.

Qualitates corporum sunt attributa sensibus externis evidentialia, aut analysi chemica eruta.

CHEMIA partes plantarum constitutivas reserans principium eorum activum revelat : *Balsamicum ; oleosum fixum , vel volatile ; principium extractivum , gummosum seu mucilaginosum , resinosum , gummoso aut extractivo-resinosum , etc.*

SAPOR a lingua percipitur et aquæ aut aut salivæ solubilia manifestat :

*Fatua , insipida , aquosa ;
Oleracea , mucilaginosa , pinguis ;
Aromatica , acris , pungentia ;
Calida , fervida , urentia ;
Salsa , acida , austero-styptica ;
Dulcia , amara , nauseosa.*

ODOR nares ferit et volatilia indicat :
Inodora , fragrantia , suaveolentia ;
Ambrosiaca , hircina , graveolentia ;
Fætida , tetra , suspecta.

Fidem quam merentur simplicia , interdum uno alterove vocabulo indicavi ; sic quod potentiam agendi spectat : *Præstantia , eximia , heroica , suspecta , venenata.* De dubiis autem vel omnino inertibus aut nihil dixi, aut signum (?) adjeci.—Cæterum quod nomina virium spectat , per se facile intelliguntur fere omnia , hinc ea hic recensere superfluum esset , præcipue cum eadem ad finem operis recensita sint. Sub *Adstringentibus* vegetabilia principio adstringente seu coriario , chemicis sub nomine *acidi gallici* noto , intelligo ; sub *Stomachicis* ea quæ digestionis vitiatæ mendentur. *Cardiaca* appellavi quæ motum cordis et systematis arteriosi augment ; *Nervina* quæ actionem systematis nervosi languidam erigunt. Sub titulo *Alterantium* medicamenta intelligo quæ statum corporis cachecticum aut cacoehymicum mutare valent ; sub *Alexipharmacis* ea volo quæ venena in ventriculo aut intestinis hærentia aut externe per vulnera adplicata immutant aut destruunt. *Deobstruentia*

denique appello remedia quæ præcipue Physeoniæ abdominali medentur; *Resolventia* e contra ea quæ externe adplicata absorptionem humorum ex tumoribus topicis promovere videntur.

Quod nomina morborum spectat, quos sub usu medicamentorum adduxi, Nosologiam Calleni secutus sum, paucis exceptis. Sub *Ataxia* mobilitatem systematis nervosi morbosam intelligo; sub *Physeonia abdominali* autem obstructionem viscerum non solum sed et infarctum vasorum abdominalium (morbos in praxi hodie frequentissimos) comprehendo.

Menagogum specificum nullum novi præter teriorem subitum. — Ea quæ sub hoc titulo indicavi pharmaca, naturam ad hanc evacuationem dispositam solum juvare videntur.

Signum (?) adjectum dubium indicat an remedium in dato casu revera valeat.

Dosis notata ubique; ubi aliter expressum non est, ætati mediæ convenit.

PRÆPARATORUM non nisi efficaciorum et vere utilium memini sub titulis sequentibus: Aqua (vulgo *aqua stillatitia*); Alcohol (vulgo *spiritus plantæ*); Oleum volatile (vulgo *oleum essentielle* s. *æthereum* s. *stil-*

latitium); Olenm fixum (vulgo *oleum unguinosum* s. *expressum*); Tinctura; Extractum; Succus inspissatus; Conserva; Syrupus. — Composita nulla adduxi, utpote virtutem ab ingrediente simplici maxime activo mutnantia.

Ad finem denique, præmissis indicibus amplis, in opere tali præprimis necessariis, indicem virium adjeci, in quo simplicia juxta virtutes quas in corpore exserunt, ordine alphabetico disposita sunt.

Et hic quidem lectores fortasse plures titulos frustra quærent a me studio, non negligentia, omissos. Cæterum, ut supra monui, nullus sibi persuadeat, morbos simplici et servili adplicatione remediorum sub diversis titulis insertorum curari. Sed hic labor, hic opus: Dona naturæ lectura et instructione acuuntur; defectum eorum nullus liber supplere valet. Medicamenta præstantissima, imo ipsa heroica, sæpe fallunt si promiscue ut quidem vulgo frequentissime fieri solet, nulla aut naturæ aut causæ aut stadii morbi aut habitus ægri, ratione habita administrantur. Specifica, ut vocant remedia, utpote quæ morbo cuicunque fixo, semper et sub

omni temperamentorum et causarum diversitate debellando paria sint, nulla agnosco. Cinchona dialeipyram non semper tollit: Syphilis, sub diversis et morbi et ægri circumstantiis, diversa omnino Hydrargyri præparata poscit; hinc sales et oxyda hujus metalli ad debellandum hunc morbum cæterum efficacissima promiscue, nulla aut ægri aut morbi status ratione habita, adplicata non raro fallunt; et Opium ipsum ex eadem causa spasmus non semper compescit, nec crethismum aut dolorem ubique sedat.

Ultimo demum Elenchum medicamentorum simplicium nuper a sagacissimo medico E. DARWIN in *Zoonomia* sua secundam novam theoriam propositum subjunxi, cujus meritum non discutio, sed practicis philosophis dijudicandum relinquo; sicque opus absolvi. — Intra paucum tempus, si otium favet, Pharmaeopœam Medici practici seu Epicrisin analyticam medicamentorum præparatorum et compositorum quæ a Practicis Europæ, ingenio et probitate jure celebribus, efficacissima inventa novi, publico juri tradere intendo.

DE P O N D E R I B U S

ET MENSURIS PHARMACEUTICIS.

PONDERA pharmaceutica, in diversis Europæ regionibus usitata, sunt :

GRANUM (grj.) G. *un grain*, GE. *ein grau*, A. *a grain* æstimatur pondere æquare granum piperis. Quando igitur pars grani $\frac{1}{2}$ aut gr. $\frac{1}{4}$ præscribitur, granum piperis in duas aut quatuor partes finditur.

SCRUPULUS (ʒj.) G. *un scrupule*, GE. *ein skrupel*, A. *a scruple*, continet grana viginti. In gallia scrupulus continet grana viginti quatuor.

DRACHMA (ʒj.) G. *un gros ou une drachme*, GE. *ein quentchen*, *eine drachme*, A. *a drachm*, *a dram*, continet scrupulos tres aut grana sexaginta; in gallia vero grana septuaginta duo.

UNCIA (ʒj.) G. *une once*, GE. *eine unze*, A. *an ounce*, continet drachmas octo, seu grana 480.

UNCIA SEMIS seu dimidia (ʒʒ.) G. *une demi-once*, GE. *ein loth*, *eine halbe unze*, A. *half an ounce*, continet drachmas quatuor.

LIBRA MEDICINALIS (℔j.) G. *une livre* GE. *ein pfund*, A. *a pound*; continet uncias duodecim, seu grana 5760; — in gallia uncias sedecim.

LIBRA CIVILIS, continet uncias sedecim.

Hæc tamen ponderum divisio, apparenter fere æqualis, pro ratione regionum multum differt. Nam Gallorum æque ac Anglorum libra pondere superat libram Germanorum, ita ut horum libra medicinalis unciiis undecim cum drachmis quinq̃ue et semis Gallorum æquivalet; ac drachmis tribus cum scrupulis duobus et granis $xiii \frac{21}{103}$ levior sit libra Anglorum.

Pondera supra dicta, eadem ratione divisa, ubique fere etiam pro determinandis liquidis inserviunt.

MENSURÆ pro medicamentis siccis, præcipue herbis, usitatæ, vagæ omnino sunt:

FASCICULUS = unc j.

N. B. juxta alios fasciculus æquivalet unciiis sex aut manipulis duodecim.

MANIPULUS = unc β.

PUGILLUS (quantum tribus digitis capi potest) = drachm β vel j.

MENSURÆ pro liquidis usitatæ sunt sequentes :

Cochleare majus = unc β.

Cochleare minus = drach j.

Pinta Anglorum = lib. j seu unc. xvj.

Pinta Gallorum (*Pinte*) = lib. ij seu unc.

xxxii.

Mensura una Germanorum = lib. ij — ii j.

— dimidia (Nœssel) = lib. j β.

Mensuræ quadrans = unc. x — xii.

Congius Anglorum (*gallon*) = libris seu pintis Anglicis viij.

Cantharus Succorum = lib. v ß.

Ex dictis patet, in genere præstare, liquida æque ac sicca, pondere potius quam mensura, præscribere.

A D P L I C A T I O

*Novorum Gallicæ ponderum & mensurarum
pro usu medico-pharmaceutico.*

Mensuræ novæ quæ æstinandis ponderibus in Gallia nuper in usum publicum introductæ fuerunt, communem ducunt normam a gravitate aquæ, certum quoddam volumen (ad datam temperaturam) occupantis: hocce liquidi volumen definitum est ope novarum mensurarum linearium, quæ ipsæ ex magnitudine terræ deductæ sunt, et ad longitudinem arcus meridiani, a polo ad æquatorem ducti, tanquam ad primigeniam unitatem referuntur.

Pondus centimetri cubici aquæ destillatæ, summe condensatæ, quæ ad gradum glaciei quam proxime accedit, *gramma* audit.

Pondus decimetri cubici ejusdem liquidi nuncupatur *kilo-gramma*, quod idem audit ac *gramma* millies repetitum.

Unitates quæ grammæ subdividunt, totidem sunt grammatis fractiones decimales quæ designantur nominibus *deci-gramma*; *centi-gramma*; *milli-gramma*; quasi diceret decima, centesima, millesima pars grammatis.

A grammate ad kilo-gramma fit progressio per unitates pariter decimales; quæ sunt *deca-gramma* et *hecto-gramma*; quorum prius decem grammatibus, posterius centum grammatibus æquivalet.

Unitas decimalis quam dividit *kilogramma*, insignitur nomine *myria-gramma*; cuius interpretatio est *gramma* decies millies adsumptum.

Unaquæque ex prædictis unitatibus prostat metallo confecta, et in usum communem traditur, ponderibus quibuslibet æstimandis dicata; et ut ponderatio facilior redderetur, unicuique unitati suum Duplum, suus Semis adscribuntur.

Quæ cum ita sint, finit series haud interrupta novorum ponderum, quorum valores partibus libræ et semi-libræ consignatos et veritati proximos subministrat tabula sequens.

Duplum myriagramma = libris 40.

Myriagramma = libr. 20.

Semi-myriagramma, aut 5 kilogrammata = libr. 10.

Duplum kilogramma = libr. 4.

Kilogramma = libr. 2.

Semi-kilogramma, aut 5 hectogrammata = libr. 1.

Duplum hectogramma = unciiis 6.

Hectogramma = unc. 3.

Semi-hectogramma = unc. $1\frac{1}{2}$.

Duplum decagramma = unc. $\frac{2}{3}$.

Decagramma = unc. $\frac{1}{3}$.

Semi-decagramma = unc. $\frac{1}{6}$.

Duplum gramma = drachm. $\frac{1}{2}$.

Gramma = drachm. $\frac{1}{4}$.

Semi-gramma = granis 9 ad 10.

Duplum decigramma = gran. 4.

Decigramma = gran. 2.

Semi-decigramma, aut 5 centigrammata = grano 1.

Centi-gramma = grani $\frac{1}{5}$.

Præcedentem tabulam vel leviter perlustranti facile patebit, pondus 100 librarum in veteri systemate vulgo dictum centenarium (*quintal*) idem esse cum quinque Myriagrammatibus; unam libram parem esse quinque hectogrammatibus; unciam quam proxime accedere ad trientem hectogrammatis; drachmam ad quatuor grammata; granum ad semi-decigramma aut quinque centigrammata.

His probe intellectis, nullam difficultatem facessere potest conversio veterum mensurarum in novas. Hæc operandi ratio nullas medicis aut pharmacopolis moras cauēabit. Sat erit hic loci nonnulla referre exempla

conversionum quæ magis communiter occurrunt :

Quadrans grani = 1 aut 2 centigramm.

Semi-graum = 3 centigramm.

Gramm = 5 centigrammatibus.

2 Grana = 1 decigrammati.

10 Grana = 5 decigrammatibus.

20 Grana = 1 grammati.

30 Grana = 1 $\frac{1}{2}$ grammati.

40 Grana = 2 grammatatibus.

1 Drachma = 4 grammatatibus.

1 Uncia = 3 decagrammatatibus.

1 Libra = 5 hectogrammatatibus.

Ex tabula præcedenti patet summam decigrammatum prodire, quando granorum numerus per numerum 2 dividitur, hanc aliter quam in novis monetis Gallicis decimorum (*décimes*) summa obtinetur, dum per 2 dividitur numerus assium Gallicorum (*sous*).

Hinc concluditur grana 4; 6; 8 deci-grammatibus 2; 3; 4 : — et grana 5; 7; 9 decigrammatibus 2 $\frac{1}{2}$; 3 $\frac{1}{2}$; 4 $\frac{1}{2}$ coæquari.

Cæterum nullus existimet, rem ad vivum reseccandam esse, atque, quando præscribuntur *ex. gr.* grana duo tartari stibiati aut drachmæ duæ sulfatis magnesiæ vel uncia duæ aquæ aut tincturæ cujuscunque, inenumbere curam, doses consignandi modo qui strictissime cum novis ponderibus conveniat; neminem enim

fugiet, nec plus nec minus prolixa fore medicamina, si in dosi deficient aut abundant nonnullæ portunculæ aut corpuscula, quorum præsentia aut absentia vix indicatur trutina perfectissima. Id solum curandum, ut doses consignentur numeris rotundis; hosce autem et quidem solos indicat præcedens tabula.

Quicumque forte doses ponderibus libratis novis numeris exactissime expressas noscere desiderat, illi sequentes observationes servient.

In superiori tabella legitur, duo grana æquivalere uni decigrammati; revera autem unum decigramma continet duntaxat granum unum cum fractione $\frac{89}{100}$; dum ponitur ergo unum decigramma pro duobus granis in dosi quæ adhiberi intenditur, fractio $\frac{1}{25}$ deficit, quæ omnino negligi potest.

Pariter quando dicitur drachmam unam æqualem esse grammatibus quatuor, excipitur numerus factus $\frac{1}{22}$; quatuor quippe grammata unam conficiunt drachmam cum tribus granis et grani triente; hinc, dum præscribuntur quatuor grammata pro una drachma, dosi geminæ additur fractio $\frac{1}{22}$.

Ubi uncia pro tribus decagrammatibus accipitur, ex legitima dosi detrahitur pars $\frac{1}{51}$.

Porro quisque facile conveniet rem esse plane indifferentem, si pro grano uno

pars $\frac{18}{20}$ aut $\frac{19}{20}$ grani; pro drachma una, drachma cum tribus aut quatuor granis, (75 grana pro 72 granis); pro uncia una, uncia minus granis undecim (565 grana pro 576 granis) sumantur. Hi sunt tamen limites ultra quos non excurrunt errores quos admittit computandi ratio quæ in superiori tabella proposita fuit.

Insuper considerari meretur, in novo ponderum systemate medicis offerri modum doses accomodandi ætati et temperamentis, longè commodiorem, quam in veteri systemate; calculus enim decimalium, longe facilius quam calculus vulgaris obviam reddit rationem quam habent unitates ejusvis ordinis ad unitates ordinis superioris. Ex. gr. non ita facile videtur quid sint 20 grana ad unciam; contra, quid sit gramma hectogrammati comparatum, sine mora percipitur, nomine quo signatur unitas ordinis superioris, indicante illam esse unitatem ipsissimam ordinis inferioris centies repetitam.

Quod mensuras capacitatis pro liquidis mensurandis attinet, mensuræ novæ veteribus in præscriptionibus formularum commodè substitui possunt methodo sequenti:

LITRUM (*le litre*) aquæ destillatæ æquivalet pintæ Parisinæ (*pinte*) sen libris duabus et drachmis quinque gallicis veteribus; et pondere æquat kilogramma.

SEMILITRUM (*demilitre*) æquivalet libræ uni cum drachmis duabus et semis (*chopine*).

DUPLUM DECILITRUM æquivalet unciiis sex cum drachmis duabus (*quart de pinte* ou *demi-septier*) et pondere æquat duplum hectogramma.

DECILITRUM æquivalet unciiis tribus cum drachma una et pondere æquat hectogramma.

SEMI-DECILITRUM æquivalet uncix uni cum drachmis sex (*gobelet*; *cyathus*), et pondere æquat quinque decagrammata.

N. B. *Litrum* continet circiter 50 pollices cubicos veteres; hinc *duplum centilitrum* (*double centilitre*) respondet pollici cubico, seu drachmis quinque, seu cochleari majori aquæ destillatæ.

Hic gradum sisto atque præsentibus observationibus finem impono; quæ si nulla ex parte, ut spero, claudicent, medicis offerunt maximam facilitatem mensuras et pondera vetera in nova commutandi.

C A N O N E S.

1. *RADICES* sero autumno, postquam folia canlesque emarcnere, vel hyeme aut primo vere antequam folia germinant, effodiantur. In delectu radicum, spongiosæ, farinacæ, cariosæ, imprimis vero exsucco cortice tectæ, rejiciantur; Bonitatem enim radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus. Quæ principiis aromaticis et resinosis præditæ sunt radices, lotionem non purgentur; sufficit, si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur. Prægrandes et succulentæ Radices in taleolos dissectæ, reliquæ quales sunt, cito siccentur, aut loco calido umbroso ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore, siccatae frigido siccoque serventur loco, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vasis clausis, omnes locis umbrosis conserventur. Inquilinæ, tum succulentæ, multum gummosæ, tum etiam subtilibus aut facile avolantibus viribus præditæ, quotannis recenter legantur et arcessantur. Quibus siccatis exigua, recentibus vero multa virtus est, ut Cochleariæ armoraciæ, Iridum, Ari maculati, Scillæ maritimæ, Bryoniæ albæ, illæ opportuna tempestate collectæ, sabulo sicco reconditæ, serventur.

2. *LIGNA* hyberno succidantur tempore, mox findenda. *STIPITES* versus autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scatent, resecantur. *CORTICES* e fruticibus autumnò, ex arboribus adulta hyeme aut accedente vere, dum facillime a ligno secedunt, aut hyeme deglubantur.

3. *TURIONES* gemmæque primo vere, quo tempore turgidulæ sunt et ante explicationem foliorum decerpantur. *HERBÆ* colligantur adultæ cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint: Quæ semper virent, quovis tempore colligere licet; vernum tamen præstat. *FOLIA* colligenda sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simul ac ros, quo noctu canescunt plantæ, solis radiis dissipatus fuerit; decerpantur vero postquam defloruit et antequam semina maturavit planta. *Herbæ* indigenæ quotannis recentes comparari debent; effætæ superstites, si placet, pro sale alcalino herbarum adhiberi possunt. *Exsiccatio* herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso et ab aëre perflato loco, aut lento cantoque fornacis calore.

4. *FLORES*, absque calice et pistillo, sola corolla servata, decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploserint, eo tempore ubi radii solis rorem dissipaverint. *COMA* floris colligenda dum

flos explicari incipit. Siccentur ut herbæ, et quidem quam fieri potest citissime.

5. *SEMINA* colligantur perfecte matura, dum sponte a planta secedunt, antequam excidant, locoque ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo. Quæ capsulas, involucria etc. retinent, ea his munita servantur: Plerumque autem seminum delectus ita instituendus est, ut aquæ immittantur, et quicquid supernatat abjiciatur; quod vero fundum petit iterum siccet. *FRUCTUS* nonnisi maturi decerpantur, dum pericarpia sponte sese aperire incipiunt.

In genere notandum, vegetabilia tempore anni improprio vel ex solo artificiali, non nativo, collecta, aut male siccata, et negligenter conservata effæta sæpissime, aut plene corrupta esse; hinc a medico practico prudenti adhiberi nunquam debent nisi ex solo ubi natura eadem sponte producit, decerpta. *Alpina* ex *Alpibus*, et quæ solum sabulosum aut paludosum amant ex solo sicco arenoso aut ex humido palustri colligenda; eaque probe siccata in locis aut vasis ab accessu radiorum solarium sollicitè conservanda sunt, siquidem virtutes earum in curandis morbis efficaces experiri desideramus.

M A T E R I A

M E D I C A.

I. VEGETABILIA EORUMQUE PRÆPARATA.

A

ACANTHUS MOLLIS. Folia; herba.

CLAS. *Didyn. O. Angiosp. Perennis; Europ. austral.*

OFFICINIS. *Branca ursina.* GALLIS. *Pied d'ours.*

GERMANIS. *Bachrenklau.* ANGLIS. *Smooth bear's
breech.* HISPANIS. *Pie de oso.*

QUALITAS : mucilaginoso.

VIRTUS : emolliens?

USUS : ambusta?

DOSIS :

PRÆPARATA :

ACHILLEA AGERATUM. Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl. Perennis; Europ. austr.*

OF. *Ageratum. A. sweet milfoil, or mandarin.*

QUAL. Odor suaveolens; sapor amaricans, aromaticus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia.

DOS.

ACHILLEA ATRATA. Herba.

OF. *Genipi veri herba.*

QUAL. Odor aromaticus; sapor amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia.

ACHILLEA MILLEFOLIUM. Folia; summitates florentes.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Millefolium*. G. *Millefeuille*. GE. *Schaaſgarbe*.

A. *Milfoil*; *yarow*.

QUAL. In oleo vocatili et extractivo amaro residens; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; leviter stimulans.

USUS *infusi*: dyspepsia; colica flatulenta; hæmoptysis; hæmorrhoids; hysteria; dolor spasmodicus post partum.

DOS. Drach. ij-iiij ad lib. j aquæ in infuso.

PRÆP. Extractum.

ACHILLEA MOSCHATA. Herba.

A. *Musk-smelling milfoil*.

QUAL. Odor moschatus.

VIRT.

USUS.

ACHILLEA PTARMICA. Radix; herba; flores.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Ptarmica*. G. *L'herbe à éternuer*. GE. *Wilde Bertramwurzel*. A. *Common sneezwort*. H. *Achelea ptarmica*.

QUAL. In principio resinoso residens; odor florum nauscous; sapor radicis acris, urens.

VIRT. Errhina; sialagoga.

USUS. (Loco radicis anthemidis-pyrethri) paralysis linguæ; odontalgia.

ACHRAS SAPOTA. Semen; cortex.

CL. *Hexandr. O. Monog.* Arborea; Americ. merid.

OF. *Sapotilla. G. Breypffel-baum. A. Common sapota.*

QUAL. *Seminum* : sapor aeris, amarus. *Corticis* : amaro-stypticus.

VIRT. *Seminum* : diuretica. *Corticis* : stomachica; roborans.

USUS *seminum* : colica nephritica; dysuria. *Corticis* loco cinchonæ : intermittentes.

DOS. *Seminum* : drach. j-ij ad ℥j. aquæ in infuso.

ACONITUM ANTHORA. Radix.

CL. *Polyandr. O. Trig.* Alpina.

OF. *Anthora.*

QUAL. Venenata; sapor acris, amarus.

VIRT. Cathartica; anthelmintica.

USUS.

DOS. *Palveris* : drach. j.

ACONITUM CAMMARUM. Folia; herba.

CL. *Polyandr. O. Trig.* Alpina; Europ. austr.

OF. *Aconitum. G. Aconit; chaperon de moine. GE. Blauer sturmhut; Eisenhütlein. A. Purple Wolfsbane; monkshood. H. Aconito.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; sapor acris; odor nauseosus.

VIRT. Præstantior napello : sudorifica; diuretica.

USUS *extracti* : Rheumatismus chronicus; amaurosis; ulcus rebelle.

PRÆP. Succus inspissatus herbæ recentis junioris (vulgò *extractum*), Gran. j ij.

ACONITUM NAPELLUS. Herba.

CL. & O. præced. Alpina.

QUAL. et VIRT. præced. sed debilior.

N. B. Antidotum ranunculi thoræ?

ACORUS CALAMUS. Radix.

CL. *Halexandr.* O. *Mong.* Perennis; in locis humidis, paludosis.

OF. *Calamus aromaticus*, seu *vulgaris*; *acorus verus*.

G. *Acorus odorant.* GE. *Kalmus-wurzel.* A. *Sweet-acorus*; *sweetflag.* H. *Acoro calamo.*

QUAL. Odor fragrans; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Præstans : stimulans; stomachica.

USUS. Dyspepsia.

DOS. Drach. semis.

PRÆP. Extractum; conditum.

ADIANTHUM CAPILLUS VENERIS. } Her-
 ————— PEDATUM. } ba.

CL. *Cryptogam.* O. *Filices.*

OF. *Capillus veneris.*

QUAL.

VIRT?

USUS præcipuus adianthi pedati pro syrupo capillorum veneris dicto.

PRÆP. Syrupus : G. *syrop capillaire.*

ADONIS VERNALIS. } Radix.
 ——— APENNINA. }

CL. *Polyandr.* O. *Polyg.*

VIRT. Menagoga (PALLAS.)

ÆSCULUS HIPPOCASTANUM. Cortex.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Arborea.*

G. *Marronier d'Inde.* GE. *Wilder kastanienbaum.*

A. *Common horsechesnut.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *extracti vel pulveris* : intermittentes.

PRÆP. Extractum.

DOS. Drachm. j. Extracti in unc. j aquæ cinnamomi,
 cujus gutt. lx. omni trihorio.

ÆTHUSA MEUM. Radix.

CL. *Pent.* O. *Digyn.*

*Perennis ; alpina ;
 Europ. austral.*

OF. *Meum ; meu radix.* A. *Common spignel or band-
 money.*

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso resi-
 dens ; sapor aeris , aromaticus , calefaciens.

VIRT. Stimulans ; emminativa.

USUS. Tertianæ ; asthma pituitosum ; leucorrhœa.

AGARICUS MUSCARIUS.

CL. *Cryptogam.* O. *Fungi.*

In sylvis.

QUAL. Venenata.

VIRT. Cathartica ; sudorifica.

USUS *succi inspissati* : Vulgo ad necandas muscas,

USUS *internus* : Epilepsia ; paralysis à morbis cutis
retropulsis. *Externus* pulveris inspersi : ulcus
malignum ; gangræna.

DOS. Pulveris gran. x—xxx cum aceto pro dosi.

N. B. Pars terræ insidens sola, autumnno col-
ligenda, mundata, siccata, et pulverisata
in vasis probe clausis usui servetur.

AGAVE AMERICANA. Folia.

USUS *decocti* : Syphilis.

DOS. Unc. j ad libr. j aquæ, quotidie.

AGRIMONIA EUPATORIA. Herba.

CL. *Podocand.* O. *Digyn.* Perennis.

OF *Eupatorium veterum*; *agrimonia*. G. *Aigremoine*.

GE. *Odermennige*. A. *Common agrimony*.

QUAL. Substyptica.

VIRT. Subadstringens.

ATUGA PYRAMIDALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Biennis ; in nemorosis
siccis.

OF. *Herba consolidæ mediæ s. Bugula*. G. *Bugle
pyramidale*. A. *Mountain bugle*.

QUAL. Amara ; substyptica.

ALCEA PURPUREA. Flores.

CL. *Monadelph.* O. *Polyandr.*

USUS chemicus, ut eximium reagens.

ALCEA ROSEA. Flores.

CL. *et* O. *præced.* Perennis ; Asiatica ; hortensis

OF. *Malva arborea*. GE. *Stockrosen*. A. *Common hollyhook*.

QUAL. *Fatua*; *mucilaginousa*.

VIRT. *Involvens*; *emolliens*.

USUS *infusi* forma *gargarismatis* : *cynanche*.

ALCHEMILLA VULGARIS. *Herba*; *radix*.

CL. *Tetradyn*. O. *Monog*. *Perennis*.

OF. *Alchemilla*. G. *Alchemille*. GE. *Frauenmantel*; *sinau*. A. *Common ladiesmantle*. H. *Alchemila vulgar*; *o pie de leon*.

QUAL. *inodora*; *styptica*.

VIRT. *Adstringens*.

USUS.

ALLAMANDA CATHARTICA. *Folia*.

CL. *Pentand*. O. *Monog*. *Frutex scandens*; *Guiana*; *A. Willow leaved allamanda*.

QUAL. *Lactescens*; *amara*.

VIRT. *Cathartica*; *stomachica*.

USUS *infusi* : *colica pictonum*.

ALLIUM CEPA. *Radix recens*; *succus radicis*.

CL. *Hexand*. O. *Monog*. *Biennis*.

OF. *Cepa*. G. *Oignon*. GE. *Zwiebel*. A. *Common onion*. H. *Ajocebolla*.

QUAL. *Recentis* : *odor peculiaris*, *alliacens dictus*, *volatilis*; *sapor acris*.

VIRT. *Diaphoretica*; *anthelminthica*; *flatulenta*;

aphrodisiaca ; diuretica ; rubefaciens. *Radicis coctæ* : emolliens ; maturans. *Assatæ* : stimulans. *USUS externus succi* : otalgia ; dysecocœ rheumatica. *Radicis* forma cataplasmatidis : phlegmone ; bubo ; varix ani.

ALLIUM SATIVUM.

Radix recens ;
ejusque succus.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Allium*. G. *Ail*. GE. *Knoblauch*. Λ. *Cultivated leek*. H. *Ajo sativo*.

QUAL. In principio acri et paucò oleo volatili residens ; odor alliaceus , volatilis ; sapor acris , subcausticus.

VIRT. Præstans : diuretica ; diaphoretica ; anthelmintica ; rubefaciens ; maturans.

USUS *succi externus* : dysecocœ ; herpes ; clavus. *Radicis recentis , vel succi* : quartana ; dyspepsia ; hydrops ; asthma pituitosum ; scorbutus.

ALOË PERFOLIATA.

—— SPICATA ,

Aliæque VARIETATES.

} Succus extrac-
tivo - resinosus
} inspissatus.

CL. *Hexandr*. O. *Monog*.

Perennis ; Afric. Ind. occid.

OF. *Aloë socotrina* : succus optimus incisione foliorum obtentus in insula *Socotora*. *Hepatica* : vilior expressione in insulâ *Barbadoes*. *Caballina* : pars post expressionem residua. G. Ge. A. *Aloë*.

QUAL. Heroïca : in principio extractivo-resinoso residens; sapor intense amarus, nauseosus; odor nauseosus.

VIRT. Cathartica, intestinum rectum præcipue irritans; stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS *internus* : Obstipatio; pyrosis; dyspepsia; hæmorrhoids suppressa. *Externus* : ulcus putridum; caries; otorrhœa; epiphora gr. j. pulv. oculo inflatum.

PRÆP. Extractum aquosum; tinctura; vinum.

DOS. Succij vel ejusdem extracti aquosi gr. ij; Tincturæ unc. semis—ij. Vini aloët. drachm. ad unc. semis.

ALOËXYLUM AGALLOCHUM (LOUREIRO.) Lignum.

CL. *Decandr. O. Monogyn. Arbor. Cochinchin.*

N. B. Alii hoc lignum ab *Excæcaria agallocha* derivant.

OF. *Lignum aloës S. agallochum verum.*

QUAL. Lactescens; venenatissima; medullitium trunci amarissimum.

VIRT. Inebrians; anthelminthica; excorians.

USUS. Cholera; paralysis.

DOS. Gran. xx.

ALTHÆA OFFICINALIS. Radix; herba.

CL. *Monad. O. Polyand. Perennis; in locis humidis.*

OF. *Althæa. G. Guimauve. GE. Eibisch. A. Marsh-mallow. H. Malvavisco.*

QUAL. Mucilaginoso; insipida.

VIRT. Lubricans; emolliens.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria. *Externus* forma
 enematis vel cataplasmatibus: tenesmus; phlegmone.

AMLICA INDICA. Fructus; pulpa fructus.

Tamarindus Indica. (L.) *Arborea; Ind. orient.*

N. B. Hoc nomen LINNÆI significans: *Arbor
 dactilifera*, improprium et absurdum est.
Vid. Asiatick Researches.

AMMI COPTICUM. Semen.

CL. *Pentand. O. Dygin.* *Ind. orient.*

N. B. An semen *Adiowaen* dictum ex hac planta
 provenit?

Vid. Semen Adiowaen. p. 214.

AMMI MAJUS. Semen.

OF. *Ammi vulgare.* *Annua; Europ. austral.*

QUAL. Leviter aromatica; carminativa.

AMOMUM CARDAMOMUM. Semen.

CL. *Monand. O. Monog.* *Indiæ orientalis.*

Amomum repens. (SONNERAT.)

OF. *Cardamomum minus. G. Cardamome. GE. Kleine
 kardamomen. A. Lesser cardomom.*

QUAL. In oleo volatili residens; sapor acris, fervidus,
 aromaticus; odor gratus, fragrans.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; chlorosis.

PRÆP. Tinctura.

DOS. Pulveris gran. x—xxx. Tincturæ drachm. j—ij.

AMOMUM GRANUM PARADISI. Semen.

OF. *Cardamomum majus s. maximum. G. Amome
 de Madagascar. A. Grains of paradise.*

QUAL. In principio resinoso magis quam oleo volatili residens; sapor urens iustar piperis; odor subaromaticus.

AMOMUM ZINGIBER. Radix.

CL. et O. *præced.* Perennis; Ind. oriental.

OF. *Zingiber s. zinziber fuscum et album.* G. *Gingembre.* GE. *Ingwer.* A. *Ginger.*

QUAL. In oleo volatili et paucio principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, fervidus; odor gratus, subfragrans.

VIRT. Calefaciens; sialagoga; stomachica.

USUS. Dyspepsia; podagra aberrans; tussis stomachica; colica flatulenta; diarrhæa. *Externus*: uvulæ laxitas.

PRÆP. Conditum; tinctura.

DOS Pulv. gran. v—x—xxx, per se vel cum lacte.

Conditi drachm. j—iv. Tincturæ drachm. j—ij.

AMYGDALINUS COMMUNIS. Nuclei.

Varietas. a. sativa: dulcis et amara.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* Arborea; Europ. austr.

OF. *Amygdalæ dulces et amaræ.* G. *Amandes douces et amères.* GE. *Bittere und süsse mandeln.* A. *Sweet et bitter almonds.*

QUAL. In oleo fixo unguinoso residens.

VIRT. Nutriens; involvens; emolliens.

USUS *dulcium*: febres; tussis. *Amararum*: ebrietas; vermes.

PRÆP. Emulsio ex amygdalis dulcibus. Oleum ex dulcibus vel amaris promiscue paratum.

AMYGDALUS PERSICA. Folia; flores re-
centes; nuclei.

G. *Pécher*. GE. *Pfirsichbaum*. A. *Common peach-tree*.

QUAL. *Nuclei*: oleoso-mucilaginosi; odor florum
peculiaris, nauseosus.

USUS *decocti folior*. Hæmaturia; dysuria; nephritis.

PRÆP. Aqua florum.

DOS. Unc. j in lib. ij aquæ ad colat. unc. xvij,
ejusque unc. vj bis die.

AMYRIS ELEMIFERA Resina.

CL. *Octand*. O. *Monog*. Arborea; Americ.

OF. *Gummi Elemi*.

QUAL. Color pellucidus, flavescens.

VIRT. Resolvens; stimulans.

USUS *externus* in emplastris et unguentis: tumores;
punctura.

AMYRIS KATAF. Gummi-Resina.

N. B. Hæc planta *Olibanum* s. *Thus* suppe-
ditat (FOERSKAL).

USUS: Leucorrhœa. Item ad suffitus.

DOS. Drachma semis—una.

AMYRIS GILEADENSIS. } Vide Balsamea
———— OPOBALSAMUM. } Meccanensis.

AMYRIS ZEYLANICA (RETZIUS). Resina.

CL. et O. præced. Arborea; Zeylan.

OF. *Gummi Eleini orientalis*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac amyr. elemiferæ.

ANACARDIUM OCCIDENTALE. Nux.

(Testæ melligo).

CL. *Enneandr*. O. *Monog*. Arbor; Ind. orient.

A. *Cashew-nut*. et Brasil.

QUAL. *Melliginis* : nigra; urens.

VIRT. Excorians, tinctoria.

USUS. Maculæ; impetigo; herpes.

ANAGALLIS ARVENSIS. Herba.

N. B. Colligenda antequam flores explicati sint.

Varietas : a. flore rubro b. flore luteo.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Annua.*

OF. *Herba anagallidis rubræ.* GE. *Rother hünnerdarm; rother gauchheil.* A. *Red pimpermell.*

QUAL. Inodora; sapor acris, nauseosus.

USUS. Epilepsia; melancholia. *Extracti* anag. flore luteo : icterus. (STOLL.)

DOS. Pulveris gr. xx. quater de die. *Extracti* : ʒj-ij. Pro infuso ʒij. ad ℥j. aquæ.

ANAGYRIS FÆTIDA. Folia; semen.

CL. *Dec. O. Monog.* *Fritex; Europ. austr.*

QUAL. Odor teter, fætidus; sapor amarus.

VIRT. Cathartica; menagoga.

USUS.

ANCHUSA OFFICINALIS. Radix; herba; flores.

CL. *Pent. O. Monog.* *Perennis.*

OF. *Buglossum.* G. *Buglosse.* GE. *Ochsenzunge.* A. *Officinal bugloss.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT.

USUS.

ANCHUSA TINCTORIA. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis; Europ. austr.OF. *Alcanna spuria s. vulgaris.* G. *Orcanette.* GE.Rothe ochsenzunge. A. *Alkanet*, or *dyer's bugloss.*H. *Anchusa de tinte.*

QUAL. Rubra.

VIRT. Tinctoria.

USUS.

ANDROPOGON NARDUS. Fibræ radicis.

CL. *Polyg.* O. *Monæc.* Perennis; Ind. orient.OF. *Spica nardi. s. spicæ indicæ radix.*

QUAL. Eximia: odor fragrans; sapor acris, amaricans.

VIRT. Cardiaca; stomachica.

USUS. Asthenia; Dyspepsia.

ANDROPOGON SCHÆNANTHUS. Herba.

CL. & O. *præced.* Perennis; Arabiæ.OF. *Herba schænanthi.*

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Carminativa; menagoga.

USUS.

ANEMONE HEPATICA. Herba; flores.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* Perennis; montana.OF. *Hepatica nobilis.* A. *Hepatica.*

QUAL. Inodora; insipida.

VIRT.

USUS.

ANEMONE NEMOROSA. Herba; flores
recentes.

CL. & O. *præced.*

Perennis.

GE. *Waldanemone.* A. *Wood-anemone.*

QUAL. Venenata; in principio acri volatili residens.

VIRT. Corrodens.

USUS *externus* loco cantharidum : cephalæa; tertiana; arthrodynia rheumatica; ischias.

ANEMONE PRATENSIS. Herba; florens.

CL. & O. *præced.*

*Perennis; in locis nemorosis,
montanis, arenosis.*

OF. *Pulsatilla nigricans.* G. *Pulsatille; coquelourde.*

GE. *Küchenschelle.* A. *Pasqueflower or meadow
anemone.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; acerrima.

VIRT. Corrodens; rubefaciens; resolvens; diuretica.

USUS *succi inspissati* : amaurosis; paralysis. *Externus* : ulcus; herpes; earies.

PRÆP. Succus inspissatus *vulgo extractum* ; infusum.

DOS. *Extracti* : gran. j-viij; pro infuso drach. j-iiij
ad ℥ss-j aquæ.

ANETHUM FÆNICULUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

*Biennis vel perennis;
hortensis.*

OF. *Semen fœniculi. s. fœniculum dulce.* G. *Fenouil,*

ou *anis doux*. GE. *Fenchel-saamen*. A. *Common fennel*; *sweet fennel-seed*. H. *Eneldo hinojo*.

QUAL. Præstans : in oleo volatili, non acri, residens; odor teter; sapor duleescens, aromaticus.

VIRT. Carminativa; lactifera; resolvens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; colica infantum; defectus lactis; ophthalmia.

DOS. Pulv. gran. xx; pro infuso draeh. ij-iiij ad ℥j. aquæ.

ANETHUM GRAVEOLENS. Semen; herba.

CL. *Et O. Præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Anethum*. G. *Aneth* ou *fenouil puant*. A. *Common-dill*. H. *Eneldo de olor pescado*.

QUAL. Præstans : odor teter; sapor subaromaticus.

VIRT. Hypnotica; carminativa; lactifera.

USUS. Colica; singultus; vomitus.

PRÆP. Oleum volatile seminum; aqua; alcohol *vulg.* spiritus.

DOS. Olei volat. gutt v-x.

ANGELICA ARCHANGELICA. Radix; folia; semen.

CL. *Pentand.* O. *Digy.* *Biennis; Alpina, passim hortensis.*

OF. *Angelica sativa*. G. *Angélique*. GE. *Engelwurzel*. A. *Garden-angelica*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aeris, aromaticus, calefaciens.

VIRT. Stimulans; sialagoga; carminativa; sudorifica.

USUS. Dyspepsia ; flatulentia.

PRÆP. Tinctura.

ANGELICA SYLVESTRIS. Radix.

CL. & O. præced. *Perennis; in locis humidis, nemorosis.*

A. *Wild angelica.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

ANTHEMIS COTULA. Herba cum floribus.

CL. Syng. O. *Polyg. superfl. Annua; in riis et locis asperis.*

OF. *Cotula fætida. G. Maroute ou camomille puante; A. Stinking camomile or may-weed.*

QUAL. Odor fætidus; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica.

USUS. Hysteria; asthma spasmodicum.

ANTHEMIS NOBILIS. Flores.

OF. *Chamælum nobile; Chamomilla Romana. G. Camomille romaine. G. Roemische kamillen. A. Common camomile. H. Manzanilla de Botera.*

QUAL. Eximia: in oleo volatili et extractivo amaro residens; odor suaveolens; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; carminativa; stomachica.

USUS. Hysteria; colica spasmodica; flatulentia; intermittentes.

ANTHEMIS PYRETHRUM. Radix.

CL. & O. præced. *Perennis, Europ. austral.*

OF. *Pyrethrum verum*. G. *Pyrethre* ou *racine salivaire*. GE. *Bertramwurzel*; *zahnwurzel*. A. *Spanish camomile*, or *pellitory of Spain*. H. *Anthemis pelitre*.

QUAL. Præstans : in principio resinoso residens ; sapor acris , penetrantissimus , urens.

VIRT. Sialagoga ; errhina.

USUS *masticatorius* : odontalgia rheumatica ; paralysis linguæ ; tumor glandularum salivalium.

ANTHIRRHINUM LINARIA. Herba.

CL. *Didym.* O. *Angiosp.* Biennis.

OF. *Linaria*. A. *Common yellow toad-flax*.

QUAL. Præstans : odor hircino - urinosus ; sapor subamarus.

VIRT. Diuretica ; eccoprotica ; alterans ; resolvens.

USUS. Icterus ; hydrops. *Externus* : ophthalmia ; varix ani.

PRÆP. Unguentum.

APIUM GRAVEOLENS. Herba ; radix ; semen.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* Biennis ; *hortensis*.

OF. *Apium*. G. *Ache des marais*. GE. *Sellery*. A. *Smal-lage*. H. *Apio de olor pesado*.

QUAL. Præcipue *seminum* : suspecta ; in oleo volatili residens ; odor subteter ; sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica ; carminativa ; phthiriaca.

USUS.

APIUM PETROSELINUM. Radix ; herba ; semen.

CL. & O. *præced.*

Biennis.

OF. *Petroselinum*. G. *Persil*. GE. *Petersilien*. A. *Parsley*. H. *Apio peregil*.

VIRT. *Radicis* : diuretica ; resolvens ; lactifuga ; phthiriaca.

USUS. Icterus ; dysuria ; ablactatio ; contusura ; pediculi.

AQUILEGIA VULGARIS. Herba ; flores ;
semen.

CL. *Polyand*. O. *Petrag*. Perennis.

OF. *Aquilegia*. A. *Common colombine*.

QUAL. *Venenata*. *Semium* : mucilaginoso ; oleoso.

VIRT.

USUS *Herbæ* : icterus ; morbi cutis.

ARBUTUS UVA URSI. Folia.

CL. *Decand*. O. *Mongyn*. Fruticosa ; Europ. sept.
in collibus arenosis.

OF. *Uva ursi*. G. *Arbousier trainant* ; *bousserolè*.

GE. *Baerentraube* ; *sandberren* ; *steinbeerenblaetter*.

A. *Trailing arbutus* , or *bears-berry*. H. *Madronna uva de oso* ; *guayuba*.

QUAL. Inodora ; sapor amaro-stypticus.

VIRT. Adstringens ; diuretica.

USUS. Calculus urinaris ; ulcus renum , vesicæ.

DOS. Gr. xx. drach. j-ij.

ARCTIUM LAPPA. Radix ; semen.

CL. *Syng*. O. *Polyg. æqual*. Biennis.

N. B. Duæ varietates.

OF. *Bardana* ; *lappa major*. G. *Bardane* ; *gloutron*.

GE. *Klettemyusz*. A. *Smooth-headed common* &

woolly-headed burdock. H. *Arcio lappa* ; *lampazo*.

QUAL. *Radicis* : sapor duleis, subausterus; odor nauseosus. *Seminum* : sapor intense amarus; urinam decolorans.

VIRT. *Radicis* : diuretica; alterans; *seminum* : cathartica.

USUS *decocti radicis* : morbi cutis ; syphilis ; arthritis ?

DOS. Une j-ij ad ℥j. aquæ.

ARISTOLOCHIA ANGUICIDA. Radix.

CL. *Gynandr.* O. *Hexandr.* Fruticosa; Ind. occid.

QUAL. Odor nauseosus; serpentes fugans.

USUS *externus* succi vulneri instillati : morsura serpentum.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS. Radix.

CL. & O. præced.

Perennis

OF. *Aristolochia vulgaris* s. *tenuis*, s. *clematitis*.

G. *Aristolochie ordinaire*. GE. *Gemeine osterluzey*.

A. *Upright birthwort*. H. *Aristolochia clematite*.

QUAL. *Præstans* : odor graveolens; sapor aeris, amarus.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; resolvens.

USUS. Amennorrhæa retentionis; chlorosis; cachexiæ; cæcoethes; fistula; sarcoma.

N. B. Substituatur quandoque aristolochiæ serpentariæ.

ARISTOLOCHIA LONGA. } Radix.
 ————— ROTUNDA. }

CL. & O. *præced.* *Europ. austr.*

OF. *Long & round rooted birthwort.*

QUAL. et VIRT. *Eadem ac præced.*

ARISTOLOCHIA ODORATISSIMA.

CL. & O. *præced.* *Jamaic.*

A. *Sweet-scented birthwort.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Virgin. & Carolin.*

OF. *Serpentaria virginiana. G. Serpentaire. GE. Vir-
ginische schlangewurzel. A. Virginian snakeroot.*

QUAL. *Præstans; in oleo volatili residens; odor
hircinus instar valerianæ; sapor aromaticus,
amaricans, acris, pungens.*

VIRT. *Stimulans; cardiaca.*

USUS. *Typhus; intermittentes; sphaecelus; chloro-
sis; amenorrhæa retentionis; morsura serpen-
tum. Forma gargarismatis: cynanche atonica.*

DOS. *Pulveris: gran. x-xxx; pro infuso drach. semis-
iij ad ℥j. aquæ vel vini.*

ARISTOLOCHIA TRILOBATA. Stipites.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; Surinam. Jamaic.*

A. *Three lobed birthwort.*

QUAL. et VIRT. *Eadem ac præced.*

ARNICA MONTANA. Flores (*sine calice*);
herba; radix.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* Perennis; alpina; in
pratis montium.

N. B. Foliis ovatis, integris, nervosis.

OF. *Arnica*. G. *Arnique*. GE. *Arnika*; *wolverley*;
Fallkraut. A. *Arnica* or *german leopard's bane*.
H. *Tobacco de montana*.

QUAL. Heroica: odor virosus; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga; errhina;
antiseptica; resolvens.

USUS *infusi florum*: asthenia; arthrodynia rheumatica; contusura; amaurosis; paralysis; epilepsy? amenorrhœa; ischuria paralytica.

Radicis forma pulveris: diarrhœa, dysenteria; quartana; gangræna; synochus. *Externus*: ulcus malignum; sphacelus.

DOS. *Infusi florum* in sacculo suspensorum: drach. j-ij-iv. ad ℥j. aquæ. *Radicis pulv.* gran. v x.

N. B. Cave ne flores substituantur aut misceantur floribus inulæ dysentericæ, hypochæridis radicatæ aut maculatæ; anthemis tinctoriæ, aliisve floribus flosculosis.

ARTEMISIA ABROTANUM. Herba;
summitates.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* Perennis; suffructic.

OF. *Abrotanum hortense*. G. *Aurone mâle*; *citronelle-aurone*. GE. *Stabkraut*; *Stabwurz*; *Ëberante*. A. *Common southern wood*. H. *Yerba lombrigera*.

QUAL. Præstans : odor nidorosus ; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga ; anthelminthica.

USUS. Dyspepsia ; amenorrhœa ; lumbrici. *Externus* forma balnei, fots, decocti vel infusi.

DOS. Unc j. ad ℥j. aquæ.

ARTEMISIA ABSINTHIUM. Herba ;
summitates.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Absinthium vulgare*. G. *Absinthe*. GE. *Wermuth* ;
A. *Common wormwood*. H. *Artemisia axenjo*.

QUAL. Præstans ; in olco volatili et extractivo amaro residens ; odor nidorosus ; sapor intense et pure amarus.

VIRT. Stomachica ; anthelminthica ; antiseptica ; resolvens.

USUS. Dyspepsia ; intermittentes ; leucophlegmatia ; amenorrhœa : icterus, tinea ; achor ; gangræna ; vermes. *Externus* forma fots, cataplasmatiss.

PRÆP. Infusum aquosum et vinosum ; tinctura ; extractum ; olcum volatile ; conserva.

DOS. *Extracti* : drach. semis. *Conservæ* unc. j.

ARTEMISIA CAMPESTRIS.

A. *Field southern wood*.

Perennis ; alpina.

QUAL. et VIRT. Abrotani.

ARTEMISIA DRACUNCULUS. Herba recens.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Dracunculus*. G. *Estragon*. GE. *Dragon*; *kaisersallat*. A. *Taragon*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA GLACIALIS.

CL. & O. præced.

Perennis.

A. *Silky wormwood*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA MARITIMA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium maritimum*. A. *Sea wormwood*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac absinthii.

ARTEMISIA PONTICA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium ponticum* S. *Romanum*. A. *Roman wormwood*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac absinthii, sed debilior.

ARTEMISIA RUPESTRIS. Herba.

CL. & O. præced.

Perennis; *Alpina*; *Sibirica*,
Zelandica.

OF. *Genipi albi herba*. A. *Creeping wormwood*.

QUAL. Odor grate aromaticus.

VIRT.

USUS. Febres intermittentes; amenorrhæa.

ARTEMISIA SANTONICA. Summitates ramulorum cum semine.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Semen cinæ* s. *contra.* s. *Santonici* s. *zedoariæ*.
 A. *Tartarian southern wood*; or *wormseed*. G. *Barbontine*; *santolina*; *poudre à vers*. GE. *Wurm-*
saamen; *zwittersaamen*.

QUAL. Præstans : in oleo volatili residens; odor
 nidorosus; sapor acris, amarus.

VIRT. Anthelminthica; stomachica.

USUS. Vermes; anorexia.

DOS. Pro infantibus gran. x. drach. j. in pulvere
 vel electuario; drach. ij-iiij. in infuso lactis.

ARTEMISIA VULGARIS. Herba; sum-
 mitates.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Artemisia rubra et alba*. G. *Armoise ordinaire*;
herbe de St. Jean. GE. *Beyfuss*; *St. Johannis gürtel*. A. *Mugwort*.

QUAL. Præstans : odor aromaticus; sapor amari-
 cans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga.

USUS. Tertiana.

PRÆP. Moxa.

ARUM MACULATUM. Radix recens.

Variet : A. *Arum non maculatum*. B. *Ar. macu-*
latum.

CL. Gynand. O. Polyand.

Perennis; in locis um-
 brosis, nemorosis.

OF. *Arum*. G. *Gouet*; *pied de veau*. GE. *Arons-wurzel*;
deuscher ingwer. A. *Wake-robin*.

QUAL. Recentis Præstans : in principio acri, vola-

tili residens; sapor urens. *Siccatae* : farinacea; subacris.

VIRT. Stimulans; sudorifica; expectorans; cosmetica. *Rec.* Corrodens; vesicans.

USUS. Dyspepsia; cephalæa; intermittentes; asthma pituitosum; cachexiæ; arthrodynia rheumatica.

DOS. Pulveris gran. x-xx-xxx.

ARUNDO PHRAGMITIS.

CL. *Triand.* O. *Digyn.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS. Syphilis.

PRÆP. Decoctum ℥j-ij ad ℥jj aquæ coquendo ad colat. ℥j.

ASARUM EUROPÆUM. Fibræ radicis; folia.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis, montanis.*

OF. *Asarum.* G. *Asaret*; cabaret. GE. *Haselwurz.*
A. *Common asarabacca.* H. *Asaro de Europa.*

QUAL. Heroïca: in principio acri, volatili residens; odor fragrans; sapor acris, nauseosus, amari-

VIRT. Emerica; cathartica; erihina; diuretica; sudorifica; ménagoga.

USUS *decocti.* Hydrops; intermittentes. *Extern.* pulv. naribus attracti: cephalæa.

DOS. Pulveris: gran. x-xx-xxx; scopo errhino gran. iij-iv. cum saccharo; pro decocto drach. ij

ad ℥j aquæ, cujus unc. j. omni biliorio vel tri-
horio sumenda.

PRÆP. Extractum : dosis. gr. xx.

ASCLEPIAS ASTHMATICA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Fruticos. Zeylan.

QUAL. Sapor dulci-acris, subnauseosus; odor
vincetoxici.

VIRT. Subemetica; cathartica; expectorans.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PRÆP. Decoctum; syrupus.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis; in locis nemorosis.

OF. *Vincetoxicum* s. *hirundinaria*. G. *Asclepiade*;
dompte-venin. GE. *Schwalbenwurzel*. A. *White*
& *yellow officinal swallow-wort*.

QUAL. Lactescens; subvenenata; odor penetrans;
sapor amaricans, acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga.

USUS. Hydrops?

ASPARAGUS OFFICINALIS. Radix.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* Perennis; hortensis.

G. *Asperge*. GF. *Spargel*. A. *Common asparagus*.

QUAL. Inodora; subdulcis; urinam odore fœtido
imbuens, qui acido instillato corrigitur.

VIRT. *Recentis* : diuretica.

USUS.

ASPERULA ODORATA. Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* Perennis, in sylvis umbrosis.

OF. *Aspergula matrisylva* s. *hepatica stellata*. G. *Aspergule*. GE. *Waldmeister*; *Sternleberkraut*; *Meserich*. A. *Sweet scented woodroof*.

QUAL. *Siccatae* : odor fragrans quem infuso communicat.

VIRT. Diuretica?

USUS. Infusi aquosi vel vinosi.

ASPHODELUS RAMOSUS. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* Perennis; *Europ. austr.*

OF. *Asphodelus*. G. *Goldwurz*el. A. *Branchy asphodel*, or *king's spear*.

QUAL. *Recentis* : acris. *Siccatae* : mucilaginosi.

VIRT.

USUS.

ASPLENIUM CETERACH.

CL. *Cryptog.* O. *Filic.* Perennis; *Europæ.*

OF. *Ceterach herba*. G. *Ceterac*. A. *Common spleenwort*.

QUAL. Sapor subausterus, mucilaginosus.

VIRT. ?

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis.

OF. *Scolopendrium* s. *lingua cervina*. G. *Scolopendre*. A. *Hart's tongue spleenwort*.

QUAL. Substystica.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM RUTA MURARIA. Herba.

CL. et O. præced.

Perennis.

OF. *Ruta muraria*, G. *Rue de muraille* ou *sauve-vie*.A. *White maidenhair*; *walrue*, or *spleenwort*.

ASPLENIUM TRICHOMANOIDES. Herba.

CL. et O. præced.

Perennis.

OF. *Trichomanes s. dianthus ruber*, G. *Polytric*.A. *Common maidenhair* or *spleenwort*.

VIRT. Subadstringens.

ASTRAGALUS EXSCAPUS. Radix.

CL. *Diatelph*, O. *Decand*. Perennis; *Hungariæ*.A. *Hairy podded milk-vetch*.

VIRT. Antisymphilitica?

USUS decocti: Syphilis.

DOS. *Radicis siccatae concisæ*: unc. j—ij ad libr. iij

aquæ coquendo ad colat. libr. ij quotidie sumend.

ASTRAGALUS GUMMIFER. } Gummi.
 ——— TRAGACANTHA etc. }

Frutic. Mons Liban.

N. B. Species prima maximam partem Gummi
 vulgo *Tragacantha* dicti commercio sup-
 peditat, (LABILLARDIERE.)

OF. *Gummi tragacanthæ*, G. *Gomme adragante*.GE. *Tragacanth gum*, A. *Goatsthorn milk-vetch*;
gum tragant.

QUAL. Mucilaginosæ.

VIRT. Involvens; obtundens.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

ATHAMANTA CRETENSIS. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn. Perennis; candidæ, alpina.*OF. *Semen dauci cretici.* GE. *Mohrenkümmel.*A. *Annual spiguel.*

QUAL. Acris; aromatica.

VIRT. Carminativa; diuretica; menagoga.

USUS. Flatulentia; tussis stomachica.

ATHAMANTA OREOSELINUM. Herba;
semen; radix.CL. *et O. præced. Perennis; in locis montanis siccis.*OF. *Oreoselinum G. Persil des montagnes. GE. Berg-
petersilie; grundheil.* A. *Divaricated spiguel.*

QUAL. Aromatica.

ATROPA BELLADONA. Folia; radix.

CL. *Pentand. O. Monog. Perennis; passim hortensis.*OF. *Belladonna s. solunum lethale s. Sol. furiosum.*G. *Belladone.* GE. *Tollkraut.* A. *Deadly night-
shade; dwale.*QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico
residens; odor virosus; sapor acris, substypticus.N. B. Antidotum ejus est, præmisso emetico
forti, acetum, cujus coehleare majus dandum
omni quinto minuto, et enema ex aceto cum
aqua omni horæ quadrante, adplicando simul
opium ventri.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; resolvens.

USUS *cautus*: Mania; melancholia; epilepsia; per-
tussis; hydrophobia; Icterus inveteratus; hy-

drops. *Externus*. Scirrhus; cancer; fistula; arthrodynia rheumatica; ulcus malignum.

DOS. *Pulveris folior. aut rad. siccata*. gran. j. gradatim ascendendo ad gran. vj. de die in adultis; infantibus gran. $\frac{1}{8}$ gran. $\frac{1}{4}$ ad gran. ij-ijj.

N. B. MÆNCH ad preveniendam aut ad curandam hydrophobiam dat *radicem* omni secundo die in aqua calida, vel crevisia adultis gran. x-xv; infantibus sex annorum gran. v: quatuor annorum gran. ij. — *Folia siccata*: adultis gran. xii-xvj. et post 48 horas gran. x-xij. — Eadem pro infuso aquoso, scrup. j. ad unc. x. aquæ fervidæ, hujusque unc. ij adultis dantur primis diebus, dein quotidie augendo dosin, donec siccitas et tensio faucium aut vertigo appareant. *Externus*: forma pulveris, vel cataplasmatidis.

FRÆP. Succus foliorum inspissatus, vulgo *extractum*.

ATROPA MANDRAGORA. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis; Europ. austr.

OF. *Radix mandragoræ*. G. *Mandragore*. GE. *Alraunwurze!*. A. *Mandrake*.

QUAL. Venenata: in principio narcotico residens. *Cortex radices*: acris.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; *corticis radices*. cathartica; menagoga.

USUS. *Pulv. radices externus forma cataplasmatidis*:

Scirrhus; scrophula; tumor testiculi. *Internus* :
epilepsia?

AVENA SATIVA.

Semen excortica-
tum; farina.

CL. *Triand.* O. *Digyn.*

Annuc.

OF. *Avena.* G. *Gruau d'avoine.* GE. *Habergrütze.* L.
Cultivated white oat : oatmeal.

QUAL. *Insipida* ; *farinacea.*

VIRT. *Demulcens* ; *emolliens* ; *nutriens.*

USUS. *Forma decocti* , *cataplasmat.*

AVICENNIA TOMENTOSA. Nucleus; suc- cus putaminis.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Arborea* ; *utriusque India.*

OF. *Anacardium orientale.*

QUAL. *Nuclei* : *dulcis* ; *oleosa.* *Putaminis* : *acerrima.*

VIRT. *Nuclei* : *nutriens.* *Putaminis* : *corrodens* ;
caustica.

USUS *succi* : cum calce mixtus characteres paunis
gossypinis et linteis indelebiles imprimit. *Putami-
nis* : *Morosis* ; *oblivio?*

B

BALSAMEA MECCANENSIS

(GLEDITSCH).

Balsamum.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Arbor* ; *Arabiae yemen, Mecca.*

CARACT. *Cal* 5-partitus. *cor.* 5-petal. *æqualis* , *rubra.*
stamin. 10. *longa calici inserta.* *pistil.* 1. *superum.* *styl.* 1. *stigm.* obtus. *fol.* *bipinnata* : *foliolis lanceolatis.*

Amyris gilcadensis seu opobalsamum LINN.

NOMEN NATALE. Balessan.

OF. *Balsamum de mecca* ; *opobalsamum verum* ; *balsamum gileadense*. G. *Beaume de mecca*. GE. *Neckabalsam*. A. *Balsam of judda* ; *balsam of gilead*.

OPOBALSAMUM viridescens, incisione ramulorum ;

CARPOBALSAMUM expressione fructus maturi ;

XYLOBALSAMUM rubescens, expressione et decoctione ramulorum obtinetur. (BRUCE.)

QUAL. Præstans : tenaci - liquida ; odor fragrans, gratus ; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans ; diuretica ; cosmetica.

USUS. Blennorrhœa ; tabes ; morbi pituitosi ; maculæ cutis.

DOS. gutt. xv-xxx-L. cum saccharo, vitello ovi, aut haustu aquæ.

BANKSIA ABYSSINICA (BRUCE.) Flores.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea* ; *Abyssin.*

NOMEN NATALE : Cusso.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS *infusi* : ascarides.

DOS. Manip. j. florum ad ℥ iv. cerevisiæ per 12 horas digerendo.

BELLIS PERENNIS. Flores ; herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *In pratis.*

OF. *Bellis minor*. G. *Miaslieben*. GE. *Gaenseblumen*. A. *Common daisy*.

QUAL.

VIRT.?

USUS. Tabes.

BERBERIS VULGARIS. *Baccarum recentium succus; cortex.*

CL. *Hexand.* O. *Mong.* *Fruticosa.*

OF. *Berberis.* G. *Epine-vinette; vinetier.* GE. *Sauer-dorn-beeren.* A. *Common berberry.* H. *Agracejo.*

QUAL. *Baccarum* : sapor intense acidus. *Corticis* : flava; sapor amarus.

VIRT. Refrigerans; antiseptica. *Cort.* tinctoria.

USUS. Febres acutæ; cholera. *Cort.* icterus; leucorrhœa.

PRÆP. Succus; syrupus; conditum baccarum.

BETA CICLA. *Succus radicis.*

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Hortensis.*

OF. *Beta alba.*

QUAL. Sapor aquosus, dulcis.

VIRT. Errhina.

USUS.

BETA VULGARIS. *Radicis succus.*

CL. & O. *præced.* *Hortensis.*

OF. *Beta rubra.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

BETONICA OFFICINALIS. *Herba et flores; radix.*

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis.*

OF. *Betonica.* G. *Betoine.* GE. *Betonien.* A. *Wood-betony.*

QUAL. Odor nidorosus, halituosus. *Radic.* nauseosa.

VIRT. Nervina? Erihina? *Radic.* emetica.

USUS.

BETULA ALBA. Folia tenerrima; epidermis; lymphæ.

CL. *Monac.* O. *Tetrand.* *Arborea; Europæ.*

OF. *Betula.* G. *Le bouleau ordinaire.* GE. *Birkenbaum.* A. *Common birch-tree.* H. *Abidulblanco.*

QUAL. *Olei* : suaveolens.

VIRT.?

USUS *foliorum* : Erysipelas. *Succi saccharini* (vulgo lymphæ dicti) terebro ex arbore primo vere obtenti : Morbi cutis; scorbutus; lumbrici.

PRÆP. Oleum epidermidis nigrum.

BIGNONIA OPHTHALMICA. Radix; succus expressus.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Frutic. Amer. meridion.*

QUAL.

VIRT.

USUS *succi expressi vel decocti* : ophthalmia membranarum.

DOSIS guttula una succi vel guttula una alterare decocti oculo instillatur omni mane.

(CHISHOLM).

BIXA ORELLANA. Radix et sæcula ex capsulis seminum arte obtenta.

CL. *Polyg.* O. *Monog.* *Arborea; Indiæ occident.*

OF. *Terra orellana* s. *orleana*. G. *Rocou*. A. *Heart-leaved bixa*; or *anotta*.

QUAL. *Fæculæ* : rubra; odor mucidus; sapor sub-amaro stypticus.

VIRT. *Radicis* : diuretica.

USUS *radicis et fæculæ* : tinctorius. Pigmentum corpori illitum contra morsus culicum munit.

BOLETUS IGNIARIUS. Quercui, tiliaë aut fago putrescentibus insidens.

CL. *Cryptog. O. Fungi*.

OF. *Agaricus quernus* s. *agaricus chirurgorum*, s. *fungus quercinus*. G. *Agaric de chéne*.

QUAL.

VIRT. Mechanice sanguinem sistens.

USUS *externus*, ablato ab utraque parte tegmine contusus : Hæmorrhagiæ.

BOLETUS LARICINUS. Larici insidens.

OF. *Agaricus albus optimus*. G. *Agaric*. GE. *Lerchenschwam*.

QUAL. In principio resinoso acri residens; sapor nauseosus, amarus.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica.

USUS *intern.* hirudo deglutita; sudor phthysicorum. *Extern.* hæmorrhagiæ. *Pulv. inspersi* : ulcera.

DOS. Gran. ij.

BOLETUS SUAVEOLENS. Salici insidens.

OF. *Fungus salicis*, seu *fungus albus saligneus*.

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT. ?

USUS. Mucilagine humectatus, leniter siccatus et cum alcoholis pauxillo in pulverem tritus : Tabes pulmonalis ; asthma spasmodicum.

DOS. Pulveris drach ss -ij. bis de die cum saccharo.

BORAGO OFFICINALIS. Herba et flores.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua.*

G. *Bourrache.* A. *Common borage.*

QUAL. Oleracea.

VIRT. ?

USUS.

BRASSICA ERUCA. Semen ; folia.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.* *Annua ; montana.*

OF. *Erucæ semen.* G. *Roquette des jardins ou annuelle.*

QUAL. In acri volatili residens ; sapor acris, fervidus, penetrans, fere ut sinapis.

VIRT. *Veteribus aphrodisiaca?*

USUS. Paralysis linguæ.

BRASSICA OLERACEA. Folia.

CL. & O. *præced.* *Hortensis.*

OF. *Brassica capitata alba et rubra ; aliæque varietates.* G. *Choux.* A. *Cabbage.*

QUAL. Aquosa ; inodora.

VIRT. ?

USUS. Cocta, vel muriate sodæ condita, germanis sub nomine *Sauerkraut* ; scorbutus. *Formæ cataplasmatibus* mammis puerperarum applicata ad coagulum lactis impediendum. *Decocti* : Raucedo ; tussis ; scorbutus ; combustura.

BRASSICA RAPA. Radix recens.

CL. & O. *præced.* Biennis; *hortensis.*

OF. *Rapa.* G. *Weisse rüben.* A. *White turneps.*

QUAL. *Succi* : in principio saccharino et mucilaginoso residens.

VIRT. Flatulenta; diuretica.

USUS *succi expressi* : Tabes; asthma; stranguria.

Radicis recentis forma cataplasmatidis : Pernio, podagra? *Succi* : Otagia; aphtha.

PRÆP. Syrupus frigide e succo paratus.

BROMELIA ANANAS. Bacea (*vulgo fructus*); cortex exterior recens.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* Perennis; *Americ. merid.*

OF. *Ananas fructus.* A. *Queen pine-apple.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor gratissime acidodulcis, subacris.

VIRT. Analeptica. *Cortic* : menagoga.

USUS.

PRÆP. Liqueur *Italidis* NAJANA dictus.

BRUCEA FERRUGINEA. Cortex.
(HERITIER).

Brucea antidysenterica. Abyssin. (MILLER).

N. B. An cortex argusturæ officinarum?

NOMEN NATALE : *Wooginoos.*

QUAL.

VIRT. Antidysenterica. (BRUCE.)

USUS. Dysenteria.

DOS. Pulveris ʒʒ mane et vesper. in haustu lactis recenter mulsi, abstinendo ab omni potu post usum ejus. (BRUCE.)

BRYONIA ALBA. } Radix recens; suc-
 ————— DIOICA. } cus radicis inspissa-
 tus.

CL. *Monæc.* O. *Syngen.* Perennis; in sepibus.

OF. *Bryonia.* G. *Brione*; *couleuvrée.* GE. *Gichtrüben*; *zaunrüben.* A. *White briony.* H. *Nueza blanca.*

QUAL. Præstans: in principio acri, volatili residens; sapor acris, intense amarus; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; anthelmintica; menagoga. *Externus*: Rubefaciens; resolvens.

USUS forma pulveris vel infusi: Hydrops, asthma; mania; epilepsia; arthrodynia rheumatica. *Externus radicis contusæ* forma cataplasmatidis: Œdema; lupia; ecchymoma.

DOS. *Pulv. radicis siccata:* drach. ʒjʒ. *Succi inspissati:* drach. ij-ʒʒ.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus; succus inspissatus, vulgo *extractum.*

BUBON GALBANUM. Succus gummi-resinosus incisione obtentus, inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Perennis; *Afric.*

OF. *Gumi galbanum.* GE. *Galbanum.* *Mutterharz.* A. *Long-leaved bubon.*

QUAL. In oleo volatili residens : sapor amaro-acris ;
odor alliaceus , penetrans.

VIRT. Stimulans ; antispasmodica ; menagoga ; ex-
pectorans ; resolvens.

USUS. Hysteria ; asthma ; amenorrhœa ; asthenia.
Externus scopo resolvendi aut maturandi : Tu-
mores.

DOS. Gran. xx - ʒj forma emulsionis vel pilularum.

PRÆP. Emplastrum.

BUBON MACEDONICUM. Semen ; herba.

CL. & O. *Præced.*

Biennis.

OF. *Petroselinum Macedonicum.* G. *Persil de Ma-*
cedoine. H. *Macedonian bubon* or *parsley.*

QUAL. Sapor aromaticus , dulcescens.

VIRT. Carminativa ; diuretica ; menagoga.

USUS. Syphilis ?

BUPLEURUM ROTUNDIFOLUM. Herba ;

semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

Annua.

OF. *Perfoliata.* A. *Round leaved hare ear ;* or *tho-*
roy-wax.

QUAL. Subaromatica.

VIRT. ?

USUS.

BURSERA GUMMIFERA.

CL. *Hexand.* O. *Monog.*

A. *Jamaica birch-tree.*

N. B. Quidam et hac planta quassiam sima-
rubam derivant.

BUXUS SEMPERVIRENS. Lignum; folia.CL. *Monœc.* O. *Tetrand.*OF. *Comon Tree Box.*

QUAL. Odor teter, foetidus; sapor amarus.

VIRT. Sudorifica; alterans; *folior.* cathartica.USUS *decocti* : Epilepsia, syphilis? *Olei* : Hirsuties?

C.

CACHRIS ODONTALGICA.

Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*G. *Amarintz.*

QUAL. Sapor acris, urens.

VIRT. Sialagoga.

USUS loco *anthemis pyrethri* : Odontalgia rheumatica.**CACTUS OPUNTIA.**

Folia.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Fruticosa*; *Europ. austr.*OF. *Opuntia folia.* A. *Common Indian fig.*

QUAL. Mucilaginosa.

USUS *externus* foliorum calore mollitorum et medio dissectorum forma cataplasmatibus : Dolores; dysenteria; arthrodynia.**CALAMUS ROTANG.**Resina fructum
tegens.CL. *Hexand.* O. *monog.* *Fruticosa*; *Indica.*OF. *Sanguis draconis.* G. *Sang dragon.*N. B. Vide etiam *dracæna draco*, et *ptero-*
carpus draco, ex quibus promiscue desu-
mitur *resina draconis*.

CALENDULA OFFICINALIS. Folia et
flores.

CL. *Syng. O. Polyg. necess. Annuæ; Europ. austr.*

VAR. A. *Flore simplici.* B. *Flore pleno.*

OF. *Calendula.* G. *Souci* GE. *Ringelblumen.* A. *Common & double flowered marigold.*

QUAL. Flava; sapor amaricans.

VIRT.?

USUS.

CAMBOGIA GUTTA. Succus gummi-
resinosus incisione ramulorum obtentus,
inpissatus.

CL. *Polyand. O. Monog. Arborea; Indica.*

OF. *Gambogia; gummi gutta; gutta gamba.* G. *Cam-
boge; gomme-gutte.* G. *Gummigutt.* A. *Gamboge.*

QUAL. Heroica: lutea; opaca; in principio resino-
gummoso residens; insipida; inodora.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; subemetica.

USUS. Hydrops; obstipatio; tœnia; icterus; quar-
tana; cachexiæ; morbi cutis.

DOS. Gran. iij-iv. pulveris cum saccharo triti omni
trihorio in hydrop. In tœnia gr. x-xx. in obsti-
patione gr. j-ij.

PRÆP. Tinctura dos. ʒj-ij.

N. B. Antidotum ejus est alcali.

CAMPHOROSMA MONSPELIENSIS.

Herba.

CL. *Tetrand. O. Monog. Annuæ; Europ. austr.*

OF. *Camphorata.* G. *Camphrée.* A. *Hairy camphorosme.*

QUAL. Subaromatica.

VIRT. Nervina; sudorifica; resolvens.

USUS. Hysteria; leucorrhœa; asthma; arthrodynia rheumatica; coryza.

CANELLA ALBA. Cortex interior arboris.

CL. *Dodec. O. Monog. Arborea; Ind. occident.*

Wintera canella (PALLAS).

OF. *Canella alba. A. Laurel-leaved canella. G. Weisser zimmt.*

QUAL. Aromatica; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dyspepsia.

DOS. Drach. β . j-ij in infuso: gran. xxx. in pulvere.

CANNABIS SATIVA.

Semen.

CL. *Diœc. O. Pentand.*

Annua.

OF. *Semina cannabis. G. Semences du chanvre G.*

Hanfſaamen. A. Hemp-seed; common hemp.

QUAL. Præstans: in principio oleoso et mucilaginoso residens; odor virosus.

VIRT. Involvens; sedativa.

USUS *infusi aut emulsionis*: Blennorrhagia; stranguria; tussis catarrhalis.

DOSIS: unc β -j. ad aquæ \mathfrak{H} iv in infuso.

PRÆP. Oleum fixum.

CAPPARIS SPINOSA. Cortex radiceis.

CL. *Polyand O. monog. Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Capparis. G. Capres. A. Prickly caper-bush.*

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Obstipatio; physconia abdominalis; paralysis.

PRÆP. Oleum fixum.

CAPSICUM ANNUUM.

Fructus.

CL. *Pentand. O. monog.*

Annua.

OF. *Piper Indicum, Hispanicum, Turcicum. G. Capsique; poivre d'Inde. G. Spanischer, oder türkischer pfeffer. A. Cayenne-pepper; indian pepper or capsicum.*

QUAL. Eximia: in principio resinoso residens; sapor acris, urens.

VIRT. Stimulans; stomachica; rubefaciens.

USUS. Dyspepsia; cardialgia arthritica; coryza; intermittentes.

CAPSICUM BACCATUM.

Fructus.

A. Small fruited capsicum, or Bird-pepper.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CARDAMINE PRATENSIS. Petala (vulgo flores) et folia.

CL. *Tetrad. O. Siliquos.*

Perennis.

OF. *Flores cardamine; nasturtium pratense. G. Cresson élégant; cresson des prés; passerage sauvage. GE. Wiesenkrese. A. Ladies smock; cuellow-flower.*

QUAL. In principio subacri residens.

VIRT. *Petalorum*: Antispasmodica. *Folior.* Antiscorbutica.

USUS *petalorum* : Convulsio ; chorea.

DOSIS : pulv. *petalorum* scrup. j ad drach. semis.

CARDUUS MARIANUS. Semen ; herba.

CL. Syng. O. *polyg. æqual.* *Annua.*

OF. *Carduus mariae*. G. *Chardon-Marie*. A. *Milk or ladies-thistle.*

QUAL. *Semin* : oleosa : *herbæ* : amara.

USUS. Carcinoma ?

CAREX ARENARIA. Radix.

CL. *Monæc.* O. *Triand.* *Perennis ; in arenosis.*

OF. *Gramen rubrum*. G. *Faiche des sables*. GE. *Sand-riedgras ; rothe graswurzel*. A. *Sea-carex.*

QUAL. *Radicis recentis* : odor resinoso-terebiuthinaceus ; subdulcis.

VIRT. Sudorifica ; diuretica.

USUS loco sarsaparillæ : Morbi cutis ; syphilis.

CARICA PAPAYA. Semen ; radix ; succus
lacuens incisione fructus immaturi viridis obtentus.

CL. *Diæc.* O. *Decand.* *Indiæ orient. ; Africæ.*

VIRT. Anthelminthica.

DOSIS *succi* : adultis cochleare majus ; infantibus cochleare parvulum cum haustu aquæ.

PRÆP. Succus inspissatus ; pulvis seminis ; decoctum seminis, vel radicis, aut fructus immaturi.

CARLINA ACAULIS. Radix.

CL. Syng. O. *Polyg. æqual.* *Perennis ; alpina.*

OF. *Carolina cardopatia*. GE. *Elternurzel*. A. *Umarf Carlina.*

QUAL. Præstans : odor graveolens , penetrans ; sapor acris , amarus , aromaticus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; sudorifica.

USUS. Physconia abdominalis ; morbi cutis ; hysteria ?

CARTHAMUS TINCTORIUS. Semen ; flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* Perennis ; alpina.

OF. *Safranum.* G. *Carthame.* A. *Bastard saffran.*

QUAL. Lutea ; tinctoria ; sapor nauscosus.

VIRT. Cathartica ; diuretica. *Florum* : cosmetica.

USUS. Tussis senilis ; asthma pituitosum ; icterus.

N. B. Ex his floribus et non ex carmino, ut vulgo creditur, fucus ruber, vulgo *Rouge végétal*, processu chemico ingenioso paratur Parisiis.

CARUM CARVI. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Biennis.

OF. *Semen carvi.* G. *Carvi.* GE. *Gemeiner oder Wiesenkümel; feldkümel.* A. *Common carraway-seed.* H. *Alcaroea.*

QUAL. Præstans : in oleo volatili residens ; sapor aromaticus , acris , calefaciens.

VIRT. Stimulans ; carminativa ; lactifera ; resolvens.

USUS. Colica ; intermittentes.

DOSIS : Pulv. scrup. j—drach. j ; in decocto unc. j ad aquæ libr. j.

PRÆP. Tinctura ; oleum volatile.

CARYOPHILLUS AROMATICUS. Flores cum pericarpio immaturo. (*Vulg.* Caryophilli.)

CL. *Polyand.* O. *Monog.* Arborea ; Indica.

OF. *Caryophylli aromatici*. G. *Giroffles*. GE. *Gewürznelken*. A. *Cloves*.

QUAL. In oleo volatili et principio acri-resinoso residens; odor gratus, fragrans, penetrans; sapor aromaticus, acris, urens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; sialagoga; stomachica; menagoga.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; odontalgia.

DOSIS. Scrup. sem. ad drach. j in pulvere, aut infuso aquoso vel vinoso.

PRÆP. Oleum volatile.

CASSIA ALATA.

Folia.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa*; *Ind. or. et occid.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Herpes.

CASSIA FISTULA. Fructus; pulpa fructus.

CL. et O. *præced.* *Arborea*; *Ægypt.*; *Ind. orient.*

OF. *Cassia fistula* s. *Fistularis*; *pulpa cassiæ*.

G. *Casse*. GE. *Rohrkassie*. A. *Purging cassia*.

QUAL. Sapor acidulo-dulcis, mucilaginosus, subnauscosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Obstipatio.

DOSIS. Unc. semis—ij.

CASSIA SENNA.

Folia.

CL. et O. *præced.*

Fruticosa; *Afric.*

OF. *Folia sennæ*. G. *Séné*. GE. *Sennes-blätter*.

A. *Senna* or *Ægyptian cassia*.

QUAL. Odor nauseosus; sapor subacris, amaricans.

VIRT. Cathartica.

USUS. Obstipatio. *Extern.* Herpes.

PRÆP. Tinctura; infusum.

DOSIS. *Pulveris* : Scrup. j ad drach. sem. *Infusi* : drach. iiij—iv ad unc. vj aquæ addito semine aromatico coriandri sativi, cardamomi vel carvi, etc. *Tincturæ* : drach. ij—iv.

CEANOTHUS AMERICANUS. Stipites.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Frutex; Virgin. et Carolin.*
A. *American Ceanothus or new Jersey-tea.*

QUAL. Rubra.

VIRT. Alterans.

USUS *pulveris externus* : Ulcera syphilitica.

CENTAUREA BEHEN. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. frust.* *Perennis; Libanon.*
OF. *Radix Behen albi.*

QUAL. Odorata; sapor acris.

CENTAUREA BENEDICTA. Folia; herba; semen.

CL. *et O. præced.* *Annua, hortensis.*

OF. *Carduus benedictus.* G. *Chardon-bénit* GE. *Kard-benediktenkraut.* A. *Blessed thistle or centaury.*
H. *Cardo santo.*

QUAL. *Herbæ præstans* : sapor pure et intense amarus.

Semen : dulcis; mucilaginosum.

VIRT. Stomachica; antacida; subemetica.

USUS *extracti, infusi vel decocti* : Dyspepsia ;
intermittentes ; leucophlegmatia ; icterus ; physconia
abdominal. *extern.* ecchymoma.

DOSIS *extracti* : Drach. j.

CENTAUREA CALCITRAPPA. Radix.

CL. *et O. præced.*

Annua.

OF. *Carduum ; carduus stellatus ; centaurea stellata.* G. *Centaurée-étoilée ; chardon étoilé ; chausse-trappe ; pignerole.* GE. *Rittersporn-wurzel.* A. *Common star centaury or thistle.*

QUAL. Sapor amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Intermittentes ; dyspepsia.

CENTAUREA CYANUS. Flores.

CL. *et O. præced.*

Annua.

OF. *Flores cyani.* GE. *Blaue kornblumen.* A. *Blue bottle.*

QUAL. Cærulea.

USUS. Chemicus pro reagente.

CERATONIA SILIQUA. Fructus.

CL. *Polyg. O. Diæc.*

*Arborea ; Syria ;
Siciliæ.*

OF. *Siliqua dulcis ; caroba.* G. *Carouge.* GE. *Johannis brod ; Bockshorn.* A. *Carobtree, or St-John's bread.*

QUAL. Dulcis ; mucilaginosa.

VIRT. Demulcens ; expectorans.

USUS *decocti* : Raucedo ; tussis ab acri ; cathar. lax.

CHAEROPHYLLUM SYLVESTRE. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*OF. *Herba cicutarice.* G. *Persil d'âne.* A. *Wild chervil, or cow-weed.*

QUAL. Odor subfoetidus; sapor amaricans.

USUS. Physconia abdominal.

CHEIRANTHUS CHEIRI. Flores.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Europ. austr.; hortensis.*OF. *Viola lutea, leucoium luteum; flores cheiri.*
G. *Violier jaune.* GE. *Gelbe veilchen.* A. *Wild wall-flower.*

QUAL. Lutea; odor fragrans; in principio volatili residens.

VIRT. Nervina; narcotica.

USUS. Amenorrhœa; icterus; physconia abdominalis.

CHELYDONIUM MAJUS. Radix; herba recens.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Perennis.*OF. *Chelidonium.* G. *Chélidoine éclair.* GE. *Schellwurzel; schwalbenkraut* A. *Common celadine.*

QUAL. Præstans: in principio acri volatili residens; odor nauseosus; sapor amarus, acris; succus luteus.

VIRT. *Radicis recentis*: Diuretica; resolvens.USUS *internus decocti*: Cachexiæ; tabes; icterus; hydrops; morbi cutanei.

DOS. *Succi externus* : Verruca ; herpes ; ulcus phagedænicum ; pterygium.

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES. Herba ; semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Mexicana.*

OF. *Botrys Mexicana seu chenopodium Mexicanum.*

A. *Mexican goose-foot. H. Té de Espanna.*

QUAL. *Eximia* : odor fragrans ; sapor acris , aromaticus.

VIRT. *Nervina* ; stimulans. *Seminum* : anthelminthica ; carminativa.

USUS : Paralysis ; asthenia nervosa ; dyspepsia ; flatulentia ; vermes.

PRÆP. Tinctura ; infusum.

CHENOPODIUM ANTHELMINTHICUM. Semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis ; Pennsylv.*

A. *Shrubby goose-foot.*

QUAL. *Præstans* : odor graveolenti-fragrans ; sapor aromaticus.

VIRT. Anthelminthica.

USUS : Lumbrici.

CHENOPODIUM BONUS HENRICUS. Herba.

OF. *Herba boni Henrici. A. Angular leaved goose-foot, or English mercury.*

QUAL. *Oleracea* ; fatua.

VIRT. Refrigerans; eccoprocrotica.

USUS *externus* : Paronychia; ulcera; varix ani?

CHENOPODIUM BOTRYS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; Europ. aust.*

OF. *Herba botryos.* G. *Botrys.* G. *Traubenkraut.* A. *Jerusalem-oak; or cut-leaved goose-foot.* H. *Bien granada.*

QUAL. et VIRT. *Chenopodii ambrosioid.* sed debilior.

CHENOPODIUM RUBRUM. Herba.

OF. *Atriplex sylvestris.* A. *Red goose-foot.*

QUAL. *Aquosa.*

VIRT.

CHENOPODIUM VULVARIA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua.*

OF. *Vulvaria; atriplex fœtida s. Olida.* G. *Vulvaire; arroche puant; anserine fétide.* GE. *Stinkende melten; hundsmelte.* A. *Stinking goose-foot, or orache.*

QUAL. *Præstans* : odor fœtidus, hircinus.

VIRT. *Antispasmodica.*

USUS. *Hysteria.*

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM.

Herba et flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Bellis hortensis. s. pratensis.* A. *Ox-eye daisy or chrysanthemum.*

QUAL. Subacris; penetrans; piperata in decocto.

VIRT. Diuretica.

USUS : Asthma; tinea?

CICHORIUM INTYBUS. Radix; herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg.* æqual. Biennis.

OF. *Cichoreum.* G. *Chicorée sauvage.* G. *Wegwart;*
hund-laeuft; *zichorienwurzel.* A. *Wild endivy*
or sucory. H. *Achicorea sylvestre.*

QUAL. *Recentis* : In succo lacteo intense amaro
residens.

VIRT. Deobstruens; stomachica; diuretica.

USUS *decocti* : Icterus; dyspepsia; physconia
abdomin.

CICHORIUM ENDIVIA. Herba; semen.

G. Endive. A. Common endive.

QUAL. Oleracea.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

CICUTA VIROSA. Herba; radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* In aquis stagnantibus,
putridis.

OF. *Cicuta aquatica.* G. *Wasserschierling.* G. *Ciguë*
aquatique. A. *Water hemlock.*

QUAL. Venenata; odor teter; sapor acris.

VIRT. Narcotica; resolvens.

CIMICIFUGA FÆTIDA. Herba.

CL. *Polyand.* O. *Tetragyn.* *Sibirica.*

QUAL. *Præstans* : odor teter; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica ; resolvens.

USUS : Ataxia ; spasmi ; bronchocele ?

CINCHONA ANGUSTIFOLIA. (SWARZ).

Cortex.

CL. *Pent. O. Monog.* *Arbuscula ; insulæ Doming.*

QUAL. Sapor intense amarus, subdulcis, subaromaticus.

VIRT. Roborans ; stomachica.

USUS : Febres intermittentes et remittentes ; dyspepsia ; asthenia.

CINCHONA CARYBÆA. Cortex.

CL. & O. *præcd.* *Arborea ; Ind. occident.*

OF. *China carybæa ; cortex St. Luciae ; cinchona Jamaicensis.*

QUAL. Sapor substypticus ; magis amarus, sed minus aromaticus quam cinchonæ officinalis.

VIRT. Roborans ; adstringens ; stomachica.

USUS : Febres remittentes ; intermittentes ; typhus.

CINCHONA CORYMBIFERA. (FORSTER)

Cortex.

CL. & O. *præcd.* *Arborea ; Ind. occident.*

Nota. Idem ac Cortex de St. Fé esse videtur.

QUAL. Sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Stomachica ; subastringens.

USUS idem ac *præcd.*

CINCHONA FLORIBUNDA. (SWARZ).

Cortex.

CL. & O. *præcd.* *Arborea ; Ind. occident.*

OF. *Chinchina Sanctæ Lucæ.*

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT et USUS præced.

CINCHONA BRACHICARPA.

VIRT. Eadem ac *Cinchonæ officinalis*?

CINCHONA MONTANA. (BADIER.) Cortex.

CL. et O. præced. *Arbor insulæ Martin. et Guadel.*

OF. *China-piton.*

QUAL. Sapor intense amarus, stypticus.

VIRT. Emetica; cathartica.

CINCHONA OFFICINALIS. Cortex.

CL. et O præced. *Arborea; Peruviana, montana.*

OF. *Cortex peruvianus; chinchina; cortex chinæ.*

G. *Quinquina.* GE. *Fieberrinde; kinarinde.*

A. *Peruvian bark.* H. *Quina; cascarilla de Ioxa.*

QUAL. Heroica: in principio adstringente resinoso et amaro mixto residens; sapor tenacissime amarus, substypticus.

VIRT. Antiseptica; roborans; adstringens; stomachica.

USUS. Febres atonicæ, putridæ, intermittentes, remittentes; asthenia; ataxia; spasmi; pertussis; tabes pituitosa; diarrhœa; scrophula; gangræna; sphacelus; ulcera phagedænica; arthrodynia a debilitate *Internus et externus*: forma pulveris; extracti; electuarii; infusi in aqua calcis, alcohole, vino, aqua; decocti; tincturæ; fots; cataplas-malis; enematis: *Pulv. externus* frictione cum

saliva ventri adplicatus in junioribus, omni bihorio vel trihorio tempore remissionis vel intermissionis.
DOSIS *pulveris*: gran. xv—xxx ad drach. j. *Extracti*: drach. semis ad scrup. ij. In infuso vel decocto unc. j ad libr. j aquæ.

CINCHONA TECAMEZ.

Cortex.

*Arborea; Amer. merid.***OF.** *Cortex Tecamez.*

QUAL. *Cort. pulv.* Lutescens; odor aromaticus; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Aphrodisiaca?**USUS** *decoctive* *infusi*: Asthenia ex gonorrhœa vera.**CINERARIA SIBIRICA.** Radix recens.**CL.** *Syng. O. Polyg. superfl.***USUS.** Anaphrodisia ex ebrietate (PALLAS).**CISSAMPELOS CAAPEBA.** Radix.**QUAL.** Mucilaginosa.**USUS.** Dysuria; stranguria; morsura serpentum.**CISSAMPELOS PAREIRA.** Radix.**CL.** *Dicæc. O. Monadelph. Perennis; Amer. merid.*

N. B. AUBLET refert radicem *Abutæ rufescentis* hanc radicem virtute æmulare.

OF. *Pareira brava; Butua. A. Cissampelos.***QUAL.** Sapor amaro-dulcis.**VIRT.** Eximia: diuretica; alterans.

USUS *infusi*: Morbi pituitosi; dysuria; calculus urinarius; icterus; arthritis.

DOSIS. Unc. j ad libr. ij aquæ ad colat. libr. j hujusque unc. ij ter die.

CISTUS CRETICUS. Succus resinosus ex
foliis exsudans.

Cistus Ladaniferus (Hort. Kew.).

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Fruticosa*; *Europ. austr.*

OF. *Ladanum*; *gummi-labdanum*; *cistus creticus*.

A. *Gum-cistus*.

QUAL. Resina amara; grisea; fumo grato.

VIRT. Stimulans; aromatica.

USUS *externus* ad emplastra; suffimigia.

CITRUS AURANTIUM. Fructus recens;
cortex flavus fructus; folia; flores.

CL. *Polyadelph.* O. *Icosand.* *Arborea*; *Europ.*
austr.

N. B. Duæ varietates.

OF. *Flavedo corticum aurantium*; *folia*; *flores*
naphæ; *fructus aurantii dulcis & amari*; *aurantia*
hispaniensia, *curassavica*. G. *Oranges*. G. *Pome-*
ranzen. A. *Seville & china orange-tree*.

QUAL. *Corticis florum et foliorum*; odor fragrans; sa-
por aromatico-amarus. *Succi*: Acidulo-dulcis, vel
amaro-dulcis.

VIRT. Nervina; stimulans; stomachica. *Succi*: re-
frigerans.

USUS *corticis* forma pulveris, infusi, tincturæ:
Dyspepsia; intermittentes; menorrhagia? *Fo-*
liorum: *Chorea*; *epilepsia*; *convulsio*; *hys-*
teria.

DOSIS *pulveris corticis*: drach. ℞. *Foliorum*:
drach. ℞-j ter quaterve de die.

PRÆP. Aqua destillata ; oleum volatile florum
vulgo *oleum Naphæ* ; tinctura ; conditum ; sy-
rupus corticis : oleum corticis volatile expressione
paratum vulgo *oleum Bergamotte*.

CITRUS MEDICA. Fructus ejusque suc-
cus ; cortex flavus fructus.

Varietas : *citrus limonia*. *Arborea ; Europ. aust.*

OF. *Succus ; flavedo limoniorum*. s. *Citri*. G. *Citro-
nier ; citrons*. G. *Zitronen*. A. *Lemon-tree &
lime-tree*.

QUAL. *Fructus* : Sapor acidus. *Corticis* : Sapor
amarus, aromaticus.

VIRT. *Succi* : Refrigerans ; antiseptica. *Corticis* :
Stimulans ; stomachica.

USUS *Succi* : Scorbutus ; febres. *Corticis* : dyspepsia.

PRÆP. *Succus* ; oleum volatile corticis destillatione
obtentum ; oleum volatile incisione et expres-
sione corticis obtentum, vulgo *oleum seu essentia
de Cedro* ; confectio seu conditum corticis et
carnis fructus ; acidum citricum.

CLEMATIS RECTA. Herba cum floribus.

CL. *Polyand*. O. *Polyg*. *Perennis*.

OF. *Flammula Jovis*. G. *Clematite*. G. *Brennkraut ;
aufrechte waldrebe*. A. *Upright virgins-bower*.

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Corrodens ; vesicans ; diuretica.

USUS *infusi vel extracti* : Exostosis syphilitica ?

Pulveris externus : Ulcera syphilitica, cancrosa,
phagedænica ? *Infusi forma lotionis* : Psora re-
bellis.

DOSIS *herbæ cum floribus siccatae* : drach ij-iiij ad
℥j aquæ.

PRÆP. Extractum foliorum recent. g. j. - iiij.

CLEMATIS VITALBA.

Folia.

CL. & O. *præced.* Perennis ; sarmentosa ; Europ.

OF. *Vitalbæ folia*. G. *Herbe aux gueux*. A. *Common virgins-bower*, or *travellers joy*.

QUAL. In principio acri residens ; sapor acidus ,
subdulcis , stypticus.

VIRT. Adstringens ; corrodens ; diuretica.

USUS *infusi* ; Hydrops. *Externus succi oleo excepti* :
Psora.

COCHLEARIA ARMORACIA. Radix re- cens ; ejusque succus expressus.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.* Perennis ; hortensis ,
ad rivos & in locis humidis.

OF. *Raphanus rusticanus* ; *armoracia*. G. *Cran* ; *rai-
fort*. G. *Meerrettich*. A. *horse-raddish*.

QUAL. Eximia : in principio acri volatili residens.

VIRT. Emetica ; diuretica ; antiscorbutica ; rube-
faciens.

USUS. Cachexiæ ; quartanæ ; scorbutus ; hydrops ;
asthma pituitosum ; paralysis ; arthodynia rheu-
matica ; paraphonia.

DOSIS *radicis recentis rasæ* : ℥j-ij. *Succi ex-
pressi* : ʒ β. in haustu vini.

PRÆP. Succus ; aqua destillata ; alcohol ; infusum ,
aquosum et vinosum.

COCHLEARIA OFFICINALIS. Herba recens; ejusque succus expressus.
 CL. & O. *Præced.* *Annua; ad littora maris; hortensis.*

OF. *Cochlearia hortensis.* G. Cranson; herbe aux cuillers. G. Læffel-kraut. A. Common Scurvygrass.

QUAL. *Herbæ recentis*: Eximia; in principio acri volatili residens; sapor acris.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica; alterans.

USUS *herbæ & succi*: Scorbutus; cachexiæ.

PRÆP. Conserva; succus; aqua destillata; alcohol; ¹syrupus.

DOSIS *succi*: unc j-ij-ij. Conservæ drach. j-ij.

COCOS EUTYRACEA. } Oleum fixum fructus.
 ———— **NUCIFERA.** }

OF. *Oleum palmæ.*

Palmæ.

QUAL. et VIRT. Eadem ac aliorum oleorum fixorum.

USUS. Fissura; perniones; tumores; nodi podagrici; ventris tumor durus: Pro injectionibus anatomicis per se vel cum tertia aut quarta parte ceræ mixtum.

COFFEA ARABICA. } Semina.
 ———— **OCCIDENTALIS.** }

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Arab. & Ind. occident.*

OF. *Coffea semina.* G. *Caffier.* G. *Caffè.* A. *Coffèe-tree.*

QUAL. *Semen. ustulatorum* : Fragrans ; aromatica.
 VIRT. Excitans ; nervina ; calefaciens ; carminativa.
 USUS *decocti seminum crudorum* : Catharrhus ; rheu-
 mata ; amenorrhœa suppressionis ; diarrhœa.
Infusi seminum ustulatorum : Sopor ; cardialgia ;
 cephalalgia ; obstipatio ; Polysarcia. *Infusi saturati*
 Unc. j. ad aquæ unc. iij-iv haustus omni semi hora
 repetendus : asthina spasmodicum (PRINGLE).
Pulveris drach. vj cum unc. iij aut iv aquæ coctæ
 ad dimidium ; hocque cum anatica portione
 succi citri mixtum calide in intermittentibus
 die apyrexiaë jejuno stomacho ebibendum in
 lecto.

PRÆP. Semen ustulatum pro infuso.

COLCHICUM AUTUMNALE. Radix.

CL. *Hexandr. O. Trigyn.* Perennis ; in pratis
 humidis.

OF. *Colchicum.* G. *Colchique* ; mort aux chiens.

GE. *Zeitlozen* ; wiesen-safran. A. *Common
 meadow-saffron.*

QUAL. In principio acri residens ; odor graveolens ;
 sapor intense acris, nauseosus.

VIRT. Narcotica ; drastico-cathartica ; phthyriaca ;
 diuretica.

USUS. Hydrops.

PRÆP. Acetum ; oxymel.

COLCHICUM ILLYRICUM. Radix.

(GRONOVII et FÆRSKAL).

OF. *Radix hermodactyli.*

QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT.

USUS.

COLLINSONIA CANADENSIS. Radix.

CL. *Diand. O. Mong. Perennis; Americ. septent.*

A. Nettle leaved collinsonia.

QUAL. Odor nidorosus.

VIRT.

USUS. Colica lochialis,

COLUMBO.

Obscura.

Vid. Radix Columbo. p. 190.

CONESSI CORTEX.

Obscura.

Arbor. Ind. orient.

QUAL. Austero-amara.

VIRT.

USUS. Dysenteria (præmissis præmittendis); diarrhœa.

DOSIS. *Pulveris* : Drachma semis bis terve de die.

CONFERVA HELMINTHOCORTON.

N. B. Non est substantia vegetabilis ut hactenus creditum fuit sed Nidus zoophyti (species polypi marini).

Vid. Corallina officinalis, p. 256.

CONFERVA RIVULARIS.

QUAL. Magnam gazis oxygenii quantitatem præcipue hyeme exhalans.

CONIUM MACULATUM.

CL. *Pentand. O. Digyn. Biennis; in desertis umbrosis humidis.*

N. B. Caute a cicuta virosa, æthusa cynapioides

chærophyllo sylvestri , temulento et bulboso nec non a tordyllo anthrisco distinguenda.

N. B. Conii maculati character est semen in uno latere striis nitide serratis notatum.

OF. *Cicuta major* s. *Vulgaris*. G. *Ciguë ordinaire*. G. *Schierling*. A. *Common hemlock*. H. *Conio mauchado ; cicuta*.

QUAL. *Recentis* : Venenata ; in principio narcotico et acri residens ; odor teter ; sapor acris , nauseosus.

VIRT. Narcotica ; diuretica.

USUS *externus* forma pulveris et cataplasmatibus : Scirrhus ; ulcus phagedænicum ; scrophula ; tabes scrophulosa ; caries ; pertussis ; tinea ; tumor testiculi ; tumor prostatae.

DOSIS *pulveris vel succi inspissati* : gran. j. ascendendo gradatim ad gran. xx. de die.

PRÆP. Succus foliorum recentium expressus et inspissatus vulgo *extractum cicutæ*.

CONVALLARIA MAJALIS. Flores.

CL. *Hexandr. O. Monog.* Perennis.

OF. *Lilium convallium*. G. *Muguet de mai*. G. *Mayblumen*. A. *Maylilly* or *sweet scented lily of the vally*.

QUAL. *Recentis* : Odor fragrans ; sapor amarus , acris , nauseosus.

VIRT. Errhina ; narcotica ; antispasmodica ; cathartica.

USUS. Epilepsia ?

CONVALLARIA POLYGONATUM.

Radix.

CL. & O. *præced.**Perennis.*OF. *Sigillum salomonis.* A. *Common salomon's seal.*QUAL. *Fatua; mucilaginoso.*VIRT. *Cosmetica?*

USUS.

CONVOLVULUS JALAPPA. Radix.

CL. *Pent. O. Monog.**Mexicana.*OF. *Jalappa.* G. *Jalape.* G. *Jallapwûrzel.* A. *Jalap bindweed; jalap.* H. *Jalapa.*QUAL. *In principio resinoso acri residens; odor ingratus; sapor nauseosus.*VIRT. *Cathartica. Resinæ: Drastica; anthelmintica-*USUS: *Vermes; obstipatio; physconia abdom.*DOSIS *pulveris: Drach β - ʒij pro adultis.*PRÆP. *Resina; tinctura resinæ.*CONVOLVULUS SCAMMONIA. Succus
radicis gummi-resinosus inspissatus.N. B. *Optimus incisione radicis; vilior expressione aut decoctione plantæ obtentus.*CL. & O. *præced.**Perennis; Syriæ.*OF. *Scammonium.* G. *Scamonee d'Alep.* G. *Skamonien.* A. *Scammony bindweed.*QUAL. *In succo lacteo acri et principio resinoso cum pauco gummoso residens; sapor acris, amaricans; odor nauseosus.*

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS.

DOSIS : Gran. v-x-xx.

PRÆP. Resina cum extracto glycyrrhizæ mixta
vulgo *diagridium*.

CONVOLVULUS SEPIUM. Succus herbæ
expressus et inspissatus.

OF. *Convolvulus major albus*. A. *Great bindweed*.

QUAL. et VIRT. Scammonium æmulans.

DOSIS : Gran. xx-xxx.

CONVOLVULUS SCOPARIUS. Lignum;
Frutic. insul. Barrancas.

AN lignum Rhodium verum?

CONVOLVULUS SOLDANELLA. Herba.
CL. & O. *præced.* *Ad littora maris Europæ.*

OF. *Soldanella*; *Brassica marina*. G. *Soldanelle*;
choux marin. A. *Sea bindweed*.

QUAL. In succo lacteo acri residens; sapor acis,
amaricans, nauseosus

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS. Hydrops.

DOSIS : ʒj.

CONVOLVULUS TURPETHUM. Radix.
CL. & O. *præced.* *Perennis; Indica.*

OF. *Radix turpethi*. G. *Racine de turbith*. A. *Squarre
stalked bindweed*.

QUAL. In principio resinoso acri residens; sapor
subinsipido-acris, nauscosus.

VIRT. Cathartica.

USUS.

COPAIFERA OFFICINALIS. Resina liquida incisione arboris obtenta (*vulgo Balsamum*).

CL. *Decand. O. Monog.* *Arborea; Americ. merid.*OF. *Balsamum copaivæ. s. de copaiba. G. Baume de copahu. G. Kopaiva balsam. A. Balsam of capivi.*

QUAL. Liquido-tenax; flavescens; in principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris, amaricans; urinam amaram reddens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS: Blennorrhœa; leucorrhœa; morbi pulmonum, renum et hepatis pituitosi, atonici; circumcisio.

DOSIS: Gutt. xxx-xl. bis de die in haustu aquæ vel in vitello ovi.

CORDIA MYXA. Fructus (*Drupa*).

CL. *Pentand. O. Monog.* *Arbor.; Ægypt.; Ind.*OF. *Sebesten. A. Smooth leaved cordia.*

QUAL. Dulcis; mucilaginosus.

VIRT. Nutriens; lubricans.

USUS: Raucedo; tussis; stranguria.

CORIANDRUM SATIVUM. Semen.

CL. *Pentand. O. Dygin.* *Annua.*

OF. *Semen coriandri. G. Coriandre. G. Koriandersaamen. A. Common coriander. H. Cilantro sativo.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus; sennæ odorem et saporem ingratum egregie mitigans.

VIRT. Hypnotica; lactifuga; carminativa.

USUS. Cum infuso sennæ.

DOSIS : Drach. j.

CORIS MONSPELIENSIS. Herba.

CL. *Pentand. O. Monog. Biennis; Europ. austr.*

QUAL. Præstans : sapor intense amarus; nauseosus.

USUS. Syphilis?

CORTEX ANGELINÆ. Obscura.

Insul. Grenad.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS : Lumbrici.

DOSIS : ʒ j ad ℥ ii j aquæ ad colat. ℥ j. Cujus uncia una alterave exhibetur omni mane.

CORTEX ANGUSTURÆ. Obscura.

Insul. Trinit.; Florid.

Vide BRUCEA.

CORTEX BELA-AYE. Obscura.

Arbor. Madagascar.

QUAL.

VIRT.

USUS. Diarrhœa; dysenteria; hæmorrhœa.

DOSIS. ʒ j-iß mane et vesperi.

CORTEX CHINÆ FLAVUS. Obscura.

GE. *Cortex Chinæ regius.*

Amer. merid.

QUAL. Sapor intense amarus ; substypticus.

VIRT. Roborans; stomachica.

USUS. Intermittentes.

CORTEX. CHINÆ RUBER. Obscura.
Amer. merid.

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS. Intermittentes.

CORTEX CHINÆ SURINAMENSIS. Obscura.
Surinam.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CORTEX JUBABÆ. Obscura.
Ind. orient.

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Nervina?

USUS.

CORTEX LAVOLA.	Obscura.
QUAL.	
VIRT.	
USUS.	

CORTEX MASOY. Obscura.
 Nov. Guinea.

QUAL. Odor gratus.

VIRT.

USUS *externus* : Tormina ventris.

CORTEX POCGEREBÆ. Obscura.
QUAL. Styptica; subamaræ.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; dysenteria.

CORYLUS AVELLANA. Oleum fixum
nuclei expressum.

CL. *Monœc. O. Polyand.*

Fruticosa.

OF. *Coryli s. Avellanæ nuces. A. Common hazelnut-tree.*

QUAL. Oleum fixum, ægre rancescens, inodorum; hinc odoribus excipiendis aptum.

COSTUS. ARABICUS. Radix; Cortex
Radicis.

CL. *Monand. O. Monog.*

Perennis; Ind. orient.

& occident.

OF. *Costus arabicus; costus dulcis & amarus. A. Arabian costus.*

QUAL. In extractivo amaro et oleo volatili residens; sapor amaricans, aromaticus; odor fragrans; urinam violaceo odore imprægnans.

VIRT. Stimulans; calefaciens; menagoga.

USUS: In ollicinis sæpe cum canella alba confunditur.

DOSIS *pulv.* drach. semis; pro infuso unc. semis
ad ℥j aquæ.

CRAMBE ORIENTALIS. Radix recens.

CL. *Tetradyn. O. Siliqu.*

Perennis.

OF. *Crambe. A. Colewort.*

QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT. Antiscorbutica.

USUS.

CROCUS SATIVUS. Stigmata pistilli.

CL. Triand. O. Monog. Alpina; Europæ austr.
hortensis.

Variet. A. officinalis autumnalis.

OF. *Crocus austriacus* s. *orientalis*. G. *Saffran*. G.
Saffron. A. *Saffran*. H. *Azel fran cultivado*.QUAL. Luteo-tinctoria; in oleo volatili et principio
narcotico et resinoso residens; odor fragrans,
virens; sapor subaromaticus.VIRT. Sedativa; hypnotica; leviter stimulans;
antispasmodica; menagoga.USUS: Amenorrhœa atonica; colica lochialis;
pneumonia notha; vomitus. Externus: Ophthal-
mia.DOSIS pulveris: gran. x-xx-xxx. Tinct. 3ß. Ex-
tracti gran. xv.

PRÆP. Tinctura; syrupus; extractum.

CROTON CASCARILLA. Cortex.

Croton linearis (Hort. Kew.).

CL. Monœc. O. Monadelph. Arborea; Americ.
meridion.OF. *Cortex cascarillæ* s. *Eleutheriæ*. G. *Chaquerille*.
G. *Kaskarilrinde*. A. *Cascarilla* or *Willow leaved*
croton.QUAL. In oleo volatili et extractivo amaro resi-
dens; sapor aromaticus, amarus, subacris; odor
fragrans, fumo moschato.

VIRT. Roborans ; stimulans.

USUS : Dyspepsia ; diarrhœa ; febres intermittentes et remittentes biliosæ.

DOSIS *pulveris* : Gran. x-xxx. Pro infuso aquoso vel vinoso drach. j. ad ℥j. *Extracti* : Drach. j.

PRÆP. Tinctura ; extractum.

CROTON LACCIFERUM. Substantia resinosa (*Nidus insecti*).

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Ind. orient.*

N. B. Succus resinosus ex hac arbore æque ac ex fico religiosa et indica ; nec non ex arbore plasonis et rhamno jujuba , punctura insecti COCCUS LACCA dicti exsudans ; ejusque nidulum constituens.

OF. *Lacca s. gummi lacca.*

QUAL. Resina rubro tinctoria ; substyptica.

VIRT. Subastringens ; diuretica.

USUS. Lacca sigillatoria ; vernices. *Tincturæ* : Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

CROTON TIGLIUM. Semen ; lignum.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Zeylanica.*

OF. *Grana tiglii s. tilli* : *Lignum pavanæ s. Moluccense.*

QUAL. Venenata , acerrima. Semen decoctum oleum fixum, sine acri, continet.

VIRT. Drastico-cathartica ; emetica ; diuretica ; exurens.

USUS.

CROTON TINCTORIUM. Fæcula.

CL. & O. præced. *Annua; Europ. austr.*OF. *Lacmus*. G. *Tournesol*. A. *Officinal croton*.

QUAL. Cærulea, tinctoria.

USUS chemicus pro reagente.

CUCUMIS COLOCYNTHIS. Fructus; pulpa.

CL. *Monæc.* O. *Digyn.* *Annua; Asiatica; Hispan.*OF. *Colocynthides*. G. *Coloquinte*. G. *Koloquinten*.A. *Bitter cucumber or gourd*. H. *Pepinera col-
quintida*.QUAL. Odor nauseosus; sapor amarissimus, nau-
seosus.VIRT. Eximia: Diuretica; deobstruens; drastico-
cathartica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Physconia; hydrops; obstipatio; epilepsia.

DOSIS: *Intern.* gran. $\frac{1}{8}$. *Pulpæ* gran. xxx ad ℥ß
aquæ decoct. pro enemate.PRÆP. Extractum cum mucilagine gummi traga-
canthæ tritum, vulgo TROHISCI ALHANDAL;
resina.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

CUCUMIS MELO. Semen.

CL. & O. præced. *Annua; hortensis.*OF. *Semen melonum*. G. *Semence de melon*. G. *Melo-
nen-kerne*. A. *Common melon*.

QUAL. Oleosa; subdulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS forma emulsionis: Febres; stranguria.

CUCUMIS SATIVUS.

Semen.

CL. & O. præced.

*Annua ; hortensis.*OF. *Semen cucumis.* G. *Concombre.* GE. *Gurken-saamen.*A. *Common cucumber.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CUCURBITA LAGENARIA.

----- PEPO.

----- CITRULLUS.

} Semen.

CL. *Monæc.* O. *Syng.**Annua ; hortens.*OF. *Semen cucurbitæ.* G. *Semence de courge ou potiron.* GE. *Kürbis-kerne.* A. *Bottle gourd ; pompion, or pumpkin gourd ; & water melon.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CUMINUM CYMINUM.

Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.**Annua ; Europ. austr.**Ægypt.*OF. *Semen cumini.* G. *Cumin officinal.* GE. *Ræmischer kümel ; kronkümel.* A. *Cumin.*

QUAL. Præstans : odor fragrans ; sapor acris , aromaticus.

VIRT. Stimulans ; carminativa.

USUS. Colica flatulenta ; tympanitis ; tumores frigidi.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS. Strobuli ; folia.

CL. *Monæc.* O. *Monadelp.**Arborea ; Asiatica.*OF. *Folia cupressi ; nnces s. Galbuli cupressi s. Cy-*

pressi. G. Cyprès. G. Zipressenbaum. A. Upright cypress-tree.

QUAL. Amaro-styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

CURCUMA LONGA.

Radix.

CL. *Monand. O. Monog. Perennis ; Indica.*

Amomum curcuma (JACQUIN).

OF. *Curcuma vulgo terra merita. G. Curcuma. G. Gelb-wurzel ; kurkuma-wurzel. A. Long rooted Turmeric.*

QUAL. In principio extractivo et paucō oleo volatili residens ; sapor amarus , subaromaticus ; urinam luteo colore tingens.

VIRT. Tinctoria ; menagoga ; diuretica ; deobstruens.

USUS *internus* : intermittentes ; physconia abdomin. ; icterus ; morbi cutis.

DOSIS *pueris* scrup. ij-drach j. In *infuso* : drach ij ad ℥j aquæ.

CUSCUTA EPITHYMUM.

Herba.

CL. *Tetrand. O. Digyn. Parasitica lupuli , dulcamaræ , Cannabis.*

QUAL. Odor et sapor thymi ; sed debilior.

VIRT. Debilior sequenti.

CUSCUTA EUROPÆA.

Herba.

Parasitica ; annua.

OF. *Cuscutæ herba. G. Cuscute. A. Dodder.*

QUAL. Inodora ; amaricans ; subacris.

VIRT. Deobstruens.

USUS. Physconia abdomin. ; intermittentes.

CYCLAMEN EUROPÆUM. Radix recens.

CL. Pentand. O. Monog. Perennis ; Hungar ; Austriæ ;
in locis umbrosis , nemorosis.

OF. Cyclamen ; arthanita. G. Saubrod ; erdscheibe.

A. Common European cyclamen.

QUAL. Radicis recentis : In principio acri volatili
residens , siccatione avolans ; sapor primo mucilaginosus ; dein acris , urens , amaricans ; assatæ :
Esculenta.

VIRT. Drastico-cathartica ; menagoga ; anthelminthica ; resolvens.

USUS : Scirrhus ; tumores frigidi ; pernio ; vermes.

DOSIS : Drachm j.

PRÆP. Unguentum de arthanita.

CYNARA SCOLYMUS.

Folia.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. Annuæ ; hortensis.

OF. Cynara hortensis. G. Artichaut. G. Artitschoken.

A. Artichoke.

QUAL. Oleracea.

VIRT. Diuretica ?

USUS. Hydrops.

DOSIS succi : ʒ ij-iiij in haustu vini generosi.

CYNOGLOSSUM OFFICINALE. Herba ;
Radix.

CL. Pentand. O. Monog. Biennis ; in viis &
cimeteriis.

OF. *Cynoglossum*. G. *Cynoglosse*. GE. *Hundszungenwurzel*. A. *Officinal hound's tongue*.

QUAL. Odor graveolens; sapor mucilaginosus.

VIRT. Subnarcotica; phthiriaca.

USUS.

CYNOMORIUM COCCINEUM.

CL. *Monæc*. O. *Monand*. *Plantarum maritimarum parasitica; Afric.; Sicil.; Jamaic.*

OF. *Fungus Melitensis*.

QUAL. Nigra; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti internus*: Hæmorrhagiæ; dysenteria atonica; ulcera. *Externus*: Ulcera phagedænica.

DOSIS *pulveris*: Gr. xx ad drach. j.

CYPERUS LONGUS.

Radix.

CL. *Triand*. O. *Monog*. *Perennis; Europ. austr. Syriæ; in locis humidis.*

OF. *Cyperus longus*. G. *Souchet*. GE. *Zyperwurzel*.
A. *Cyperus*.

QUAL. Odor fragrans; sapor grate aromaticus, calidus.

VIRT. Diuretica; menagoga.

USUS. Ulcera vesicæ, uteri, oris?

CYPERUS ODORATUS. } ————— ROTUNDUS. }

Radix.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

CYTINUS HYPOCISTIS. Succus bacca-
rum expressus, inspissatus.

CL. *Gynand. O. Dodecand. Annuā ; parasitica ;*
Europ. austr.

OF. *Hypocistidis succus. GE. Hypoxisten-saft.*

QUAL. Sapor acido-austerus, stypticus; alcohole
solubilis.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia.

CYTISUS LABURNUM.

Cortex.

VARIETAS : *Alpinus.*

CL. *Diadelph. O. Decand. Arborea ; alpina ;*
hortensis.

A. *Common laburnum ; cytiscus alpinus.*

QUAL.

VIRT. Menagoga.

USUS *decocti* : Amenorrhœa.

D.

DAPHNE GNIDIUM.

Semen.

CL. *Octand. O. Monog.*

Fruticosa.

OF. *Semen coccognidii ; granum gnidium. A. Flax-*
leaved daphne.

QUAL. Venenata.

VIRT.

USUS.

DAPHNE LAUREOLA.

Cortex radicis.

OF. *Cortex mezerei. G. Garou ; bois gentil. A. Com-*
mon daphne, or spurge laurel.

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

USUS præcipuus corticis recentis aceto emolliti loco vesicantis.

PRÆP. Unguentum ad fonticulos.

DAPHNE MEZEREUM. Cortex radicis.

CL. & O. præced.

Fruticosa.

OF. *Cortex laureolæ. s. Mezerei. G. Mezereum; faux garou. G. Kellerhals; seidelbastrinde.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; sapor acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diuretica.
Extern. : Corrodens; vesicans.

USUS *decocti corticis* : Ulcera maligna; morbi cutis et ossium syphilitici. *Externus* forma cataplasmatibus : Scirrhus; orchiochele; lepra.

DOSIS : Drach ij corticis radicis (vel $\frac{3}{8}$ radicis) concisi cum portione æquali glycyrrhizæ in ℥iij aquæ coquendo ad colat. ℥ij.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

DAPHNE THYMELÆA.

Radix.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

DATISCA CANNABINA.

Herba.

CL. *Diæc.* O. *Dodecand.*

QUAL.

VIRT.

USUS. *pulveris* (loco *cinchonæ*) : Intermittentes.

DOSIS : Gran. xx-xxx ; repetendo hanc dosim ter quaterve tempore apyrexiae.

DATURA STRAMONIUM. Semen; folia; succus foliorum expressus et inspissatus.

CL. *Pentand. O. Monog. Annua; in locis desertis, arenosis.*

OF. *Stramonii herba; daturæ semina. G. Endormie commun; pomme épineuse. G. Stechapfelkraut. A. Common Thornapple.*

QUAL. Venenata; in principio acri, narcotico residens; odor virosus; sapor nauseosus, amarus. *Seminis* : insipida.

VIRT. Narcotica interne vel externe applicata; dementans.

USUS *succi inspissati* : Melancholia; mania post puerperium; epilepsia; amentia; carcinoma; varix ani; combustura.

DOSIS : gran. $\frac{1}{4}$ ad gran. j-vj.

N. B. Antidotum ejus est acidum acetosum, vel acidum citricum.

DAUCUS CAROTA. Radix recens; folia; Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn. Biennis.*

OF. *Daucus sativus. G. Carote. G. Gelbe Mæhren; gelbe Rüben. A. Wild carrot. H. Zanahoria.*

QUAL. *Radicis* : In principio mucilaginoso-saccharino residens; sapor dulcis, mucilaginosus.

Seminum. : odor fragrans ; sapor aromaticus , amaricans.

VIRT. *Radice* : Demulcens ; antiseptica ; *seminum* : stimulans ; anthelminthica ?

USUS *radicis rasæ forma cataplasmatidis* : ulcera phagedænica , putrida . herpetica ; carcinoma. *Decocti radice* : Stranguria.

DELPHINIUM CONSOLIDA. Flores.

CL. *Polyandr.* O. *Trig.* *Annua.*

OF. *Flores calcitrappæ ; consolida regalis.* GE. *Rittersporn.* A. *Branching larkspur.*

QUAL. Cærulea.

VIRT.

USUS.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA. Semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis ; in montibus Europ. austr.*

OF. *Staphisagria.* G. *Staphisaigre.* GE. *Stephanshraut ; Lauskærner.* A. *Palmated larkspur or stavesacre.*

QUAL. Præstans : Sapor amarus , acris , nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica ; anthelminthica ; phthiriaca.

USUS *pulveris* : Pediculi ; acari subcutanci ; odontalgia.

PRÆP. Unguentum.

DENTARIA PENTAPHYLLOS. Radix.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.* *Alpina ; Europ. austr.*

OF. *Dentaria minor.* GE. *Zahnwurz.* A. *Fire leaved Toothwort.*

QUAL. In principio acri volatili residens; sapor acris, nauseosus ut cochleariæ armoraciæ.

DIANTHUS CARYOPHILLUS. Petala.

CL. Decand. O. Digyn. Annuæ.

OF. Flores tunicæ hortensis; caryophilla rubra. G. *Œillet giroflée*. GE. Grasblumen; nelkenblumen; gartennelken. A. Clovepink, or clove july flower.

QUAL. Odor fragrans.

DICTAMNUS ALBUS. Radix.

CL. Decand. O. Monog. Perennis.

VARIET. A. *Flore niveo*. B. *Flore rubro*.

OF. *Dictamnus albus s. fraxinella*. G. *Dictame; fraxinelle*. GE. *Weisser diptam*. A. *White dittany et red fraxinella*.

QUAL. *Radicis recentis*: Odor ambrosiacus; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Nervina; anthelminthica; menagoga.

USUS. Epilepsia; ataxia; leucorrhœa; vernies.

PRÆP. Tinctura gutt. xx—1 ter die.

DIGITALIS PURPUREA. Folia.

CL. Didyn. O. Angiosp. Biennis; in sylvis.

N. B. Tempore quo flores erumpunt colligenda, et caute siccanda.

OF. *Digitalis purpurea*. G. *Grande digitale*.

GE. *Fingerkraut* ; *fingerhut*. A. *Purple Fox-glove*.
H. *Dedalera purpurea* ; *qualda perra*.

QUAL. Venenata : Sapor acris, amarus, nauseosus.
VIRT. Motum systematis arteriosi mire retardans,
minuens ; diuretica : *Majori dosi* emetica ; drastico-
cathartica.

USUS *internus forma pulveris, infusi vel tincturæ* :
Hydrothorax (WITHERING), aliæve hydropis
species ; hæmophthisis ; phthisis incipiens ; tabes
ex pure absorpto ; asthma spasmodicum (cum
opio) FERRIAR ; catarrhus ; rheumatismus acu-
tus ; cynanche trachealis seu stridula aut polyposa
infantum (anglis *Croup*) ; phlegmasiæ variæ ; ne-
phritis calculosa ; dysuria ; palpitatio ; pertussis ?
mania ex sero effuso ; epilepsia ; scrophula ?
N. B. Quandoque juvat dare cum opio, aut pro
re nata, cum muriate hydrargyri et pulvere sudo-
rifico DOVERI in morbis inflammatoriis variis.
Externus infusi, forma lotionis s. injectionis :
Herpes ? erythema ; pustulæ faciei etc. ? blen-
norrhagia ?

DOSIS. *Pulveris* : Gran. semis—j bis terve de die
pro adultis. Pro *infuso* drachm. j foliorum sic-
catorum ad uncias viij aquæ fervidæ per quadri-
horium digerendo et colat. addendo unc. j. aquæ
aromaticæ cujusdam ; dosis unc. j bis de die,
quæ est dosis media pro adulto (multis unc. semis
bis de die sufficit). *Tincturæ* gutt. xx-xxx bis de
cum unc. j aquæ cujusdam aromaticæ vel infusi
cujusdam amari.

DOLICHOS SOJA.

Faba.

CL. *Diadelph. O. Decandr.**Ind. orient.*

QUAL. Subdulcis ; farinacea.

USUS. Culinaris.

DOLICHOS URENS.

PRURIENS.

} *Vid. Labradia.*

DORONICUM LATIFOLIUM.

PARDALIANCHES.

} Radix.

CL. *Sing. O. Polyg. superfl.**Perennis ; alpina ,**Europ. anstr.*OF. *Doronicum.* GE. *Gemsennurzel.* A. *Great leopard'sbane.*

QUAL. Sapor dulcis , aromaticus.

VIRT. Arnica montanam æmulans.

DORSTENIA CONTRAYERVA. Radix.

CL. *Monœc. O. Diandr.* *Perennis ; Americ. merid.*OF. *Contrayervæ radix.* G. *Contrayerva.* GE. *Gisflurzel.* A. *Contrajerva.*

QUAL. Præstans : Odor subfragrans ; sapor amaricans , subaromaticus , stypticus.

VIRT. Adstringens ; antiseptica ; sudorifica ; stomachica ; stimulans.

USUS. Febres et exanthemata atonica ; dysenteria.

DOSIS *pulveris.* Gran. x ad drach. j. *Tincturæ :* drach. j—ij.

DRACÆNA DRACO. Resina.

CL. *Hexand. O. Monog. Fruticosa; Ind. orient.*OF. *Sanguis draconis. G. Sang de dragon. A. Dragon-tree.*

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; apocenosés; leucorrhœa.

DOSIS. Gran. x ad drachmam semis.

DRACOCEPHALUM CANARIENSE.

Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp. Perennis; Ins. Canar.*

N. B. Floribus spicatis; foliis compositis.

OF. *Melissa canariensis. A. Canary dragon's head; or balm of gilead.*

QUAL. Eximia : Odor intense fragrans; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Excitans; nervina; stomachica.

USUS. Cachexiæ; cephalalgia; cardialgia.

DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM.

VIRT. Multo debilior præced. *Annua.*

DRACONTIUM POLYPHYLLUM. Radix.

CL. *Polyandr. O. Polygyn. Japon.*

QUAL. Acris.

VIRT. Pellens; fortiter menagoga.

DROSERA ROTUNDIFOLIA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Tetrag.* Biennis.

OF. *Ros solis* ; *rosella*. A. *Round leaved sun-dew*,
or *rosa solis*.

QUAL. Lactescens ; sapor acris.

VIRT. Corrodens.

USUS.

E.

ECHITES SYPHILITICA. Folia ; Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* Fruticosa ; Surinam.

QUAL. Lactescens.

VIRT. Antisyphilitica ?

USUS *decotti* : Syphilis.

EPIDENDRUM VANILLA. Siliqua.

CL. *Gynand.* O. *Diandr.* Fruticosa ; parasitica.

Ind. occident.

OF. *Vanilla*. G. *Vanille*. GE. *Vanillen*. A. *Vanilla*.

QUAL. Eximia : pinguis ; odor ambrosiacus ; sapor
gratus , aromaticus.

VIRT. Stimulans ; calefaciens ; nervina ; aphrodisiaca.

USUS. Potissimum ut chocoladæ ingrediens.

DOSIS. Drach. semis.

EQUISETUM ARVENSE. Herba.

CL. *Cryptog.* O. *Filices*. Perennis.

OF. *Equisetum* ; *cauda equina*. A. *Corn horse-tail*.

QUAL.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Blennorrhœa; apocenosés; tabes? Hæmaturia?

EQUISETUM HYEMALE.

QUAL. et VIRT. Præced.

ERIGERON ACRE.

Herba.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.*

Perennis.

OF. *Coniza cærulea.* A. *Blue erigeron.*

QUAL. Sapor acris; synapim æmulans.

VIRT. Antiscorbutica.

ERVUM LENS.

Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.*

Annua.

GF. *Lens*; *lentium semen.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. ?

USUS.

ERVUM ERVILIA.

Semen.

CL. & O. præced.

Annua; *Europ. austr.*

OF. *Ervi s. orobi semen* A. *Flat-seeded tare*, or
common lentil.

QUAL. Farinacea.

VIRT.

USUS.

ERYNGIUM CAMPESTRE.

Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis*; *maritim.*

OF. *Eryngium vulgare.* A. *Chardon-roland.* G. *Mannstreu*; *brachdistel.* A. *Common Eryngo.*

QUAL. Sapor dulcescens, subaromaticus.

VIRT. Diuretica; aphrodisiaca?

USUS. Tabes pulmonalis ulcerosa.

DOSIS. Unc. semis ad ℥j aquæ pro infuso quotidie.

ERYNGIUM FÆTIDUM. Herba.

CL. & O. *Præced.*

Americ.

QUAL. Eximia: odor teter, fætidissimus, tenax.

VIRT. Cathartica; diuretica; antispasmodica.

USUS. Hysteria; hydrops.

ERYSIMUM ALLIARIA. Herba.

CL. *Tetrad. O. Siliqu. Perennis; in locis umbrosis.*

OF. *Herba alliariæ. A. Stinking hedge-mustard, or sauce-alone.*

QUAL. In principio acri residens; odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT. Diuretica; errhina; antiscorbutica.

USUS. Asthma; ulcus putridum.

ERYSIMUM BARBAREA. Folia.

CL. & O. *præced.*

Perennis.

OF. *Barbareæ folia. G. Herbe St. Barbe. A. Common winter hedge mustard or cress.*

QUAL. Sapor amarus, subacris; odor herbaceus.

USUS. Antiscorbutica.

ERYSIMUM OFFICINALE. Herba recens et fructus.

CL. & O. *præced. Annua; ad vias & in sabulosis.*

OF. *Erysimum. G. Vêlar; torterelle; herbe du chan-tre. G. Wegsensf. A. Common hedge-mustard.*

QUAL. In principio acri-residens; sapor acris.

VIRT. Adstringens; diuretica; antiscorbutica.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus.

USUS *Syrupi* egregius: Paraphonia; raucedo; tussis; ischuria?

EUPATORIUM CANNABINUM. Herba;
radix.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* Perennis.

OF. *Eupatorium.* G. *Eupatoire d'Avicenne.* GE. *Wasserdost; kunigundenkraut.* A. *Common eupatorium; or hemp-agrimony.*

QUAL. Sapor intense amarus; odor acris, penetrans.

VIRT. *Radici*: diuretica; cathartica; emetica.

USUS. Cachexiæ; hydrops; hydrocele.

EUPHORBIA CANESCENS.

CL. *Dodecand. O. Trigyn.*

QUAL. Acris.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS *Americanis*: syphilis.

EUPHORBIA ESULA. Succus foliorum
expressus.

CL. & O. *præced.* In sepibus & locis aridis.

OF. *Esula.* GE. *Wolfsmilch.*

QUAL.

VIRT.?

USUS. Icterus.

DOS. *succi* drachm. ℥-j-unc. semis omni mane.

PRÆP. Extractum-gr. viij-x.

EUPHORBIA. OFFICINARUM. Succus
gummi-resinosus incisione plantæ ob-
tentus.

CL. & O. præced.

Fruticosa.

OF. *Gummi Euphorbium.* G. *Euphorbe.* GE. *Euphor-
bienharz.* A. *Euphorbium, or officinal spurge.*

QUAL. Lactescens; in principio acri resinoso re-
sicens; sapor acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; rubefaciens;
vesicans.

PRÆP. Tinctura; emplastrum.

USUS *externus pulveris (melius tincturæ): punctura;*
caries. Emplastri: Arthrodynia rheumatica.

N. B. Euphorbiæ diversæ species qualitate et vir-
tute fere similes sunt.

EUPHORBIA LATHYRIS. Semen.

CL. & O. præced.

Biennis; Europ. austr.

OF. *Cataputia minor; purgier-kærner; spring-kærner.*
A. *Caper spurge.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; corrodens.

EUPHORBIA PALUSTRIS. Succus folio-
rum expressus et inspissatus; radix;
cortex radicis.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Tithymalus.* G. *Tithymale des marais.* GE. *Marsh
spurge.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; corrodens; vesicans.

USUS *externus* : Tinea; verruca; clavus; serpigo; odontalgia.

DOSIS succi inspissati gr. viij - xii - 3j.

EUPHORBIA PARVIFLORA. Herba.

CL. & O. *præced.*

Ind. occident.

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS decocti : Syphilis.

EUPHRASIA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.*

*Annua; in collibus
siccis, sterilibus.*

OF. *Euphrasia.* G. *Euphrase.* A. *Common eye-bright.*

QUAL. Pinguis; amaricans.

VIRT. ?

USUS. Ophthalmia.

F.

FAGARA OCTANDRA. Resina sponte, vel
incisione corticis, exsudans (JACQUIN).

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea; insulæ Curaçao.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

USUS. Ad suffumigia.

Vide etiam *Populus balsamifera.*

FAGARA PTEROTA.

Baccæ.

CL. & O. *præced.*

Arborea; Jamaic.

QUAL. Subacris; aromatica.

VIRT. Calefaciens; stomachica.

FAGARA PIPERITA. Cortex; folia; fructus.

CL. et O. *præced.*

Japon.

QUAL. Acris, aromatica.

VIRT. *Foliorum*: Vesicans.

USUS *foliorum* cum farina oryzæ in pulvem redactorum: Partibus e rheumatismo dolentibus instar vesicatorii adplicando; uti etiam hubonibus.

FERULA AMMON (A. BROUSSONET ex autopsia). Gummi-resina vulgo *Gummi ammoniacum* dicta.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

Vide Gummi-resina Ammon.

FERULA ASSA FÆTIDA. Succus gummi-resinosus, incisione radicis plantæ obtentus concretus. *Perennis; Persiæ.*

OF. *Assa fœtida*; *gummi assæ fœtidæ*. G. *Assa fœtida*. GE. *Teufelsdreck*; *etenkinder asand*. A. *Assa fœtida*.

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, nauseosus; odor alliaceus.

Ex $\frac{2}{4}$ gummi et $\frac{1}{4}$ resinæ constans.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; anthelminthica; carminativa; menagoga; deobstruens; resolvens.

USUS *internus* et *externus* forma pilularum, tincturæ, enematis, emplastri: Hysteria; convulsio; cardialgia spasmodica; colica flatulenta; tympanitis;

asthma spasmodicum; pertussis; phlyconia abdom.;
vermes; paronychia; bubo; caries.

DOSIS *pulveris*: Gran. x—xl—lx ter quaterve de die.

Tincturæ: Gutt. x—xxx—drach. duas.

PRÆP. Tinctura; emplastrum; pilulæ.

FEVILLEA TRILOBATA.

USUS. Morsura serpentum.

FICUS CARICA.

Fructus.

CL. *Polyg. O. Diæc.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Carica pinguis*; *ficus*. G. *Figues*. GE. *Feigen*.

A. *Common figue-tree*.

QUAL. Dulcis; mucilaginosæ.

VIRT. Nutricius; emollicans; maturans; obtundens;
expectorans; eccoprotica; herpetica?

USUS *decocti internus*: Rauceo; tussis; colica
pictorum; obstipatio. *Externus* in lacte decocti,
vel assati fructus forma cataplasmatidis: Odon-
talgia; phlegmone; cynanche; bubo; anthrax.

FICUS INDICA et RELIGIOSA. Gummi-resina
punctura cocci ex arbore exsudans vulgo
Gummi-lacca dicta. *Vid.* Coccus. Lacca.

Arbor. Ind. orient.

FRAGARIA VESCA. Radix; herba; fructus

CL. *Icosand. O. Polyg.* recens.

OF. *Fragaria*; *fraga*. G. *Fraisier ordinaire* s. *Fra-
gaire*; *fraises*. GE. *Erdbeeren*. A. *Strawbery*.

VIRT. Diuretica; refrigerans.

FRAXINUS EXCELSIOR. Cortex ramu-
lorum; semen; folia.

CL. *Polyg.* O. *Diacc.*

Arborea.

OF. *Cortex fraxini*. G. *Ecorce du fresne ordinaire*.

GE. *Eschenrinde*. Λ. Common ash.

QUAL. *Corticis* : Sapor amaricans. *Seminum* : aromaticus.

VIRT. *Corticis* : Antiseptica. *Seminum* : Diuretica ; aphrodisiaca ?

USUS *Corticis*, loco cinchonæ officinalis : intermit-
tentes. *Seminum* : Lithiasis? Polysarcia? *Folio-*
rum : Morsura serpentum?

FRAXINUS ROTUNDIFOLIA. } Succus sac-
charinus
Aliæque SPECIES. } ex arbore
exsudans.

CL. & O. *præced.*

Arborea; Europ. austr.

OF. *Manna*. G. *Manne*. GE. *Manna*. A. *Manna*.

QUAL. In principio saccharino mucilaginoso residens; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Eccoproptica.

usus. Obstipatio.

DOS. Unc-j. Infantibus drach. j-iiij.

FUCUS VESICULOSUS.

Cineres.

CL. Cryptog. O. Algæ.

OF. *Quercus marina*; *æthiops vegetabilis*. GE. *Varec.*

QUAL. Salina; alkalina.

USUS *Calcinati* : Bronchocele ; scrophula.

dos, Drach. j. bis de die.

FUMARIA BULBOSA. Radix.

CL. *Diadelph. O. Hexaud. Pereunis; in umbrosis.*

Variet. A. Radice cava. B. Radice non cava.

OF. *Aristolochia cava, s. fabacea. A. Hollow-rooted & solid-rooted bulbous fumitory. GE. Runde hohlwurzel.*

QUAL. Sapor amarus; debilior sequenti.

VIRT. Stomachica.

FUMARIA OFFICINALIS. Herba recens;
succus.CL. & O. *præced. Anuna; in campis.*OF. *Fumaria. G. fumeterre ordinaire. G. Erdrauch; taubenknopf. A. Common fumitory.*

QUAL. Inodora; sapor pure et intense amarus.

VIRT. Stomachica; antacida.

USUS. Dyspepsia; morbi cutis; cachexia; physconia abdominalis.

DOS. *succi herbæ recentis expressi unc. ij bis die. Extracti: Drach. j-ij.*

PRÆP. Extractum; conserva; syrupus; tinctura.

G.

GALEGA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Diadelph. O. Decand. Perennis; Europ. austr.*OF. *Galega. G. Geisraute; pestilenzkrant. A. Blue & red galega or goat's rue.*

QUAL. Sapor amaricans, mucilaginosus, subaromaticus.

VIRT?

USUS.

GALIUM APARINE. Succus ex herba,
primo vere collecta, expressus.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.*

OF. *Apparine.* G. *Gaillet crochant*; *gratteron.* A.
Goose-grass. H. *Amor de hortulano.*

QUAL. Sapor adstringens.

VIRT. ?

USUS. Scrophula; morbi cutanei?

DOS. Unc. iv bis de die.

GALIUM MOLLUGO. Herba cum floribus.

CL. *et O. præced.**Perennis.*

OF. *Galium album.* G. *Caille-lait blanc.* A. *Great
ladies bed straat.*

QUAL.

VIRT.

USUS *succi expressi*: Epilepsia.

DOSIS. Unc. v—vj mane jejuno stomacho.

GALIUM VERUM. Herba cum floribus
seu coma.

CL. *et O. præc.* *Perennis*; *in pratis et muris antiquis.*OF. *Galium luteum.* G. *Gaillet vrai*; *vrai Caille-lait.*

GE. *Waldstroh*; *Bettstroh.* A. *Yellow ladies
bed-straw.* H. *Galio verdadero*; *cuaajaleche.*

QUAL. *Recentis*: Odor fragrans; sapor adstringens.

VIRT. Coagulans lac.

USUS. Epilepsia; hæmaturia; hysteria.

GARCINIA MANGOSTANA. Cortex capsulæ; medulla.

CL. *Dodecandr.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Mangostana cortex.* A. *Breadfruit tree.*

QUAL. Styptica. *Medullæ* : Farinacea.

USUS *infusi vel tincturæ cort.* : Dysenteria; tenesmus; aphtha.

GENISTA CANARIENSIS.

N. B. LIGNUM RHODIUM non ex hac planta, ut quidam crediderunt, sed ex *Convolvulo scopario* provenire nuperrime ab A. BROUSSONET didicimus.

Vid. *Convolvulus scoparius.*

GENISTA TINCTORIA. Herba; flores; semen.

CL. *et O. præced.* *Fruticosa.*

QUAL. Luteo-tinctoria; inodora; insipida.

USUS. Hydrops.

GENTIANA AMARELLA. Herba.

CL. *Pentaud.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

OF. *Gentianella.* GE. *Hoher Himmelsstengel; herbstenzian.* A. *Autumnal gentian.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica.

USUS.

GENTIANA ASCLEPIADEA. Radix.

A. *Swallowwort-leaved gentian.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

USUS idem.

GENTIANA CRUCIATA. Radix.

A. *Crosswort gentian.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

GENTIANA CENTAUREUM. Herba; ca-
cumen.

CL. & O. præced.

OF. *Centaurium minus.* A. *Petite centaurée.* GE. *Tau-
sendguldenkraut; Fieberkraut.* A. *Centaury gen-
tian or lesser centaury.* H. *Gentiana centaurea.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis,

PRÆP. Extractum.

DOSIS. Scrup. j - drach. j.

GENTIANA LUTEA. Radix.

CL. & O. præced. Perennis; alpina.

OF. *Gentiana rubra.* G. *Gentiane.* GE. *Rother enzian.*

A. *Yellow gentian.*

QUAL. Intense et pure amara.

VIRT. Stomachica; antiseptica; anthelminthica.

USUS *extracti*: Dyspepsia; icterus; intermittentes;
physconia abdominal.; leucophlegmatia; chlo-
rosis; podagra; vermes.

PRÆP. Extractum; infusum aquosum vel vinosum.

DOSIS. ʒj - ʒj.

GENTIANA PURPUREA.

Radix.

CL. & O. præced.

Norwegica.

NORWEGIS : *Skorsite.*OF. *Radix cirsuta.* A. *Purple gentian.*

QUAL. VIRT. et USUS. Præced.

GEOFFROYA INERMIS (Hort. Kew.)

Cortex.

CL. *Diadelph. O. Decand.* Arborea ; Jamaic.GE. *Kohlbaum-rinde.* A. *Smooth Geoffroya* or *bastard cabbage-tree.*

QUAL. Odor nauseosus ; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Drastico-cathartica ; emetica ; anthelminthica.

USUS *decocti* : Lumbrici et ascarides.DOS. *pulveris corticis* : Unc j ad ℥ij aquæ coctæ ad ℥jß. -- Sumendo uncj omni hora, donec alvum movere incipiat.

GEOFFROYA SURINAMENSIS. Cortex.

QUAL.

Surinam.

VIRT. Anthelminthica efficax, ubi alia fefellerunt.

USUS Idem ac præced.

DOS. Drach. iij ad aquæ colat. ℥ viij pro adulto ; minuendo pro junioribus.

GERANIUM MOSCHATUM.

Herba.

CL. *Monadelph. O. Decand.**Annua.*

QUAL. Odor ambrosiacus, moschatus.

VIRT.

USUS.

GERANIUM ROBERTIANUM. Herba.

GA. *Herbe à Robert.* A. *Stinking crane-bill* or herb Robert.

QUAL. Odor hircinus; sapor salsus, substypticus.

VIRT. Substringens; lactifuga?

USUS. Hæmaturia: profluvia. *Externus*: Bubo; ulcera vulvæ aut mammarum; Rhagas.

GEUM RIVALE.

Radix.

CL. *Icosand.* O. *Polyg.* *Perennis*; in locis humidis, nemoros i.

OF. *Geum rivale*, seu palustre. G. *Benoîte aquatique.*

GE. *Wasser-benediktenwurzel.* A. *Water avens.*

QUAL. Præstans: sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *pulveris radicis extern.* Ulcera syphilitica.

Internus: Diarrhœa atonica; chlorosis; intermittentes.

DOS. *pulveris*: Scrup. ij-drach j. Pro decocto unc ß ad ℥j aquæ.

GEUM URBANUM. Radix; fibræ radicis (primo vere ex solo sicco colligendæ).

CL. & O. *præced.* *Perennis*; in locis umbrosis, nemorosis.

OF. *Radix caryophyllatæ* s. *gei urbani.* G. *Benoîte caryophyllée.* GE. *Benediktenwurzel*; *Nelkenwurzel.*

A. *Common avens* or herb bennet. H. *Geo domestico.*

QUAL. In principio adstringente cum pauco oleo

volatili residens; sapor subaromaticus, amaricans; odor fragrans caryophylli.

VIRT. Roborans; antiseptica; cinchonæ virtutes æmulans.

USUS. Egregius, loco cinchonæ: Intermittentes rebelles; febres atonicæ; dyspepsia; diarrhœa; amenorrhœa atonica; chlorosis.

DOS. *pulveris*: Drachj cum melle vel syrupo corticis aurantii. *Decocti aut melius iufusi*: Uncj ad ℥j aquæ.

PRÆP. Extractum; tinctura *dosi* ℥ß ter, quaterve, tempore apyrexiae.

GLADIOLUS COMMUNIS. Radix.

Variet.: A. Flore rubro. B. Flore incarnato. C. Flore albo.

CL. *Triand.* O. *Monog.* In locis memorosis.

OF. *Radix victoralis rotundæ.* G. *Allermanuharnisch.*

A. *Cornflag.*

QUAL.

USUS. Aphrodisiaca?

USUS.

GLECOMA HEDERACEA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnops.* Perennis.

OF. *Hedera terrestris.* G. *Lierre terrestre.* G. *Gundelreben*; *giudermann*; *erdepheu.* A. *Ground-ivy.* H. *Yedra terrestre.*

QUAL. sapor amaricans, subacris.

VIRT. Expectorans; roborans.

USUS *iufusi cum lacte ve. aqua*: Catarrhus atonicus; tabes ulcerosa.

GUAJACUM OFFICINALE. Lignum;
cortex ligni; succus gummi-resinosus
ex arbore exsudans, concretus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Ind. occident.*

OF. *Lignum guajacum* s. *lignum sanctum*; *Gummi guajacum*; *resina guajaci*. G. *Gayac*; *gomme guajac*. GE. *Guajakholz*; *franzosen-holz*; *guajak-gummi*; *guajak-harz*. A. *Officinal guajacum*, or *lignum vitæ*; *gum-gajac*. H. *Guajaco officinal*.

QUAL. *Cort. et ligni*: Sapor amaricans, subacris.
Gummi-resinæ: Sapor acris, pungens.

VIRT. Præstans: Stimulans; sudorifica; alterans.
Extracti: Errhina.

USUS. Syphilis; arthritis vaga; arthrodynia rheumatica et arthritica; morbi pulmonum atonici; leucorrhœa; morbi cutanei; podagra atonica, retrocedens.

DOSIS. *Ligni vel corticis ligni rasi*: In decocto unc. j ad libr. ij aquæ coct. ad colat. lib. j. — *Gummi-resinæ*: Gran. x—xx ad draeh. j forma pulveris, vel in alcohole diluto soluta.

PRÆP. Gummi-resina; extractum; tinctura; oleum volatile.

GUAJACUM SANCTUM.

VIRT. et USUS idem ac præeed.

GUILANDINA MORINGA. Lignum; fructus; oleum fructus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arbor.*; *Afric. et Ind or.*

An lignum Nephriticum et oleum Behen ex hac planta proveniunt?

OF. *Lignum nephriticum* : *Nuces behen* s. *been* s. *balani myristicæ* s. *glandes unguentariæ*.

GE. *Griesholz* : *Been-nüsse*. A. *Smooth bonduc*.

QUAL. *Ligni* : Flavopalescens, cæruleo tingens ; sapor subacris, amaricans.

VIRT. *Fructus* : Mucilaginosus ; oleosa. *Olei fructus* : Pinguis, tardissime rancescens.

USUS. *Ligni* : Nephritis calculosa ? Psora.

PRÆP. Tinctura ; oleum fixum *Behen* dictum.

GUMMI-RESINÆ seu extractivo-resinæ.

GUMMI-RESINA AMMON.

Vid. *Ferula ammon*, p. 91.

N. B. Plantam hactenus obscuram, quæ *Gummi ammoniacum* dictum largitur, esse *Ferulæ* speciem dubitare amplius non sinunt Plantulæ plures e seminibus a Dno A. BROUSSONET, ex Africa transmissis in horto Dni CELS, Parisiis elevatae, quæ hac æstate læte viguerunt.

OF. *Gummi ammoniacum*. G. *Gomme ammoniacque*.

GE. *Ammoniak-gummi*. A. *Gum-ammoniac*.

QUAL. Odor alliaceus, ingratus ; sapor nauseosus, amarus, acris (quandoque caliginem inducens WICHMANN).

VIRT. Stimulans ; antispasmodica ; expectorans ; deobstruens. *Extern.* : Resolvens.

USUS *internus* : Asthma ; expectoratio difficilis ; physconia abdominalis. *Externus* : Aceto scillitico soluta forma emplastri et unguenti : Lupia ; tumores articulorum frigidi ; hydarthrus.

N. B. Hoc medicamentum tumore genu dolentissimo

GUAJACUM OFFICINALE. Lignum ;
cortex ligni ; succus gummi-resinosus
ex arbore exsudans , concretus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea ; Ind. occident.*

OF. *Lignum guajacum s. lignum sanctum : Gummi guajacum ; resina guajaci .G. Gayac ; gomme guajac.*

GE. *Guajakholz ; franzen-holz : guajak-gummi ; guajak-harz.* A. *Officinal guajacum , or lignum vitæ : gum-guajac.* H. *Guajaco officinal.*

QUAL. *Cort. & ligni : Sapor amaricans , subacris. Gummi-resinæ : Sapor acris , pungens.*

VIKT. *Præstans : stimulans ; sudorifica ; alterans : Extracti errhina.*

USUS. *Syphilis ; arthritis vaga ; arthrodynia rheumatica et arthritica ; morbi pulmonum atonici ; leucorrhœa ; morbi cutanei ; podagra atonica , retrocedens.*

POS. *Ligni rasi vel corticis ligni : In decocto unc j ad ℥ij aquæ coct. ad colat. ℥ij. Gummi resinæ : Gran x - xx - drach j, forma pulveris , vel in alcohole diluto soluta.*

PRÆP. *Gummi-resina ; extractum ; tinctura ; oleum volatile.*

GUILANDINA MORINGA. Lignum ; fructus ; oleum fructus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea ; Afric. & Ind. orient.*

An lignum Nephriticum et oleum Behen ex hac planta proveniunt ?

OF. *Lignum nephriticum* : *Nuces behen* s. *been* s. *balani myristicæ* s. *glandes unguentariæ*. GE. *Griesholz* : *Been-nüsse*. A. *Smooth bonduc*.

QUAL. *Ligni* : Flavo-palescens ; cæruleo tingens ; sapor subacris , amaricans.

VIRT. *Fructus* : Mucilaginosus , oleosus. *Olei fructus* : Pinguis , tardissime rancescens.

USUS *ligni* : Nephritis calculosa ? Psora.

PRÆP. Tinctura ; oleum fixum *Behen* dictum.

GUMMI-RESINÆ. Seu extractivo-resinæ.

GUMMI-RESINA ALOES.

Vide Aloë perfoliata.

N. B. *Aloë socotrina* , maxima parte principio extractivo , et paucis solum resinosis ; *hepatica* anatica fere portione horum principiorum constat.

GUMMI-RESINA AMMONIACUM.

Obscura.

An umbellifera ?

Ægypt.

OF. *Gummi ammoniacum*. G. *Gomme ammoniac*. GE. *Ammoniak-gummi*. A. *Gum-ammoniac*.

QUAL. Odor alliaceus , ingratus ; sapor nauseosus , amarus , acris.

VIRT. Stimulans ; antispasmodica ; expectorans ; deobstruens ; *extern.* resolvens.

USUS *internus* : Asthma ; expectoratio difficilis ; physconia abdominalis. *Externus* : Aceto scillitico soluta forma emplastri et unguenti : Lupia ; tumores articulorum frigidi ; hydrarthrus.

N. B. Hoc medicamentum tumore genu dolentissimo

(arthritico) affectus in me ipso primus tentavi,
ejusque usu pedem ab amputatione servavi;
inde hoc scopo in praxin medicam introductum
fuit Londini.

DOS. Scrup. j - ij - iij.

PRÆP. Pilulæ; emulsio; solutio in aceto scillæ maritimæ; emplastrum.

GUMMI-RESINA ASSÆ FŒTIDÆ.

Vide Ferula assa foetida.

GUMMI-RESINA BDELLIUM. Obscura.

Arab. ; Afric.

QUAL. Odor fragrans; sapor amarus.

VIRT. Stimulans; deobstruens; resolvens; maturans.

USUS *externus* : Forma emplastri vel unguenti.

GUMMI-RESINA CAMBOGIÆ.

Vide Cambogia gutta.

N. B. Ex stalagmite cambogioide, cambogia gutta, guttæfera vera, hyperico baccifero, aut pneumonanthis specie promiscue desumi creditur.

GUMMI-RESINA CARANNA. Obscura.

An palmæ species?

Amer. merid.

OF. *Carannæ gummi.*

QUAL.

VIRT. Stimulans; resolvens; maturans.

USUS *externus* ; Tumores frigidi.

GUMMI-RESINA CATECHU.

*Vide Mimosa Catechu.*OF. *Terra Japonica ; succus Japonicus ; catechu.*

GUMMI-RESINA EUPHORBIAE.

Vide Euphorbia officinalis.

GUMMI-RESINA GALBANUM.

Vide Bubon galbanum.

GUMMI-RESINA GALDA. Obscura.

OF. *Gummi galda.*

QUAL. Odor et sapor resinæ amyr. elemiferæ.

VIRT. Stimulans ; expectorans ; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA GUAJACI.

Vide Guajacum officinale.

GUMMI-RESINA HEDERAE.

Vide Hedera helix.

GUMMI-RESINA JUNIPERI.

*Vide Juniperus lycia.*OF. *Olibanum , Thus.*

GUMMI-RESINA KIKEKUNEMALO.

Obscura.

OF. *Kikekunemalo gummi.*

QUAL. Sapor subacris , resinosus.

VIRT. Antispasmodica ; nervina ; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA KINO. Obscura.
 Africana.

OF. *Gummi kino* s. *gummi rubrum Gambiense*.

QUAL. Eximia : styptica; extractivo-resinosa.

VIRT. Adstringens; roborans; antiseptica.

USUS *pulv. vel infusi intern. & extern.* : Hæmorrhagiæ ; hæmorrhœæ ; blennorrhœa ; diarrhœa. *Amaris juncta* : Intermittentes.

.nos. *pulv.* ʒj - jʒ. Pro infuso ʒʒ ad ℥j aquæ,
cujus unc. ij - iij ter quaterve de die.

PRÆP. Tinctura cum alcohole diluto parata ʒʒ
pro dosi.

GUMMI-RESINA LACCA.

Vide Ficus indica. Ind. orient.

OF. *Gummi Lacca.*

GUMMI-RESINA LOOK. Obscura.

OF. *Look gummi.*

QUAL. Potissimum resinosa.

VIRT. Stimulans ; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA LUTEA. Obscura.

QUAL. *Novæ Hollandiæ.*

VIRT.

usus. Dysenteria; alvi profluvia.

GUMMI-RESINA MYRRHA. Obscura.

Vide Laurus myrrha.

*Arborea; Littoris merid. & orient.
maris rubri.*

An Mimosæ, an lauri species?

OF. *Myrrha*; *gummi myrrhæ*. G. *Gomme myrhe*. G.
Myrrhen. A. *Myrrha*.

QUAL. Sapor aromaticus, intense amarus, subacris.

VIRT. Stomachica; stimulans; menagogá.

USUS *internus* Myrrhæ masticatæ vel solutæ in
alcohole diluto: Dyspepsia; hysteria; asthma
pituitosum; catarrhus; amenorrhœa atonica. *Ex-*
ternus: Caries; ulcus; fistula; gangræna; cy-
nanche atonica; laxitas gingivarum; aphtha.

DOS. Gran X-℥ij. .

PRÆP. Tinctura. Drach β-ĵ pro dosi.

GUMMI-RESINA OLAMPI. Obscurá.
Americ.

OF. *Olampi gummi*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

GUMMI-RESINA OPOPANACIS.

Vide Pastinaca opopanax.

GUMMI-RESINA PAPAVERIS.

Vide Papaver somniferum.

OF. *Opium*. — VETERIBUS. *Lachryma papaveris*.

GUMMI-RESINA RAKASIRA. Obscura.

An balsamum?

OF. *Rakasira balsamum*.

QUAL. Sapor subamarus, balsamicus.

GUMMI-RESINA SAGAPENUM. Obscura.
Africana.

OF. *Gummi sagapenum* s. *serapinum*.

QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor acris, nauseosus, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; deobstruens; resolvens.

USUS. Hysteria; amenorrhœa atonica; tumores frigidi; physconia abdominalis. Forma pulveris vel solutionis in alcohole diluto.

DOS. Gran. x - xx - xxx.

GUMMI-RESINA SARCOCOLLA.

An ex Penea sarcocolla? *Vide* Penea.

OF. *Gummi sarcocolla*.

QUAL. Sapor nauseosus, amaro-dulcis, acris.

GUTTÆFERA VERA. (KÆNIG). Succus gummi-resinosus, ex cortice trunci aut ex folijs et ramulis fractis promanans (*vulgo* gummi-gutta dictus).

Arborea; Siamensis, Zeylonica.

OF. *Gummi-gutta* s. *gummi gambogia*.

N. B. *Vide* etiam *Hypericum* et *Cambogia*.

GYPSOPHILA STRUTHIUM. Radix.

CL. *Decand. O. Digyn.*

QUAL. Saponacea.

H.

HÆMATOXYLUM CAMPECHIANUM.

Lignum.

CL. *Decand. O. Monog.* *Arborea; Amer. merid.*OF. *Lignum campechianum s. Campechenſe. G. Bois de campêche. GE. Kampesch-holz; blauholtz. A. Logwood.*QUAL. *Tinctoria; sapor stypticus.*VIRT. *Roborans; adstringens.*USUS *decocti vel extracti* : *Diarrhœa; sub finem dysenteriae.*DOS. *Unc ij ad ℥ij aquæ coctæ ad ℥j.*PRÆP. *Extractum gran. x-xl pro dosi.*HEDERA HELIX. *Folia; baccæ; succus gummi-resinosus incisione corticis obtentus, concretus.*CL. *Pentand. O. Monog.* *Fruticosa.*OF. *Hedera arborea; gummi hederæ. GE. Epheu; Eppich; immergrün: Epheuharz. A. Common Ivy.*QUAL. *foliorum* : *Sapor amarus, stypticus, nauseosus. Baccarum* : *Sapor amarus, acidus. Gummi-resinæ* : *Odor et sapor leviter aromaticus.*

VIRT.

USUS *infusi foliorum* : *Atrophia infantum; Rhachitis; ozæna; ulcera; epiphora; fonticuli.*HEDYOTIS AURICULARIA. *Herba.*CL. *Tetrand. O. Monog.* *Frutic. Zylonica.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT.

USUS. Cophosis.

HELLEBORUS FÆTIDUS. Herba; folia;
succus expressus.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* Perennis; *Europ. austr.*

OF. *Helleborus fœtidus* s. *helleboraster*. GE. *Stinkende Niesswurzel*. A. *fœtid Hellebore* or *bears foot*.

QUAL. Præstans : Odor teter; sapor acris, amaricans, nauseosus.

VIRT. Emetica; cathartica; anthelminthica; deobstruens.

USUS *succi vel pulv. foliorum* : Asthma pituitosum; hypochondriasis; hysteria; physconia abdomin.; vermes.

DOSIS.

HELLEBORUS NIGER. Fibræ radicis.

CL. & O. præced. Perennis; alpina; *Europ. austr.*

OF. *Melampodium* s. *helleborus niger*. G. *Hellebore*.

GE. *Schwarze Niesswurzel*. A. *Black hellebore*, or *christmass rose*. H. *Helleboro negro*.

QUAL. In principio acri cum mucilaginoso resinoso residens; odor fœtidus, nauseosus; sapor amaricans, acris.

VIRT. *Præcipue recentis* : Drastico - cathartica; diuretica; menagoga; anthelminthica; deobstruens.

USUS *extracti aut decocti (vel melius infusi)* : Amenorrhœa; melancholia; mania; morbi cutis;

quartana; physconia abdomin.; hydrops; vermes;
psora; achor.

DOS. Drach iij ad ℥j aquæ vel vini infusi. *Pulveris*
gran iij-x-xxx.

PRÆP. Tinctura dosi ʒj. Extractum dosi gran x-ʒʒ
bis terve de die.

N. B. Cavendum ne cum radiculis adonidis ver-
nalis, trollii Europæi, actææ spicatæ, astran-
tiæ majoris et præcipue aconiti napelli confun-
datur : Priores debiliores; posterior venenata.

HELLEBORUS VIRIDIS. Fibræ radicis.

QUAL. Sapor magis amarus, nauseosus, et acrior
helleboro nigro.

VIRT.

USUS.

HERACLEUM SPONDILIUM. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

A. *Common cow-parsnep.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis; subaromatica.

VIRT.

USUS.

HERNIARIA GLABRA. Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

Annua.

GA. *Herniaire ou turquette. A. Smooth rupture-wort.*

QUAL. Inodora; insipida.

HERNIARIA HIRSUTA.

A. *Hairy rupture-wort.*

Annua.

VIRT.?

HIBISCUS ABELMOSCHUS. Semen.

CL. *Monadelph. O. Polyand. Fruticosa ; Asiatica.*OF. *Semen abelmoschi s. grana moschata. G. Graine de musc ; herbe à la poudre de Chypre. A. Target-leaved hibiscus.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS. Cosmeticus : Tinea.

HIERACIUM PILOSELLA. Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual. Perennis.*OF. *Herba auriculæ muris. G. Mausuerchen. A. Mouse-ear hawkweed.*

QUAL. Lactescens ; sapor amarus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hernia ; diarrhœa ; psora ; herpes.

HORDEUM DISTICHON. Semen ; semen excorticatum ; maltum.

CL. *Triand. O. Digyn. Cereale ; annuum.*OF. *Semen hordei : hordeum perlatum : maltum. G. Oige. GE. Gerste : Gersten-graupen : Malz. A. Common barley : barley ; pearl-barley : malt.*

QUAL. mucilaginoso ; f. rinacea.

VIRT. *seminis* : Demulcens ; emolliens ; nutriens.*Malti* : Antiseptica.USUS *decocti malti* : Scorbutus.

PRÆP. Cerevisia ; alcohol ; acetum.

HORDEUM VULGARE. Semen.

A. Spring barley.

USUS idem ac prioris.

HUMULUS LUPULUS.

Strobuli.

CL. *Diæc.* O. *pentand.**Perennis.*OF. *Lupulus.* G. *Houblon.* GE. *Hopfen.* A. *Hops.* H. *Hom-recillo.*

QUAL. Odor grate aromaticus, nidorosus; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; stomachica.

USUS. Luxatio; alopecia? *Semin.* obstipatio.

HYMENÆA COURBARIL. Resina ex cortice et radice arboris exsudans.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Brasiliensis.*OF. *Gummi seu resina anime.* A. *Locust-tree.*

QUAL. Subflavescens; pellucida; odor fragrans; sapor resinosus.

VIRT. Nervina.

USUS. Contractura; paralysis.

HYOSCIAMUS ALBUS. Folia; semina.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Annua vel biennis.*A. *White henbane.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis sed mitior.

USUS *extracti* : Amaurosis; cataracta.

HYOSCIAMUS NIGER. Herba, folia recentia.

CL. & O. *præced.* *In desertis pinquibus.*OF. *Hyosciamus.* G. *Jusquiame.* GE. *Bilsenkraut; Tollkraut.* A. *Black Henbane.* H. *Belenno negro.*

QUAL. Venenata : In principio narcotico residens ;
subinsipida ; odor virosus.

VIRT. Narcotica ; sedativa ; antispasmodica ; re-
solvens.

USUS. Paralysis ; varix ani ; hæmorrhagiæ ab irrita-
tione ; palpitation ; convulsio ; epilepsia ; mania.
Externe forma cataplasmatibus : Scirrhus.

N. B. Loco opii , præcipue ubi obstipatio usum
opii contraindicat.

PRÆP. Extractum foliorum.

DOS. Extracti gran β -ij-xx.

HYPERICUM BACCIFERUM.

———— GUTTIFERUM (RICHARD).

Quidam gummi-resinam , *gummi-gutta*
dictam , ex hac planta derivant.

CL. *Polyadelph. O. Icosand. Cayenn.*

HYPERICUM PERFORATUM. Summi- tates florentes.

CL. & O. *præced. Perennis.*

OF. *Hypericum. G. Millepertuis ordinaire. G. Johan-
niskrant. A. Perforated St. John's wort.*

QUAL. Odor graveolens.

VIRT. Resolvens ; anthelminthica.

USUS *infusi* : Tabes pulmonalis ; hæmoptysis ;
hæmaturia ; vermes.

HYSSOPUS OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosperm. Suffruticosa ; hortensis.*

OF. *Herba hyssopi*. G. *Hyssope*. GE. *Isop*. A. *Common Hyssop*.

QUAL. In oleo volatili cum principio extractivo amaro residens; odor nidorosus; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; leniter stimulans; expectorans; resolvens.

USUS *infusi*: Morbi pulmon. pituitosi; ecchymoma.

J.

JASMINUM OFFICINALE. Flores.

CL. *Diandr*. O. *Monog*. Arborea.

OF. *Jasminum*. G. *Jasmin*. GE. *Jasminblumen*. A. *Common white jasmine*.

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Narcotica; sedativa.

USUS.

PRÆP. Oleum fragrans infusione paratum.

N. B. Flores nyctanthi et Philadelphi Coronariæ odorem jasmino similem largiuntur.

JATROPHA CURCAS. Semen.

CL. *Monæc*. O. *Monadelph*. Arborea; Americæ meridional.

OF. *Ricinus major*; *ficus infernalis*. A. *Angular-leaved physic-nut*.

QUAL. *Seminis*: oleosa. *Corticis seminum*; Venenata.

JATROPHA ELASTICA. Succus lacteus
incisione arboris exstillans.

CL. et O. præced. *Arborea; Amer. austr.*

N. B. Plures aliæ arbores similem succum erogant.

NATIVIS *Caout-chouc.*

OF. *Resina elastica.* G. *Gomme ou résine élastique.*

USUS ad catheteres, candellas medicatas, et pessaria.

JATROPHA MANIHOT. Radix.

NATIVIS *Jucca; cassavi.* *Amer. austr.*

A. *Eatable rooted physic-nut or cassava (Tapioca).*

QUAL. *Succi radicis: Venenata: acris; urens. Radicis siccatae: Farinacea.*

VIRT. *Rad. recent. Crastica. Farinae: Nutriens.*

N. B. Antidotum hujus veneni est *Capsicum annuum* (CLARKE).

ILEX AQUIFOLIUM. Folia.

CL. *Tetrand.* O. *Tetragyn.* *Fruticosa; Europ. aust. in locis umbrosis, siccis.*

OF. *Agriifolium.* G. *Houx commun ou chêne vert.*

GE. *Stechpalme.* A. *Holly.*

QUAL. In principio amaro-adstringente cum mucilagino-resinoso residens: sapor mucilaginoso-amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; antiseptica.

USUS *decocti: Rigiditas articulorum post podagram remanens? intermittentes rebelles; dyspepsia.*

DOSIS *foliorum concisorum: Unc. j ad libr. aquæ.*

ILEX CASSINE Folia.

CL. et O. præc. *Arborea; Carolin. Virgin. Florid.*

Ilex vomitoria (Hort. Kew).

N. B. Hæc planta eadem est ac *Cassine Peragua*. L.

OF. *Folia cassinæ s. apalachines Peragua*. G. *Thé des Apalaches*. A. *Dahoonholly*.

QUAL. Sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica, stimulans; expectorans. *Recentium* : Emetica; cathartica.

USUS : Morbi pituitosi pulmonum; diabetes? colica nephritica?

ILLICIUM ANISATUM. Fructus; (semen cum Capsulis.)

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Arborea*; *Asiat.* *Chinens.*

OF. *Semen anisi stellati*; *badian*. G. *Anis de la Chine*. GE. *Sternanis*. A. *Indian anise*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor aromatico-dulcis instar anisi.

VIRT. Stomachica; carminativa; expectorans.

USUS *pulveris vel infusi* : Morbi pulmonum atonici.

N. B. Semen infuso Theæ additum, idem magis gratum stomacho reddit.

DOS. *pulv. gran.* xxx. *Infusi* : drach. j ad libr. j aquæ.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perenn.* *alpin.* *Europ.* *aust.*

OF. *Imperatoria*. G. *Impératoire*. GE. *Meisterwurz*. A. *Common masterwort*.

QUAL. Præstans : In oleo volatili et principio resinoso residens; odor fragrans; sapor amaro-acris, aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; sialagoga.

USUS. Amenorrhœa atonica; dyspepsia; colica flatulenta; paralysis; intermittentes; serpigo; sterilitas?

DOSIS *pueris* : Gran. x - xxx.

INDIGOFERA TINCTORIA. Fecula.

CL. *Diadelph. O. Decandr. Frutic.; Ind. & Afric.*
OF. *Indigo.*

QUAL. Cærulea; tinctoria.

VIRT. Phthiriaca.

USUS. Diarrhœa; lochia nimia?

INULA DYSENTERICA. Herba.

CL. & O. *præced. Perennis; in fossis siccatis.*
OF. *Herba conyzæ. A. Meadow Inula, or middle Fleabane.*

QUAL. Odor debilis; sapor subacris.

VIRT?

USUS. Dysenteria; psora.

INULA HELENIMUM. Radix.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl. Perennis; Europ. austr.*
OF. *Enula campana s. helenium. G. Inula campana; aunée. GE. Alantwurzel. A. Common inula or elecampane. H. Ala.*

QUAL. Præstans : In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Stimulans, angelicam æmulans; expectorans; stomachica, alterans; anthelminthica.

USUS *pulveris & tincturæ* : Dyspepsia; cachexiæ; tussis; asthma pituitosum; physconia abdomin.; psora; hæmorrhoides mucosæ.

DOSIS. Drachm. semis-unam.

PRÆP. Tinctura; conditum; extractum.

IRIS FLORENTINA.

Radix.

CL. *Triand O. Monog.*

Perennis; Italiæ.

OF. *Iris Florentina.* **G.** *Iris de Florence.* **GE.** *Violen-
wurzel.* **A.** *Florence orrice.* **H.** *Lirio de Florencia.*

QUAL. In acri corrosivo residens, siccatione avo-
lans; odor fragrans instar violæ. *Radicis recentis:*
sapor acris, amaricans.

VIRT. *recentis* : Cathartica; diuretica; expecto-
rans; errhina.

USUS.

DOSIS.

IRIS FÆTIDA.

Radix.

CL. *& O. præcd.*

Perennis; Europ. austr.

OF. *Spathula fætida s. xyris.* **G.** *Glayeux puant.*
A. *Siincking itis, or gladwyn.*

QUAL. Eximia : Nigra; odor fætidus, teter; sapor
acris, ingratus.

VIRT. Deobstruens; diuretica; narcotica; antispas-
modica; cathartica.

USUS. Hysteria; scrophula; hydrops.

DOSIS. ʒß.

IRIS GERMANICA.

Radix recens.

CL. et O. præc.

Perennis in sylvis.

OF. *Iris nostras*. G. *Flambe*; *fleur de lys*. GE. *Blaue schwertel lilien*. A. *German iris or flower de luce*.
H. *Lirio de alemania*.

QUAL. *Radicis recentis*: In acri volatili residens;
sapor acris, amarus, nauseosus. *Siccatae*: farinacea.

VIRT. *Recentis*: Subemetica; diuretica; errhina;
expectorans; menagoga.

IRIS PSEUD-ACORUS. Radix; succus radicis
expressus.

CL. et O. præced. *Perennis; ad littora fluviorum et
lacuum.*

OF. *Acorus palustris*; *pseudoacorus*; *iris palustris*;
gladiolus luteus. G. *Iris*; *gladiole des marais*. GE.
Gelbe schwertelwurzel; *falscher kalmus*; *wasser-
schwertel*; *drachenwurzel*; *gelbe lilien*. A. *Yellow
iris*; *water flag*; *or flower de luce*. H. *Lirio espa-
danna*.

QUAL. *Recentis*: Inodora; sapor acris, substypticus.

VIRT. *Succi*: Diuretica. *Radicis*: adstringens.

USUS. Hydrops; stomachace.

DOSIS *succi*: Drach. j ad unc. semis.

IRIS TUBEROSA.

Radix.

CL. et O. præced.

Syriæ; Arab.

An radix *Hermodactili officinalis*?

QUAL. Inodora; acris, dulcescens.

VIRT. Cathartica; alterans.

USUS. Amaurosis ; arthrodynia rheumatica.

DOS. Drach ij.

JUGLANS REGIA. Cortex viridis fructus immaturi ; putamen et dissepimentum nucum.

CL. *Monac. O. Polyand. Arborea.*

OF. *Nuces juglandes immaturæ. G. Ecorce verte des noix. GE. Unreiffe wallnüsse. A. Common walnut-tree ; green walnuts. G. Brout des noix.*

QUAL. *Corticis et putaminis* : Odor graveolens ; sapor amaricans , stypticus.

VIRT. Roborans ; adstringens ; anthelminthica.

USUS *decocti* : Syphilis inveterata ; morbi cutanei varii.

DOSIS. Libr. j ad libr. xx aquæ ad colat. libr. x ,
cujus libr j—ij de die.

PRÆP. Extractum drach. semis—j vermes infantum :
angina ; ulcera oris.

JUNIPERUS COMMUNIS. Baccæ ; lignum.

CL. *Diæc. O. Monadelph.*

OF. *Juniperus G. Genevrier ordinaire. GE. Wachholder Beeren , holz. A. Common juniper wood ; juniper-berries.*

N. B. Gummi-resinam , *Sandaracam* dictam , non ex Junipero ut hactenus vulgo assertum fuit , sed ex Thuya provenire nuper didicimus.

Vide Thuya articulata.

QUAL. *Baccarum* : In oleo volatili copioso , et principio resinoso residens ; odor fragrans ; sapor aromatico-dulcis. — *Ligni* : Eadem , sed debilior.

VIRT. *Baccarum , ligni et resinæ* : Stimulans ; diuretica ; alterans ; carminativa. *Decocti et extracti* : Minus stimulans ; magis diuretica.

USUS *decocti aliorumque præparatorum* : Cophosis ?
hydrops ; asthma ; catarrhus ; morbi cutis. *Olei* :
vermes.

DOSIS *pulv.* Drach. semis. — In infuso drach. iij — it
ad libr. j. aquæ vel vini.

PRÆP. *Ligni et baccarum* : Decoctum ; infusum.
Baccarum : Extractum ; rob ; aqua stillatitia ;
oleum volatile ; alcohol.

JUNIPERUS LYCIA.

————— THURIFERA.

} Gummi resina.

CL. et O. *præced.* *Arborea ; littoris merid. et*
orient. maris rubro.

N. B. Dubium est an gummi-resina, *Thus* seu
Olibanum dicta, ex *Junipero*, aut potius, ut
FOERSKAL asserit, ex *Amyridis* specie aut
ex ambobus proveniat.

Vid. *Amyris kataf.*

JUNIPERUS SABINA.

Folia.

VARIET. A. *cupressifolia.*

CL. et O. *præced.* *Fruticosa ; hortensis.*

OF. *Sabina.* G. *Sabine.* GE. *Sevenbaum ; sadebaum.*

A. *Common savin.* H. *Enebrio sabina.*

QUAL. Præstans : in oleo volatili copioso residens ;
odor hircosus ; sapor acris ; amaricans.

VIRT. Stimulans ; corrodens ; menagoga ; antispas-
modica ; diuretica ; depilans ; anthelmintica.

USUS *internus* : Amenorrhœa atonica. *Externus*
forma pulveris, decocti, infusi, aut cataplas-

matis : Caries ; linea ; psora ; ulcera fungosa ; verrucæ ; condylomata ; odontalgia.

DOSIS *pulveris* : Gr. v—xv.

PRÆP. Aqua stillatitia ; oleum volatile ; extractum.

K.

KAEMPFERIA ROTUNDA. Radix.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis* ; *Ind. orient.*

OF. *Zedoaria.* G. *Zédoire.* GE. *Zittwerwurzel.*

A. *Zedoary.*

QUAL. In oleo volatili residens ; odor subfragrans ; sapor subacris , amaricans , aromaticus.

VIRT. Stimulans ; calefaciens ; stomachica ; anthelmintica.

USUS *pulveris* (*præcipue zeylonici*) : Dyspepsia ; pyrosis ; febres intermittentes , atonicæ ; vermes ; cardialgia podagrica ; podagra aberrans.

DOSIS. Scrup. j. per se vel cum lacte.

PRÆP. Aqua stillatitia ; alcohol ; tinctura.

KAJEPUT OLEUM.

Vide Melaleuca leucadendron.

KIKEKUNEMALO.

Vide Gummi-resina kikekunemalo.

KINO.

Vide Gummi-resina kino.

L.

LABRADIA PRURIENS. } Pubes leguminis
 ————— URENS. } rigida.

N. B. PAIVA ex autopsia ad hoc novum genus
 refert *Dolichum prurientem et urentem* LINN.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS. Drach. j—iv cum syrupo aut mucilagine.

LACTUCA SATIVA. Herba; semen.

CL. Syng. O. Polyg. *æqual.* Annua; hortensis.

G. *Laitue ordinaire.* A. *Garden lettuce.*

USUS. Culinaris.

LACTUCA VIROSA. }
 ————— SCARIOLOA. } Herba; succus.

OF *Lactuca sylvestris.* G. *Laitue vireuse.* GE. *Wild-
 der lattich.* A. *Strong scented lettuce.* H. *Lechuga
 hedion da y ponzonosa.*

N. B. In locis palludosis colligenda.

QUAL. In succo lacteo acri residens; odor teter;
 sapor acris, amarus.

VIRT. Sedativa; diuretica.

USUS. Hydrops; icterus.

DOSIS *succi* ad mellis consistentiam inspissati, vulgo
extractum dicti, drach. j—iv de die.

LAGOECIA CUMINOIDES. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* Annua; insul. Græc.

OF. *Amni veterum.* A. *Wild cumin.*

QUAL. Præstans: Sapor aromaticus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

LAMIUM ALBUM.

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.**Annu.*OF. *Lamium album*; *urtica mortua*: *galeopsis*.GE. *Weisse taube nessel.* A. *White archangel nettle* or *dead-nettle*.

QUAL. Oleracea; odor teter.

LASERPITIUM LATIFOLIUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis*, *alpina*: *in locis siccis*.OF. *Gentiana alba*. GE. *Weisse enzianwurzel*. A. *Broadleaved lasserwort*. H. *Laserpitio de hoja ancha*.

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, acris, amarus.

VIRT. Stomachica; stimulans; diuretica.

LASERPITIUM SILER.

Semen.

CL. *et* O. *præced.**Alpina*: *in locis siccis*.OF. *Siler montanum*. GE. *Rosskümmel*. A. *Mountain lasserwort*.

QUAL. Aromatica; cumini odore et sapore remissiore.

VIRT. Carminativa stomachica.

USUS. Colica lochialis.

LATHRAEA SQUAMMARIA. Radix.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis*: *in locis nemorosis, umbrosis*.OF. *Dentaria major*.

QUAL.

VIRT?

LAURUS CAMPHORA. Substantia resinosa volatilis, *Camphora* dicta; præcipue ex ramis arboris sublimatione parata.

CL. *Enneand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Camphora.* G. *Camphre.* GE. *Kampfer.* A. *Camphire-tree.* H. *Canfor.*

QUAL. Heroica : in principio volatili residens ; odor fragrantissimus ; sapor acris , aromaticus , amaricans ; simul cum sensu frigoris.

VIRT. Nervina ; antispasmodica ; antiseptica ; anthelminthica ; resolvens.

USUS internus : Febres , et exanthemata atonica ; cardialgia ; hysteria ; mania ; nymphomania ; satyriasis ; (*cum sulphure*) colica pictonum. *Externus :* Arthrodynia rheumatica ; ophthalmia ; grangræna ; ulcus fungosum ; morsura insectorum ; colica spasmodica.

DOSIS. Cum saccharo trita aut mucilagine vel alcohole subacta ; gr. v gr. xv bis terve de die , ascendendo ad drach. ij.

PRÆP. Alcohol camphoratum ; æther camphoratus ; acetum camphorat. ; acidum nitricum camphoratum , seu solutio camphoræ nitrica ; oleum camphorat. unguentum camphoratum.

An opium est antidotum camphoræ ?

N. B. An oleum volatile camphoræ Jayæ , Suma-

træ, etc. in artlirodynia arthritica et rheumatica
adco ccelebre ex eadem arbore provenit?

LAURUS CASSIA. Cortex ; flores.

Varietas Lauri cinnamomi. (THUNBERG).

OF. *Flores cassiæ ; calyces cassiæ ; cassia cinnamo-*
mea ; cortex cinnamomi indici ; folia malabathri ;
cassia lignea ; xylocassia. GE. *Mutterzimmt.*

QUAL. In oleo volatili residens ; odor fragrans ;
sapor acris , aromaticus ; debilior sequente.

VIRT. Stimulans ; calefaciens.

USUS. Paralysis linguæ.

N. B. Flores supplere possunt corticem cinnamomi.

PRÆP. Oleum volatile.

LAURUS CINNAMOMUM. Cortex.

CL. & O. præced. Arborea ; Zeylonica.

OF. *Cinnamomum verum s. acutum.* G. *Canelle.* GE.
Zimmt. A. *Cinnamom-tree.*

QUAL. Heroica : in oleo volatili residens ; odor
intense fragrans ; sapor dulcis , dein subacris ,
aromaticus , gratus.

VIRT. Cardiaca ; stimulans ; calefaciens ; roborans ;
antispasmodica ; stomachica ; carminativa ; aphro-
disiaca.

USUS Dyspepsia ; anaphrodisia ; morbi atonici.

DOS. *pulveris* : Gr. x - xxx.

PRÆP. Infusum aquosum vel vinosum frigidum ;
aqua ; alcohol ; tinctura ; oleum volatile.

LAURUS CULILAWAN. Cortex.

CL. & O. præced. Arborea ; Amboin. & insul. Mollucc.

OF. *Cortex culilawan*; *caryophiloides*.

QUAL. Præstans : sapor aromaticus, caryophyllum aromaticum æmulans, muçilaginosus, subadstringens.

VIRT. Calefaciens; roborans; carminativa; stomachica.

USUS. Paralysis; colica flatulenta; dyspepsia.

LAURUS MYRRHA. (LOUVEIRO). Cortex; gummi-resina.

CL. & O. præced. *Arborea*; *China*, *Cochinchina*.

An gummi-resina myrrha ex hac arbore?

LAURUS NOBILIS. Folia; Baccæ.

CL. & O. præced. *Arborea*; *Europ. austr.*

OF. *Laurus*. G. *Laurier*: *baïes de laurier*. GE. *Lorbeerbaum*; *lorbeerbeeren*. A. *Common sweet bay*. H. *Laurel noble*.

QUAL. Præstans : In oleo volatili cum oleo fixo mixto residens; sapor aromaticus, subacris, amaricans.

VIRT. Calefaciens; stomachica; carminativa; resolvers; phthiriaca.

USUS *In- & externus* : Amenorrhœa; dyspepsia; chlorosis; hysteria; colica lochialis. Olei : Tumores frigidi; psora; pediculi.

PRÆP. Oleum laurinum.

LAURUS PECURIM? (BERGIUS).

Fructus.

CL. & O. præced.

Arborea; *Brasiliæ*.

OF. *An faba pechurim ex hac arbore?*

QUAL. In oleo volatili cum oleo unguinoso mixto
residens; odor fragrans; sapor grate amaricans,
aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; subastringens.

USUS. Sub finem dysenteriae; diarrhoea, tormina
ventris.

DOS. *pulveris*: Gr. x cum saccharo.

LAURUS SASSAFRAS. Radix; cortex
radicis.

CL. & O. *præced.* Arborea; Virginiae.

OF. G. GF. *Sassafras*. A. *Sassafras-tree*.

QUAL. Præstans: In oleo volatili copioso resi-
dens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris,
subduleis.

VIRT. Stimulans; diuretica; sudorifica.

USUS *decocti vel infusi*: Cachexiae; Syphilis? Ar-
throdynia arthritica et rheumatica; psora.

PRÆP. Oleum volatile.

LAVANDULA SPICA. Flores.

CL. & O. *præced.* Suffruticosa; Europ. austr.; hort.

OF. *Lavendula*. G. *Lavande*. GE. *Lavendel*. A. *Com-
mon lavender*. H. *Espliego*; *alhucenna*.

QUAL. Præstans: In oleo volatili copioso residens;
odor fragrans; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS. Paralysis; aphonia; balbuties.

PRÆP. Oleum volatile; aqua; alcohol; tinctura
lavandulae composita Ph. Lond.

LAVANDULA STÆCHAS. Flores.

CL. *et O. præced.* *Suffruticosa : Europ. austr.*
 OF. *Stæchas Arabica s. stæchas spica A. French lavender.*

QUAL. *Fragrans, præcedenti graveolentior.*

LAWSONIA INERMIS. Radix.

CL. *Octand. O. Monog.* *Orientalis.*
 OF. *Alcanna vera s. orientalis A. Smooth lawsania.*

QUAL. *Tinctoria : Radix rubra, folia lutea.*

LEDUM PALUSTRE. Folia cum floribus.

CL. *Decand. O. Monog. Fruticosa : in locis humidis, nemorosis.*

OF. *Rosmarinus sylvestris. G. Lede ou romarin sauvage. GE. Post ; porsch ; wilder rosmarin ; wanzenkraut. A. Hillrose ; bohemian rosemary or marsh-ledum.*

QUAL. *Heroica : in oleo narcotico cum extractivo amaro-adstringente residens ; odor nidorosus ; sapor amaricans, adstringens.*

VIRT. *Narcotica ; sudorifica ; phthiriaca.*

USUS *infusi* : *Lepra ; psora ; linea ; pertussis ; insecta.*

DOSIS. *Unc. semis—j ad libr. j aquæ, lactis, vel seri lactis infusi per horam, cujus libra semis-una de die sumenda.*

LEONURUS CARDIACA. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *Biennis.*

OF. *Cardiaca. A. Common motherwort.*

QUAL. *Amara.*

USUS. *Hysteria.*

LEONTODON TARAXACUM. Radix.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. Perennis.

OF. *Taraxacum*; *dens leonis*. G. *Pissenlit*: *dent de lion*. GE. *Pfaffenrœhrlein*; *læwenzaln*. A. *Common dandelion*. H. *Amargon*.

QUAL. In succo lactescente, amaro, salso residens.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS. *Decocti vel extracti radiceis*: Physconia abdomin.; icterns; quartanæ rebelles.

DOSIS. Unc. ij—iij ad libr. j aquæ.

PRÆP. Succus recens expressus; extractum.

LEPIDIUM IBERIS. Herba.

CL. *Tetradyn*. O. *Silicul*. *Annua*; *Europ. austr.*

QUAL. Sapor acris.

VIRT. Diuretica; alterans.

USUS. Febres intermittentes; cachexiæ.

LEPIDIUM SATIVUM. Herba recens.

OF. *Nasturtium hortense*. G. *Cresson alenois*; *passerage*. GE. *Gartenkresse*. A. *Garden cresses*. H. *Nastuerzo*.QUAL. *Herbæ et seminum*: In principio acri leniori residens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; hydrops; achor.

LEUCOIUM VERNUM, aliæque species.

CL. *Hexand*. O. *Monog*.OF. *Lunaria major*; *riola lunaris*; *leucoium lunatum*; *bulbonach*. G. *Lunaire*; *perce-neige*. GE. *Knotenblume*; *Sc'neetræpfchen*. A. *Snowdrop*.

QUAL. Mucilaginosa.

LICHEN APHTHOSUS.

CL. *Cryptog. O. Algæ.*OF. *Muscus cumatilis.*

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Cathartica; anthelminthica.

USUS *infusi vel decocti* : Vermes; aphtha.DOS. *Pulveris* infantibus gr. xij mane et vesperi.

LICHEN CANINUS.

OF. *Herba musci canini.* A. *Ground-liverwort.*

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Alterans.

USUS. Hydrophobia? Mania; asthma convulsivum
(BUTTER).

LICHEN COCCIFERUS. Ad radices arbo-

CL. & O. *præced.* rum in sylvis pineis.OF. *Muscus pyxidatus; herba ignis.* GE. *Bechermooß; fiehermoos; feuerkraut.* A. *Cup-moss.*

QUAL. Sapor Substypticus.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Pertussis?

LICHEN ISLANDICUS.

CL. & O. *præced.* Perennis; alpina; in locis siccis,
petrosis, nemorosis.OF. *Muscus Islandicus.* G. *Isländisches moos.* A. *Ice-land-lichen or liverwort.*

QUAL. Præstans : amara, subadstringens, mucilaginosa.

N. B. Amarities coctione et siccitate multum minuitur.

VIRT. Nutriens; eccoprotica.

USUS. Tabes; hæmoptysis; tussis.

DOS. Unc. ꝑ ad ℥j; aquæ vel lactis decoct. ad ℥j.

LICHEN PLICATUS.

OF. *Musci arborei seu quercini herba.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ.

LICHEN PULMONARIUS.

OF. *Herba pulmonariæ arboreæ.* GE. *Lungenmoos.*

QUAL. Sapor amarus, salsus.

VIRT.

USUS. Tussis; icterus.

LICHEN ROCCELLA.

CL. & O. *preced.* *Insular. archipel & Canariens.*

OF. *Roccellæ herba.* G. *Orseille.*

QUAL. Subsalsa, subacris; tinctoria rubra.

VIRT.

USUS. Tinctorius.

PRÆP. Pigmentum vulgo *Lacmus* dictum.

LIGNUM ALOES. *Vide Aloëxylum.*

SIN. *Lignum agallochi s. Aspalathi s. Calambac.*

LIGUSTICUM LEVISTICUM. Radix; Semen; herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis; alpina.*

OF. *Ligusticum; levisticum.* G. *Liveches; semences d'ache.* GE. *Liebstackel.* A. *Common lovage.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus, acris, calidus, angelicam archangelicam æmulans. *Semina* urinam nigro colore inficiunt.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; lactifera.
USUS.

LILIUM CANDIDUM. Radix; petala recentia.

CL. *Hexand. O. Monog.* Perennis; hortensis.

OF. *Radix & flores lilii albi.* G. *Lys.* GE. *Weisse lilien.* A. *Common white lily.*

QUAL. *Petalorum recentium*; Odor fragrans. *Radicis*: sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS.

LINNÆA BOREALIS. Herba.

CL. *Didyn. O. Angiosp.* Perennis; *Europ. septentr.*

A. *Two flowered Linnæa.*

QUAL. *Floris*: Odor fragrans. *Herbæ*: Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. subadstringens; Diuretica.

USUS *infusi* in lacte vel aqua: Arthrodynia rheumatica; psora.

LINUM CATHARTICUM. Herba.

CL. *Pentand. O. Pentag.* Annua.

GF. *Linum catharticum.* G. *Lin purgatif.* GE. *Purgier flachs.* A. *purging flax.*

QUAL. Sapor subsalsus, amaricans, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Hydrops ; nephritis.

DOS. Drach. ij herbæ siccatae ad ℥j aquæ pro infuso.

LINUM USITATISSIMUM. Semen.

CL. & O. *præced.* *Annua.*

OF. *Semen lini.* G. *Grains de lin.* GE. *Leinsaamen ; flachssaamen.* A. *Common flax ; linseed.* H. *Laxor.*

QUAL. Mucilaginosa ; oleosa.

VIRT. Involvens ; emolliens.

USUS *decocti vel infusi* : Dysuria ; nephritis ; blennorrhagia ; *forma enematis* : tenesmus. *Farinae forma cataplasmatidis* : cynanche ; phlegmone.

PRÆP. Oleum fixum expressione frigida paratum.

DOS. Seminum unc. ℥-j ad ℥ij aquæ.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. Bal- samum.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.* *Arborea ; Virgin. Mexic.*

OF. *Storax ; styrax liquida.* A. *Mapple-leaved liquid amber , or sweet gum.*

QUAL. Liquido-tenax ; coloris grisei ; odor fragrans ; sapor acris , aromaticus.

VIRT. Stimulans ; calefaciens.

USUS *externus* : Paralysis ; psora.

LITHOSPERMUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Lithospermum ; milium solis.* G. *Gremil ; herbe aux perles.* GE. *Meerhirse ; steinhirse ; perlkraut-saamen.* A. *Officinal groomwell.*

QUAL. Insipida ; inodora.

LIRIODENDRON TULIPIFERA. Cortex.

CL. *Polyand. O. Polyg.* *Arborea; Amer. septentr.*

OF. *Cortex loriiodendri.* A. *Common tulip-tree.*

QUAL.

VIRT.

USUS in America frequens, loco *Cinchonæ* officinalis : intermittentes.

LOBELLIA SYPHILITICA. Radix.

CL. *Syng. O. Monog.* *Perennis; Virginicæ.*

OF. *Lobelia.* G. *Cardinal bleu.* A. *Blue lobelia, or cardinal flower.*

QUAL. Lactescens ; acris ; nauseosa.

VIRT. Emetica ; drastico-cathartica.

USUS *decocti* : Syphilis ?

DOS. Unc. semis ad aquæ libr. xij coquendo ad libr. viij.

LOBELIA LONGIFLORA. } Radix.
 ————— TUPA. }

QUAL. Aciores præcedenti.

LONICERA DIERVILLA. Stipites.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Fruticosa; Canadensis.*

OF. *Diervilla.* A. *Yellow flowered upright honeysuckle.*

QUAL. Odor et sapor nauseosus.

VIRT.

USUS *Canadensium* : Syphilis ; blennorrhagia ; dysuria.

LONICERA PERICLYMENUM. Herba ;
stipites et flores.

OF. *Caprifolium*. A. *Common wood-bine or honey-suckle*.

QUAL. Odor et sapor ingratus.

VIRT. ?

USUS.

LONICERA SYMPHORICARPOS. Stipites.
Fruticosa ; Carolinæ.

A. *Shrubby St. Peters-wort*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Intermittentes ?

LUPINUS ALBUS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Annua ; hortensis.*

OF. *Semen lupini*. G. *Lupin*. GE. *Feigbohnen*.

A. *White lupin*.

QUAL. Farinacea ; amara.

VIRT. Cosmetica ?

USUS. Vermes.

LYCOPERDON BOVISTA.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi*.

OF. *Bovista : crepitus lupi*.

QUAL. Præstans : Styptica.

VIRT. Adstringens ; obstipans.

USUS. Hæmorrhagiæ ; hæmorrhoids ; ulcera ; inter-trigo.

LYCOPERDON TUBER.

G. *Tuffle.*

QUAL. Odor hircinus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS. Culinaris : anaphrodisia.

LYCOPODIUM CLAVATUM. Pollen.

CL. *Cryptog. O. Musci.**In Sylvis.*OF. *Semen lycopodii ; muscus clavatus.* A. *Common club-moss.*

QUAL.

VIRT. Exsiccans.

USUS. Excoriatura : ad inspergendas pillulas, bolos.

LYCOPODIUM SELAGO.

OF. *Muscus erectus.* A. *Fir club-moss.*

VIRT. Drastico-cathartica ; menagoga ; phthiriaca.

USUS. Hydrops ; pediculi.

LYSIMACHIA NUMMULARIA. Herba.

CL. *Pentand. O. Monog. Perennis ; in locis humidis, umbrosis, nemorosis.*OF. *Herba nummulariæ.* A. *Creeping loose-strife, or money-wort.*

QUAL. Subacida, subacris.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Leucorrhœa.

LYTHRUM SALICARIA. Folia ; radix.

CL. *Dodecand. O. Monog. Perennis ; in locis aquaticis.*

OF. *Salicaria* s. *lysimachia purpurea*. GE. *Rother Weiderich*. A. *Common or purple willow herb*.

QUAL. Præstans : Substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa ; dysenteria atonica ; leucorrhœa ; hæmoptysis.

M.

MALVA ALCEA.

Fores.

A. *Vervain mallow*.

CL. *Monadelph.* O. *Polyand.* In alpebus ad Sylvas.

MALVA ROTUNDIFOLIA. } Herba ; ra-
 ——— SYLVESTRIS. } dix.

Annua ; ad muros & edificia.

OF. *Malva vulgaris* s. *alcea*. G. *Mauve*. GE. *Pappeln*.

A. *Round-leaved or dwarf mallow*.

QUAL. Præstans : Fatua ; mucilaginoso.

VIRT. Involvens ; demulcens ; laxans.

USUS. Phlegmone ; stranguria ; tussis.

MARANTA GALANGA

Radix.

CL. *Monand.* O. *Monog.* Perennis ; Ind. orient.

OF. *Galanga major & minor*. G. *Galanga officinal*.

GE. *Galgantwurzel*. A. *Galangel*.

QUAL. Præstans : In principio resinoso magis quam in oleo volatili residens ; odor fragrans ; sapor amaricans , acris , aromaticus , zingibere magis pungens.

VIRT. Stimulans; calcfaciens; stomachica; menagoga. *Recent.* errhina.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; colica flatulenta, et lochialis; vomitus navigantium? Singultus; vertigo; *extern.* herpes.

DOOSIS. Gr. x-xv.

PRÆP. Tinctura.

MARRUBIUM VULGARE. Succus recens;
herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; ad vias et deserta.*

OF. *Marrubium album.* G. *Marrube blanc.* GE. *Weisser andorn; mariennessel.* A. *Common white hoarhound.*

QUAL. Præstans: odor graveolens; sapor subamarus, subsalsus, ingratus.

VIRT. Expectorans; menagoga; anthelminthica.

USUS. Asthma pituitosum; icterus; chlorosis; physconia abdominal.; ptyalismus ex hydragyro?

MATRICARIA CHAMOMILLA. Flores.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Chamomilla vulgaris* s. *nostras* s. *Chamemœlum vulgare.* G. *Camomille.* GE. *Kamillen-blumen.* A. *Corn feverfew.*

QUAL. In oleo volatili et principio extractivo amaro residens; odor fragrans, ingratus; sapor amarus.

VIRT. Leviter stimulans; antispasmodica.

USUS. Dyspepsia; vomitus gravidarum? cardialgia;

Dysenteria ; colica spasmodica ; febres intermittentes ; hysteria ; dysuria ? Forma balnei , enematis , cataplasomatis , infusi , pulveris .

DOS. *pulveris* : Drach. β - j. In infuso drach. ij - iij ad $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ j aquæ .

PRÆP. Aqua ; oleum volatile ; syrupus .

MATRICARIA PARTHENIUM. Herba ; Flores.

CL. & O. *præced.* Perennis ; in locis incultis .

OF. *Matricaria*. G. *Matricaire*. GE. *Mutterkraut*. A. *Common feverfew* .

QUAL. Odor nidorosus , halituosus ; sapor amarus .

VIRT. Antispasmodica ; stomachica ; menagoga ; lactifuga .

USUS *externus* forma balnei , enematis , cataplasomatis . *Internus* : colica ; hysteria ; dyspepsia .

MELALEUCA LEUCADENDRON. Oleum volatile ex foliis destillatione obtentum.

CL. *Polyadelph.* O. *Polyand.* Arborea ; insul. .

Sumatræ & nov. Caledoniæ .

NATIVIS *cajoput dictum ex cajo arbor , et puti alba ; id est , arbor epidermide alba notatus* .

OF. *Oleum cajeput* G. *L'huile de cajeput*. GE. *Cajeputoel*. A. *Cajeput-oil* .

QUAL. Odor intense fragrans , aromaticus .

VIRT. Stimulus ; antispasmodica ; carminativa ; menagoga ; insecta fugans .

USUS *intern.* Cardialgia sputatoria; colica flatulenta; spasmi; paralysis. *Extern.* Anaphrodisia? Varix ani; odontalgia; paralysis linguæ.
 DOS. Gut. iij-x. Sæpius de die cum saccharo.

MELISSA OFFICINALIS.

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Perennis; *Canariensis*; *hortensis*.

OF. *Melissa citrata* s. *hortensis*. G. *Melisse*; *citronnelle-mélisse*. GE. *Zitronen-melisse*. A. *Common balm*.

QUAL. In oleo volatili residens; fragrans odore citri; sapor aromaticus.

VIRT. Leviter stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga.

USUS *infusi*: Hysteria; palpitatio; chlorosis; amenorrhœa.

PRÆP. Infusum; aqua; alcohol; oleum volatile.

MELISSA CALAMINTHA.

Herba.

CL. & O. *præced.*

Europ. austr.

OF. *Calamintha montana*. GE. *Bergmünze*. G. *Calamen des montagnes*. A. *Mountain balm or calamint*.

QUAL. Odor debilior præcedent. sapor leviter aromaticus.

VIRT. Stomachica; expectorans; resolvens.

USUS Asthma.

MELITTIS MELISSOPHYLLUM. Folia.

CL. & O. *præced.*

Perennis.

OF. *Melissophyllum*. G. *Mélisse batarde*. A. *Bastard balm*.

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor subamarus.
 USUS *infusi* : Amenorrhœa; nephritis?

MENISPERMUM COCCULUS. Fructus,
 seu nux.

CL. *Diæc.* O. *Dodecand.* Sarmentosa; Ind. orient.
 OF. *Cocculus indicus*; semen *cocculi*. G. Coques du
Levant. GE. *Kokkelkærner*, *Fischtollkærner.* A.
Indian cockles; *Indian berries.* H. *Coca de Levante.*
 QUAL. Venenata; sapor summe amarus, urens.
 VIRT. Narcotica; phthiriaca.
 USUS. Ad necandos pisces, pediculos.

MENTHA AURICULARIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosperm.* Ind. orient.
 QUAL. Fragrans; amara.
 VIRT. Resolvens.
 USUS. Cophosis; tumores.

MENTHA CERVINA. Herba.

CL. & O. *præced.* Europ. austr..
 N. B. Floribus verticillatis, bracteis palmatis,
 foliis linearibus, staminibus corolla longioribus..
 A. *Hyssop-leaved mint.*
 QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, gratior
 pulgègio.

MENTHA CRISPA. Folia; herba.

CL. & O. *præced.* Perennis; hortensis.
 OF. *Mentha crispa.* G. *Menthe frisée.* GE. *Kraus-*
münze. A. *Curled mint.* H. *Menta rizada.*

QUAL. In oleo volatili residens : Odor fragrans ; sapor aromaticc-amaricans.

VIRT. Stimulans ; carminativa ; menagoga ; antaphrodisiaca ; resolvens.

USUS. Cephalalgia ; hysteria ; anorexia ; vomitus ; colica ; pertussis ; satyriasis. *Externus* : Dolor artuum a spasmo ; coagulum lactis in mammis ; ecchymoma ; tumores frigidi.

DOS. *infusi* : Unc. j. ad ℥j aquæ.

PRÆP. Oleum volatile ; alcohol ; aqua ; conserva ; syrupus.

MENTHA PIPERITA.

Herba.

CL. & O. *præced.* Perennis ; Angliæ ; hortensis.

OF. *Mentha piperitis*. G. *Menthe poivrée*. GE. *Pfeffermünze*. A. *Peppermint*. H. *Menta piperita*.

QUAL. Eximia : In oleo volatili camphorino residens : Odor fragrans ; sapor acris , aromaticus cum sensu frigoris.

VIRT. Eadem ac præcedentis , sed fortior.

USUS. Idem ac præcedentis.

PRÆP. Oleum volatile ; alcohol ; aqua.

MENTHA PULEGIUM.

Herba.

CL. & O. *præced.* Perennis ; Europ. austr.

OF. *Pulegium*. G. *Menthe pouliot*. GE. *Poley*. A. *penny-royal mint*. H. *Poleo*.

QUAL. In oleo volatili residens ; eadem ac menthæ crispæ sed acrior.

VIRT. Eadem ac menthæ crispæ.

USUS. Spasmi durante menstruatione ; tussis ; raucedo.

MENTHA SATIVA.

A. *Marsh mint.*

MENTHA SYLVESTRIS. Herba.

OF. *Menthastrum*; *mentha longifolia*. A *Horse mint.*

MENTHA VIRIDIS. Herba.

N. B. Spicis oblongis; foliis lanceolatis, nudis, serratis, sessilibus; staminibus corolla longioribus.

OF. *Mentha spicata*. G. *Baume verte*. A. *Spear-mint.*

QUAL. Eadem ac menthæ crispæ sed gratior.

MENYANTHES TRIFOLIATA. Folia.

CL. Pentand. O. Monog. Perennis; in locis humidis, paludosis.

OF. *Trifolium fibrinum* s. *aquaticum* s. *palustre* s. *paludosum*. G. *Trefle de marais*. GE. *Bitterklee*; *feberklee*. A. *Common buck-bean* or *marsh-trefoil*; H. *Menyanthes de tres en rama*.

QUAL. In principio extractivo amaro residens; sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Adstringens; roborans; anthelminthica; diuretica; deobstruens.

USUS *infusi*, *vel extracti*: Dyspepsia; chlorosis; leucophlegmatia; physconia abdomin.; icterus; asthma; arthrodynia; podagra atonica; intermittentes; scorbutus; lepra; herpes; ulcus malignum.DOSIS *infusi*: Unc j ad libram j aquæ.

PRÆP. Extractum: Dosidrach. ij.

MERCURIALIS ANNUA. Herba.

CL. *Diæc.* O. *Enneand.*OF. *Mercurialis.* G. *Mercurial.*QUAL. *Suspecta.*VIRT. *Cathartica; hypnotica; repellens; cosmetica.*USUS. *Decocti pro clysmatibus; syphilis?*

MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM. Herba.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.**Annua.*A. *Annual mercury or dramond fig marygold or ice-plant.*QUAL. *Sapor blande salinus, refrigerans.*USUS *succi* : *Dolor spasmodicus vesicæ urinariæ; dysuria; ischuria; calculus; pertussis.*DOS. *Unc. j - jß ad ℥j aquæ in decocto.*

MESPIUS GERMANICUS. Fructus.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.**Arborea.*OF. *Mespilus.* A. *Narrow & broad leaved dutch medlar.*QUAL. *Styptico-farinosa.*VIRT. *Dulcis; subadstringens.*

USUS.

MIMOSA CATECHU. Succus extractivo seu gummi-resinosus, decoctione lighi et inspissatione obtentus.

CL. *Polyg.* O. *Monæc.* *Arborea; Ind. orient. provincia Bahar.*OF. *Catechu s. terra Japonica.* G. *Cachou.* GE. *Katechu; kaschu.* A. *Catechu; Japan-earth.*

QUAL. In principio extractivo-resinoso adstringente residens; sapor subamarus, postea dulcescens, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS *pulveris vel tincturæ*. Diarrhœa; dysenteria atonica; hæmorrhœa. *Externas*: Ulcus laxum; relaxatio uvulæ et gingivarum; defluxio acris catarrhalis.

DOS. *pulv.* gr. x-xxx-drachm j.

PRÆP. Tinctura, in aqua et alcohole fere æque solubilis.

MIMOSA NILOTICA.	} Gummi; et succus fructus immaturi
———— SENEGAL.	
	} expressus et inspissatus.

OF. *Gummi arabicum*: succus acaciæ veræ seu *Ægyptiacæ* inspissatus. G. *Gomme arabique*. GE. *Arabischer gummi*. A. *Gum arabic*; *gum senegal*: *Ægyptian & Senegal mimosa*.

QUAL. *Gummi*: Mucilaginosa; dulcis; nutriens. *Succi inspissati in aqua solubilis*: Styptica.

VIRT. *Gummi*: Involvens. *Succi*: Roborans; adstringens.

USUS *gummi internus* in solutione aquosa: Dysuria; dysenteria; paraphonia catarrhalis; ophthalmia.

MOMORDICA ELATERIUM. Radix; fructus recens; succus ejusdem extractivo-resinosus inspissatus.

CL. *Menœc.* O. *Syng.* *Europ. austr.*; *annua*; *hortensis*, *agrestis*.

OF. *Elaterium* s. *cucumis asini*us. G. *Momordique saus vrilles* ; *concombre sauvage*. GE. *Esselsgurken* ; *springgurken*. A. *Squirting momordica* or *cucumber*.

QUAL. Utriusque : Sapor intensè amarus, acris, nauscosus.

VIRT. Emetica ; drastico-cathartica ; menagoga ; diuretica.

USUS. Obstipatio ; hydrops ; amenorrhœa ; scrophula ?

DOS. Radicis gr. xv-xxx.

PRÆP. Succus inspissatus, vulgo *Elaterium* dictus, dosi gr. i-iv.

MONARDA FISTULOSA.

Folia.

CL. *Diand.* O. *Monog.* Perennis ; *Canadensis*.

OF. *Herba monardæ*. A. *Purple monarda*.

QUAL. Odor fragrans ; sapor aromaticus, amari-cans.

VIRT. Nervina ; stomachica ; deobstruens.

USUS *infusi* : Febræ intermittentes.

MORUS NIGRA. Fructus recens ; folia ; cortex.

CL. *Monœc.* O. *Tetrand.* Arborea ; *Europ. austr. hortensis*.

OF. *Fructus mori recentis*. G. *Maulbeeren*. A. *Common mulberry-tree*.

QUAL. *Fructus* : Sapor dulcis, subacidus. *Foliorum* : Stypticus.

VIRT. Refrigerans. *Folior* : Adstringens.

USUS. Febres. *Corticis* : *Tænia*.

PRÆP. Rob; syrupus.

MYRICA GALE.

folia.

CL. *Diæc.* O. *Tetrand.*

Fruticosa ; *paludosa* ;

Europ. austr.

OF. *Myrtus Brabantica.* G. *Piment royal.* GE. *Myrtlen.* A. *Sweet gale willow* ; or *candle berry myrtle.*

QUAL. Luteo - tinctoria ; odor nidorosus ; sapor amarus.

VIRT. Narcotica.

USUS. Psora ; pediculi.

MYRISTICA AROMATICA. (SWARTZ).

Nux seu fructus ; *nucleus* ; *integumentum nuclei reticulare vulgo Macis dictum.*

CL. *Monæc.* O. *Monand.* *Arborea* ; *insul. Bandæ.*

Myristica moschata. (THUNBERG).

Myristica officinalis. (LINN.).

OF. *Nux moschata* : *macis.* G. *Noix muscade* : *mace.*

GE. *Muskatnuss* : *muskatblüthe.* A. *Nutmeg* : *mace.*

QUAL. *Utriusque* : In oleo volatili simul ac fixo aromatico residens : Odor fragrans ; sapor grate amaricans , aromaticus , stypticus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; carminativa ; obstipans ; *majori dosi* : hypnotica ; sedativa.

USUS. Dyspepsia ; flatulentia ; colica ; diarrhœa ; stranguria.

DOS. Gran. IV - XX.

PRÆP. *Nux condita* ; *oleum volatile et oleum fixum fragrans.*

MYROXYLON PERUIFERUM. Balsamum.

CL. *Decand. O. Monog. Arborea; Amer. merid.*

OF. *Balsamum Peruvianum. G. Baume du Pérou. GE.*

Peruvianischer Balsam. A. Balsam of Peru.

QUAL. Præstans : odor suaveolens ; sapor acris.

USUS. Dyspepsia ; spasmi ; amenorrhœa ; blennorrhœa ; morbi viscerum pituitosi ; tabes ; ulcera.

Extern. Arthrodynia rheumatica.

DOSIS. Gran. vi-xxx. Sæpius de die cum vitello ovi aut saccharo.

MYRTUS CARYOPHYLLATA. Cortex.

CL. *Icosand. O. Monog. Arborea; Ind. orient. & occident.*

OF. *Cassia caryophyllata. G. Nelkenrinde; nelkenzimmt.*

QUAL. Odor fragrans ; sapor aromaticus , pungens.

VIRT. Stomachica.

USUS.

MYRTUS COMMUNIS. Folia ; Baccæ.

CL. & O. *præced. Arborea; Europ. austr.*

OF. *Myrtus. A. Common myrtle.*

QUAL. Odor fragrans ; sapor aromaticus , substypticus.

VIRT. Calefaciens ; adstringens.

USUS. Profluvia.

MYRTUS PIMENTA. Baccæ.

CL. & O. *præced. Arborea; Ind. occident.*

OF. *Piper Jamaicence* ; *fructus pimenti* (*FALSO semen anomi veri*). G. *Poivre de Jamaïque*. GE. *Nelkenpfeffer* ; *englisches gewürz*. A. *Jamaica pepper or long leaved pimento* , or *allspice*.

QUAL. Odor fragrans , gratus ; sapor aromaticus.

VIRT. Calefaciens ; stomachica ; stimulans.

USUS.

N.

NEPETA CATARIA.

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis* ; *in muris antiquis*.

OF. *Cataria* ; *nepeta*. GE. *Katzenmünze*. A. *Common catmint*.

QUAL. Odor hircinus , felibus gratus ; sapor nauseosus , amarus.

VIRT. Nervina ; menagoga ; anthelminthica.

USUS. Hysteria ; chlorosis.

NERIUM ANTIDYSENTERICUM. Cortex.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa* ; *Ind. orient.*

OF. *Cortex conessi* ; *cortex antidysentericus* , seu *proflurii*. A. *Oval leaved rosebay*.

QUAL. Lactescens ; sapor amarus. *Recentis* : Acris ; virosa.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Intermittentes pertinaces ; sub finem dysenteriae ; diarrhoea ; odontalgia.

NICOTIANA TABACUM. Folia siccata.

CL. *Pentand. O. Monog.**Annua.*OF. *Herba tabaci; nicotiana.* G. *Tabac.* GE. *Tobak.*A. *Tobacco.*

QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico acris residens; odor nauseosus; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Diuretica; emetica; drastico-cathartica; stimulans; errhina; phthiriaca; deobstruens; sialogoga; narcotica.

USUS *internus* tincturæ, vini, aut extracti: Hydrops; morbi pectoris pituitosi; seirrhus; ieterus.*Externus* furæ (melius infusi) forma enematis:

Obstipatio; ileus; hernia incarcerationata. Forma

lotionis: psora; ozæna; phimosis. — Pulvis

tabaci cum aqua vel alcohole diluto in pastam re-

ductus, carpo interno applicatus: Intermittentes.

N. B. Idem præcordiis appositus vomitum ciet.

DOS. *Folior siccata.* drach. semis- $\frac{j}{2}$ ad unc. $\frac{iv}{2}$ aquæinfusæ per horam. *Vini vel tincturæ:* Gutt XL-C

omni bihorio in hydropo.

PRÆP. Extractum; tinctura; vinum *Ph. Edinb.*

NIGELLA SATIVA.

Semen.

CL. *Polyand. O. Tetragyn. annua; insul. archipel.*OF. *Semen nigellæ s. melanthii.* GE. *Schwarzkümmel;**schwarzer koriander.* A. *Small fennelflower.*

QUAL. Venenata: in oleo volatili, simulque fixo residens: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; lactifera; errhina; sialagoga, menagoga; anthelminthica.

USUS.

NYMPHÆA ALBA. Radix; flores.

CL. *Polyand. O. Monog. Perennis; in locis paludosis, aquosis.*

OF. *Nymphæa. G. Nenufar blanc. A. White water lily.*

QUAL. *Florum* : Fragrans. *Radicis* : In oleo acri residens, exsiccatione avolans.

VIRT. *Florum* : antaphrodisiaca? Refrigerans; hypnotica. *Radicis* : Vesicans.

NYMPHÆA LUTEA.

A. *Yellow water lily.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

O.

OCYIMUM BASILICUM. Herba; semen.

CL. *Didyn. O. Gymnosp. annua; hortensis.*

OF. *Herba Basilici. GE. Basilienkraut. A. Common sweet basil.*

QUAL. *Herbæ* : Odor fragrans; sapor aromaticus. *Seminis* : Mucilaginosa.

VIRT. Nervina.

USUS Vomitus; rheumata.

OENANTHE CROCAT. Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn. Perennis; Europ.*

A. *Hemlockwater-dropwort.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT. Emolliens.

USUS.

OLEA EUROPÆA. Oleum fixum, expressione fructus paratum.

CL. *Diand. O. Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Oleum olivarum.* G. *Huile d'olives.* GE. *Baumöel.*

A. *Common European olive: olive-oil.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emolliens; involvens.

USUS *intern. & extern.*: Dysenteria; tenesmus; tussis; stranguria; nephritis; enteritis; morsura.

N. B. Oleum calidum totî corporis superficiei frictione adplicatum donec sudor profluat, curare æque ac arcere pestem, nuper didicimus.

ONONIS ARVENSIS

———— SPINOSA.

} Radix; herba.

CL. *Diadelph. O. Decand.* *Perennis; ad vias, & in locis sterilibus.*

VAR. A. flor. Purpur. B. Flor. alb.

OF. *Anonis s. Ononis.* G. *Arrête-bœuf; hugrane.* GE.

Hauhechel. A. *Thorney purple & white rest-harrow.*

QUAL. Sapor subacris, ingratus.

VIRT. Diuretica.

USUS. Testiculi tumor durus; hydrocele; icterus; ischuria?

DOS. Pulveris drach. j; in decocto unc. semis ad libram j aquæ.

ONOPORDIUM ACANTHIUM. Herba recens; succus expressus.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Carduus tomentosus*; *acanthium* G. *Pédane*. GE.
Weg-distel; *grosse zellblume*. A. *Woolly onopordium* or *cottonthistle*. H. *Toba*.

VIRT. Specifica anticanerosa?

USUS *succi recentis* externe adplicati: Carcinoma;
 præcipue ulcera faciei canerosa.

ONOSMA ECHIOIDES.

Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

N. B. Substitutur *anchusæ tinctoriæ*.

OF. *Anchusa lutea*.

QUAL.

VIRT. Menagoga?

USUS.

OPHIORRHIZA MUNGOS.

Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* Perennis; Ind. orient.

OF. *Radix serpentum* s. *mungos*.

QUAL. In extractivo amaro residens; sapor subsalsus, intense amarus.

VIRT.

USUS. Morsura; hydrophobia? Mania?

OPHIOXYLUM SERPENTINUM. Lignum.

CL. *Polyg.* O. *Monœc.* Arborea; Ind. orient.

OF. *Lignum serpentum* s. *serpentinum*. A. *Scarlet-flowered ophioxylum*.

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS *infusi*: Quartana; morsura.

DOS. Drach. semis ad libram j aquæ.

ORCHIS BIFOLIA.

Radix.

CL. *Gynand. O. Diand.**Perennis.*OF. *Satyrion.* GE. *Stendelwurz.*QUAL. et VIRT. *Sequentium.*

ORCHIS MASCULA.

———— MILITARIS.

———— MORIO, etc.

} Radix.

CL. & O. *præced.**Perennis; in Syris.*OF. *Radix salep; salap. A. Male orchis; man orchis & female orchis.*QUAL. *Mucilaginosæ. N. B. Odor quarumdam specierum hircinus.*VIRT. *Nutrients; involvens; aphrodisiaca?*USUS. *Anaphrodisia? Dysenteria; tabes; ulcera interna.*DOS. *Drach. ij pulveris ad libram j aquæ in decocto.*

ORIGANUM CRETICUM.

Spicæ.

CL. *Didyn. O. Gymnosp. Perennis; Europ. austr.*OF. *Origanum Creticum. G. Origan. GE. Spanischer kopsen; kretische dosten.*QUAL. *In oleo volatili acri residens: odor fragrans, gratus; sapor acris, aromaticus, amaricans.*VIRT. *Stimulans; menagoga; resolvens.*USUS. *Odontalgia: In balneis.*PRÆP. *Oleum volatile.*

ORIGANUM DICTAMNUS.

Folia.

CL. & O. *præced. Perennis; suffruticosa; Archipel.*OF. *Dictamnus Creticus. G. Dictame de Candie. GE. Kretischer diptam. A. Dittany of Candia.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans debilis; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; nervina; menagoga; resolvens.

USUS.

PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM MAJORANA. Herba.

CL. & O. præced. *Annua; hortensis, Europ. austr.*

OF. *Majorana*. G. *Marjolaine*. GE. *Majoran*. A. *Sweet or knotted marjoram*. H. *Almoradux*.

QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; menagoga; errhina; resolvens.

USUS. Anosmia; coryza.

PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM SYRIACUM. Herba.

A. *Syrian herb mastich*.

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

ORIGANUM VULGARE. Herba.

CL. & O. Præced. *Perennis; in locis montanis, nemorosis, siccis.*

OF. *Origanum vulgare*. G. *Origan*. GE. *Dosten; wohlgemuth*. A. *Common marjoram*. H. *Origano sylvestre*.

QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus, amaricans, subacris: tinctoria.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS. Tussis; tabes pulmonalis pituitosa; chlorosis;
œdema; In balneis frequens.

N. B. Theæ succedaneum.

PRÆP. Oleum volatile.

ORYZA SATIVA.

Semen.

CL. *Hexandr. O. Digyn.*

Annua.

OF. *Grana oryzæ. G. Riz. GE. Reis. A. Common rice. H. Arroz.*

QUAL. Mucilaginoso; farinosa; dulcis.

VIRT. Nutriens; involvens.

USUS *Cibarius*; Diarrhœa; dysenteria.

OSMUNDA REGALIS.

CL. *Cryptog. O. Filices.*

A. *Royal or flowering osmunda.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

OXALIS ACETOSELLA. Herba recens; Folia.

CL. *Decand. O. Pentag.*

Perennis; Europ.

OF. *Acetosella s. lujula. G. Oseille des bucherons. GE. Sauerklee. A. Common wood-sorrel. H. Oxalide acederilla; aleluja.*

QUAL. In acido peculiari residens; sapor intense acidus, gratus.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres. *Externus fol. recent. contusor. forma cataplasmatidis; ulcera glandularum scrophulosa.*

PRÆP. Oxalas acidulus potassæ *vulgo* sal acetosellæ.
 (G. Oxalate acidule de potasse :) Acidum oxalicum ; conserva ; syrupus.

OXALIS CERNUA.

QUAL. et VIRT. Præced.

OXALIS CORNICULATA.

CL. & O. præced.

Europ. austr.

A. *Yellow wood-sorrel.*

QUAL. et VIRT. præcedentis.

P.

PAEONIA ANOMALA.

Radix.

CL. *Polyand. O. Digyn.*

Perennis ; alpina.

QUAL.

VIRT.

USUS. Intermittentes.

PAEONIA OFFICINALIS. Radix ; flores ; semen.

CL. & O. præced.

OF. *Paeonia*. G. *Piroline*. GE. *Paeonien ; gichtrosen ; pfingstrosen*. A. *Common paeony*.

QUAL. *Radicis recentis* : Odor teter, fœtidus. *Siccata* : sapor farinaceus, substypticus.

VIRT. Narcotica ; antispasmodica ; substringens.

USUS. Epilepsia ; Intermittentes. (PALLAS).

N. B. Succus radicis recentis paeoniæ foliis bifidis expressus majori dosi in epilepsia tentari meretur.

PANAX QUINQUEFOLIUM. Radix.

CL. *Polyg. O. Diac. Perennis; Tartariæ; Amer. septentr.*

OF. *Radix ginseng. A. Ginseng.*

QUAL. Sapor gratus, leniter aromaticus.

VIRT. Leniter stimulans. — Aphrodisiaca?

USUS. Anaphrodisia? asthenia? marasmus?

DOS. Scrup. j-drachm j.

PANICUM DACTYLUM. Radix.

CL. *Diand. O. Digyn. Europ. austr.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Substituitur radici tritici repentis in Italia.

PANICUM ITALICUM. Semen.

CL. & O. *præced. Annuæ.*

OF. *Milii semen. G. Millet. A. Italian panic-grass.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; involvens.

USUS.

PAPAVER RHŒAS. Flores.

CL. *Polyand. O. Polyg. superfl. Annuæ.*

OF. *Papaver rhœas, seu erraticum. G. Parot coquelicot. GE. Klatschrosen. A. Common red poppy.*

H. *Adormidera sylvestris amapola.*

QUAL. Subamara.

VIRT. Subnarcotica.

USUS.

PRÆP. Syrupus lacte ruber,

PAPAYER SOMNIFERUM. Capsulæ seminales : Succus gummi - resinosus incisione vel expressione capsularum seminalium immaturarum obtentus, vulgo *Opium* dictus.

CL. & O. *præced.* *Annua*; *Ægypt. & Asiæ meridion.*; *Europ. hortensis.*

OF. *Capita papaveris albi* : *Opium.* G. *Pavot somnifere* : *Opium.* GE. *Weisse mohn* : *Mohnsaft* A. *Common white poppy* : *Opium.*

QUAL. *Heroica*: in principio narcotico cum gummi-resinoso volatili juncto residens; odor teter, virosus; sapor nauseosus, acris, amarus.

VIRT. *Narcotica*; *sudorifica*; *obstipans* : *majori dosi stimulans*; *cardiaca.*

USUS *internus* : Dolor ex irritatione aut spasmo; dolor phlegmasiarum post evacuationes debitas; intermittentes ante paroxysmum vel finito stadio frigoris; dysenteria atonica; diarrhœa; Cholera; tussis ex acri tenui; lochia dolorifica et hæmorrhagiæ ab irritatione locali aut spasmo; menstruatio dolorifica; podagra atonica (magna dosi); rheumatismus post v. s. necessarias; asthma; hysteria; nephralgia; cardialgia; colica pictonum; tetanus; convulsio; blennorrhagia; tumor epididymidis vel testiculi syphilitica; ulcera syphilitica rebellia; ulcera phagedænica; gangræna senilis. *Externus* forma cnematis, fots, linimenti.

DOSIS. Gr. I-XV de die.

PRÆP. Solutio opii in vino vel alcohole diluto ;
extractum aquosum ; syrupus ; decoctum capsu-
larum ; linimenta varia.

N. B. Semina nulla qualitate , nisi oleosa demul-
cente , gaudent.

PARIETARIA OFFICINALIS. Herba ;
radix.

CL. *Polyg. O. Monœc.* Perennis.

OF. *Parietaria. G. pariétaire. GE. Glaskraut ; mauer-
kraut. A. Wall pellitory.*

QUAL. Aquoso-insipida.

VIRT. Refrigerans ; diuretica.

USUS. Stranguria ; tabes ?

PARIS QUADRIFOLIA. Herba ; baccæ.

CL. *Octaud. O. Tetrag.* Perennis.

A. *Herb paris ; true love or one berry.*

QUAL. Odor teter ; sapor dulcescens.

VIRT. Antispasmodica ; narcotica.

USUS. Convulsio ; mania ; bubo ; ophthalmia.

PARNASSIA PALUSTRIS. Herba ; flores.

CL. *Pentand. O. Tetrag.* Perennis.

OF. *Hepatica alba. A. Grass of Parnassus.*

QUAL. Amariçans.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PASTINACA OPOPANAX. Succus gummi-
resinosus concretus, incisione plantæ
et radicis, obtentus.

CL. *Pentand. O. Didyn.* Perennis; *Europ. austr.*

OF. *Gummi opopanax. A. Rough parsnep.*

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens;
od. r. gravcolens; sapor acris, amarus.

VIRT. Nervina; eccoprotica; carminativa; mena-
goga.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PASTINACA SATIVA.

Semen.

CL. & O. *præced.*

Biennis.

OF. *Pastinaca. A. Garden Parsnep.*

QUAL.

VIRT?

SUSUS. Intermittentes?

DOS. *pulveris*: Drach j - Unc. semis.

PEDICULARIS PALUSTRIS. } *Herbare-*
Aliæque SPECIES. } *cens.*

CL. *Didyn. O. Gymnops.*

A *Lousewort.*

QUAL. Ingrata.

VIRT. ?

USUS. Fistula; ulcus callosum.

PENAEAE SARCOCOLLA. } *Gummi-resina.*
———— MUCRONATA. }

CL. *Tetrand. O. Monog.* Fruticosa; *Æthiopica.*

N. B. *Gummi sarcocollæ offic. ex his plantis provenire creditur.*

QUAL. Inodora; sapor amaricans, acris, nauseosus.
VIRT. Stimulans; cathartica.

SUS.

PENTAPETES MUHUCUNDA? Flores.

L. Monadelph. O. Dodec.

Ind. orient.

Muhucunda BENGALIS.

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT.

SUS infusi flor. recent. Blennorrhagia. Pulv. flor.
siccata, naribus attracti: Cephalæa nervosa.

PETIVERA ALLIACEA.

Herba.

L. Hexand. O. Trigyn. Fruticosa; Ind. occident.

F. *Scorodonia herba.* A. Common guinea hen-weed.

QUAL. et VIRT. allium æmulans.

SUS. Intermittentes.

PEUCEDANUM OFFICINALE. Radix.

L. Pentand. O. Digyn.

Perennis.

F. *Peucedanum.* A. Common sulphur-wort.

QUAL. Lactescens; odor nauseosus; sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica? Expectorans?

SUS. Ulcera; odontalgia.

PEZIZA AURICULA.

L. Cryptog. O. Fungi.

F. *Auricula Judæ; fungus sambuci.*

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS *externus* forma *gargarismatis* : Angina? *Collyrii* : Ophthalmia?

PHALARIS CANARIENSIS. Semen.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

OF. *Semen canariense.* A. *Manured canary grass.*

QUAL. Farinacea.

VIRT.

USUS.

PHASEOLUS VULGARIS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.*

A. *Kidney-bean.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; cosmetica?

USUS.

PHELLANDRIUM AQUATICUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis*; in *locis paludosis.*

OF. *Phellandrium s. fœniculum aquaticum.* G. *Phellandrie.* GE. *Wasser-fenchel* A. *Water phellandrium.* H. *Milenrama aquatico.*

QUAL. Odor et sapor aromaticus, acris.

VIRT. Stimulans; narcotica?

USUS *pulv. vel decocti* : Dyspepsia; intermittentes hypochondriasis? Ulcera scrophulosa, atonica tabes pulmonalis pituitosa.

DOS. Pulveris unc. semis-j cum lacte omni mane; pro decocto unc j ad libram unam aquæ vel aquæ calcis.

PHŒNIX DACTYLIFERA. Fructus.

Palma; Asiæ & Africæ.

OF. *Dactyli.* G. *Dattes.* A. *Date Palm-tree.*

QUAL. Sapor dulcis, mucilaginosus.

VIRT. Nutriens; expectorans.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

PHYLLANTHUS EMBLICA. Fructus
siccatus cum nuce.

L. *Monæc.* O. *Triand.* *Arborea; Ind. orient.*

F. *Myrobalani emblicæ.* A. *Shrubby philanthus.*

UAL. Sapor acidulus, austerus, subacris.

IRT. Adstringens. *Infusi*: Cathartica.

SUS. Stomacace; dysenteria.

HYSA LIS ALKEKENGI. Baccæ; semina.

L. *Pentand.* O. *Monog.*

F. *Solanum vesicarium; baccæ alkekengi.* G. *Coqueret; alkékenge.* GE. *Judenkirschen.* A. *Wintercherry.* H. *Vegiga de perro.*

UAL. fructus: Sapor grate acidulus. *Corticis*
fructus: Sapor intense amarus.

IRT. fructus: Diuretica; eccoprotica.

USUS. Nephritis; Dysuria; hydrops.

PHYTOLACCA DECANDRA. Succus fo-
liorum expressus.

L. *Decand.* O. *Decagyn.* *Perennis; Virginicæ;*
passim hortensis.

Phytolacca. G. *Phytolaque; raisin d'Amérique.*

GE. *Amerikanische kermesbeeren*; *Amerikanischer nachtschatten*. A. *Braunching phytolac* or *virginian poke*. H. *Yerba carmin*.

QUAL. *Tenellæ* : *Aquosa*. *Adultæ* : *Acris*.

VIRT. *Corrodens*; *anticanerosa*?

USUS. *Succi guttatim instillati* : *Ulcera canerosa*.

PIMPINELLA ANISUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua*; *Ægyptiaca*.

OF. *Semen anisi*. G. *Anis*. GE. *Anies*. A. *Anise*.

QUAL. In oleo volatili non acri residens; sapor dulcescens, aromaticus; odor virosus, fragrans.

VIRT. *Stimulans*; *carminativa*; *lactifera*; *resolvens*.

USUS *pulveris* : *Flatulentia*. *Olei* : *Rheumatismus*.

DOSIS *pulveris* : *Scrup. j - drach. semis*. In infuso :

Unc. semis ad libram j aquæ.

PRÆP. *Oleum volatile*. *Gutt. x - drachm ij pro dosi*.

PIMPINELLA MAGNA. Radix.

CL. & O. *præced* *Perennis*.

OF. *Pimpinella nigra*. G. *Grand boucage*. GE. *Schwarze bibernellwurzel*. A. *Great burnet saxifrage*.

QUAL. In oleo volatili cæruleo residens; odor et sapor aromaticus.

PIMPINELLA SAXIFRAGA. Radix.

CL. & O. *præced* *Perennis*.

N. B. VARIETAS. A. *Alba*. B. *nigra*.

OF. *Pimpinella alba s. nostras.* G. *Petit boucage* ;
saxifrage. GE. *Weisse Bihernellwurzel.* A. *Small*
burnet saxifrage.

QUAL. Præstans : In principio resinoso acri residens :

Odor hircinus ; sapor acris , calidus.

VIRT. Stimulans ; diuretica ; menagoga ; resolvens.

USUS *pulveris et tincturæ* : Angina serosa ; hysteria.

PRÆP. Tinctura.

PINUS ABIES. Summitates ; resina granulata
 incisione arboris obtenta.

CL. *Monæc.* O. *Monadelph.* *Arborea.*

OF. *Abies : resina alba : pix Burgundica : Colopho-*
nium. G. *Sapin.* GE. *Tanneubaum.* A. *Norway*
spruce, fir-tree. H. *Pino abeto.*

QUAL. *Summitatum seu foliorum teneriorum acerc-*
sorum : Resinosa ; sapor acescens , resinosus. — *Re-*
sinae : Sapor gratus , amaricans ; odor fragrans.

VIRT. Stimulans ; diuretica ; diaphoretica.

USUS *decocti summitatum* : Morbicutis. *Resinae fusæ*
cum sebo externus : Lepra ichthyosis CULLEN.

PRÆP. Resina fusa per linteum colata , vulgo *Pix*
Burgundica. Resina addito aceto cocta ad siccitatem
 usque , vulgo *Colophonium.*

PINUS BALSAMEA. Resina liquida, incisione
 aut perforatione arboris obtenta.

CL. et O. *præced.* *Arborea ; Amer. septentr.*

OF. *Balsamum Canadense.* GE. *Kanadischer balsam.*
 A. *Canada balsam.*

QUAL. Resinosa ; odor fragrans , gratus ; sapor subaro-
 maticus , leviter pungens , amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica.

USUS. Bleorrhœa; morbi cutis; acro herpeticum
in corpore vagum; morbi viscerum pituitosi.

DOSIS. Gut. xl—lx.

PINUS CANADENSIS. Cortex.

G. *Sapinette de Canada*. A. *Hemlock-Spruce*.

USUS decocti: Scorbutus; syphilis Canadensis
(BOWMANN).

PINUS CEMBRA. Resina liquida.

CL. et O. præced. Arborea; alpina.

OF. *Balsamus Carpathicus*; *Balsamus Libani*. A.
Siberian stone pine-tree.

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans.

USUS. Bleorrhœa; ulcera.

PINUS LARIX. Resina liquida.

CL. et O. præced. Arborea; alpina.

OF. *Terebinthina Veneta s. larigna*. G. *Térébinthine*:
Melèse. GE. *Terpentin*: *Lerchenbaum*. A. *Veni-*
tian turpentin: *common white larch-tree*.

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans; urinam violaceo odore
imbuens.

USUS. Idem ac præced.

PINUS MUNGHOS. (SCOPOLI.) Oleum des-
tillatione obtentum.

CL. et O. præced. Arborea; German. *Hungar. alpina*.

OF. *Oleum templinum*. A. *Krummholz-oel*.

PINUS PINEA.

Nuclei.

CL. & O. præced.

*Arborea; Europ. austr.*OF. *Pinei*. G. *Pin-pignier* A. *Stone pine-tree*.QUAL. *Dulcis; oleosa*.VIRT. *Nutrients*.USUS. *Tabes; stranguria*.PINUS PICEA. Resina liquida, incisione
arboris obtenta.

CL. & O. præced.

Arborea.OF. *Terebenthina Argentoratensis: resina alba*. A. *Silver fir-tree*.PINUS SYLVESTRIS. Turiones; resina
alba liquida, perforatione aut incisione
arboris obtenta.

CL. & O. præced.

Arborea.OF. *Terebinthina communis: Pix alba*. G. *Térében-
thine: résine blanche; galipot*. GE. *Gemeiner ter-
pentin; weisses pech*. A. *Common turpentin; white
rosin: scots fir or pine-tree*.QUAL. *Resinosa; acris; amara*.VIRT. *Stimulans; diuretica; diaphoretica; depila-
toria*.USUS *internus: Arthrodynia; blennorrhœa;
asthma pituitosum; scorbutus. Decocti turionum
vel resinæ liquidæ: Morbi cutis; herpes. Externus
resinæ liquidæ forma enematis: Obstipatio. Forma
unguenti vel emplatri: Ulcera atonica*.DOS. *Turionum: Unc. semis-j ad libras ij aquæ
vel seri lactis coct. de die sumendum. Resinæ*

liquida : Unc. semis - j vitello ovi subacta cum aqua mixta pro enemate. *Intern.* : Gran. v - x villetto ovi vel saccharo subacta.

PRÆP. Resina alba liquida calore ignis exsiccata vulgo *colophonium*. Resina nigra destillatione per descensum obtenta, fumo inquinata, liquida vulgo *pix nigra liquida*; resina solida vulgo *pix navalis*. G. Goudron; poix. GE. Theer; schiffspech. A. Tar; pitch. --- Oleum volatile terebinthinæ; aqua picea.

PIPER CUBEBA. Fructus siccatus.

CL. *Diandr. O. Trigyn.* Sarmentosa; *Ind. orient.*

OF. *Cubebæ.* G. *Cubebes.* GE. *Kubeben*; *schwindel-kærner.* A. *Cubeb.* H. *Pimienta cubeba.*

QUAL. Acris; aromatica; servida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; carminativa; siagoga.

USUS Vertigo; morosis?

PIPER LONGUM. Fructus.

CL. & O. *Præced.* Sarmentosa; *Ind. orient.*

OF. *Piper longum.* G. *Poivre long.* GE. *Langer pfeffer.* A. *Long pepper.*

QUAL. et VIRT. Sequentis.

PIPER NIGRUM. Fructus.

CL. & O. *præced.* Sarmentosa; *Ind. orient.*

N. B. Piper album est fructus maturus cortice privatus.

OF. *Piper nigrum*, *album*. G. *Poivre*. GE. *Gemeiner pfeffer*. A. *Black*, or *white common pepper*.

QUAL. In principio resinoso residens; acris; aromatica; servida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; errhina; phthyriaca.

USUS *internus* : Intermittentes; dyspepsia; singultus. *Externus* : Uvulæ relaxatio; pediculi.

PISTACIA CHIO. (TOURNEFORT). Resina liquida.

CL. *Diæc.* O. *Pentandr.* *Arborea; Ins. Chio.*

N. B. Sub hoc nomine in horto botanico Parisino existit arbor à Tournefort ex insula Chio allata, ex qua incolæ hujus insulæ terebinthinam e Chio veram depromunt. Hæc arbor longe minor est pistacia terebintho, foliola pauciora et folia undulata, glauca habet. Terebinthinam e Chio in commercio vulgo obviam ex hæc et pistacia terebintho promiscue depromi probabile est.

PISTACIA LENTISCUS. Resina alba, incisione arboris exsudans, concreta.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Mastiche; gummi mastiche*. G. *Mastic*. GE. *Mastix*. A. *Mastiche* : *common mastick-tree*. H. *Almastiga; almaciga*.

QUAL. Resinosa; aromatica.

VIRT.

USUS. Masticatorius; item suffimigia.

PISTACIA TEREBINTHUS. ~ Resina liquida.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Asiæ , Afric. & Europ. austr.*

OF. *Terebinthina de Chio seu Cyprina.* GE. *Zypri-scher terpentin.* A. *Common turpentin-tree.*

QUAL. Resinosa ; odor fragrans ; sapor gratus , amarus , subacris ; urinam violaceo odore imbuens.

VIRT. Stimulans ; diuretica ; eccoprotica ; resolvens.

USUS. Tussis ; tabes ; ulcus ; blennorrhœa.

PISTACIA VERA. Nuces.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Asiæ & Europ. austr.*

OF. *Pistaciæ.* G. *Pistaches.* G. *Pistazien.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PISUM SATIVUM. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Hortensis.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PLANTAGO MAJOR.	}	Herba ;
————— MEDIA.		radix ;
————— LANCEOLATA.		semen.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *In viis passim.*

OF. *Plantago.* G. *Plantain.* GE. *Wegwart.* A. *Great, hoary , & rib-wort plantain.*

QUAL. Insipida ; substyptica.

USUS. Tertianæ ; ulcus.

N. B. Succum plantaginis majoris efficacissimum contra morsum *Crotali horridi* antidotum esse nuper didicimus.

PLANTAGO PSYLLIUM. Semen.

CL. et O. præced. Annuæ ; Europ. austr. in Campis arenosis.

OF. Semen psyllii. G. Herbe aux puces. GE. Floh-saamen. A. Flea-wort or clammy plantain.

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT. Involvens.

USUS. Raucedo ; ophthalmia.

PLUMBAGO EUROPÆA. Radix.

CL. Pentand. O. Monog. Perennis ; Europ. austr.

OF. Dentellaria ; dentaria. GE. Zahnwurzel. A. European leadwort.

QUAL. In principio acri residens ; sapor acris, urens.

VIRT. Caustica.

USUS. Carcinoma ? odontalgia.

PLUMERIA ALBA. Radix.

CL. Pentand. O. Monog. Arborea ; Ind. occident.

A. White plumeria.

QUAL. Lactescens.

USUS decocti : Syphilis ?

POINCIANA PULCHERRIMA.

CL. Decandr. O. Monog.

VIRT. Menagoga.

POLYGALA AMARA. Radix ; folia.

CL. Diadelph. O. Octand. Subperennis ; in montibus nemorosis.

OF. *Polygala amara*. G. *Polygale amère*. GE. *Bittere kreutzblume*. A. *Bitter milkwort*.

QUAL. *Radicis* : Subdulcis, amaricans. *Foliorum* : Sapor intense amarus.

VIRT. *Foliorum et radicis* : Stomachica; expectorans.

USUS *Radicis* : Morbi pectoris atonici; pertussis; tabes pulmonalis.

DOSIS *Pulveris radicis* : Drach. semis, bis terve de die. *Decocti radic.* unc. ij ad libram ij aquæ reductæ ad libram unam de die sumend.

POLYGALA SENEGA. Radix; cortex radicis.

CL. et O. præced. Perennis; Virgin. Pensylv.

OF. *Senega*; *seneka*; *polygala Virginiana*. GE. *Senekawurzel*. A. *Rattlesnake-root* or *official milkwort*.

QUAL. Heroica : In principio resinoso residens; sapor acido-acris, subaromaticus, ad finem intense amarus, urens.

VIRT. Subemetica; cathartica; sudorifica; diuretica; expectorans; sialagoga; deobstruens.

USUS. Hydrops; arthrodynia; arthritis; morbi pulmonum atonici, pituitosi. Morsura serpentum præcipue *crotali horridi* Americæ. Tabes; pleuritis?

DOSIS *pulveris* : Gran. x—xxx. — *In decocto* : Scrup. j — drach. semis ad libram j aquæ sumend. unc. semis—j omni hora, donec alvum movere incipiat.

TRÆP. Decoctum; infusum vinosum; tinctura.

POLYGALA VULGARIS.

Radix.

CL. & O. *præced.**Subperennis.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLYGONUM AVICULARE.

Herba.

CL. & O. *præced.**Annua.*OF. *Centumnodium; sanguinaria; herba sanguinalis.*A. *Common knot-grass.*QUAL. *Substyptica.*

VIRT.

USUS.

POLYGONUM BISTORTA.

Radix.

CL. *Octand.* O. *Trigyn.* *Perennis; in pratis humidis,*OF. *Bistorta.* G. *Bistorte.* GE. *Natterwurz.* A. *Great bistort or snakeweed.*QUAL. *In copioso principio adstringente residens; sapor stypticus.*VIRT. *Roborans; adstringens.*USUS. *Cum gentiana forma pulveris, decocti, infusi: Intermittentes; profluvia; leucorrhœa.*DOS. *Drach. iij de die.*

POLYGONUM FAGOPYRUM.

Semen.

QUAL. *Farinacea.*VIRT. *Nutrients.*

USUS.

POLYGONUM HYDROPIPER.

Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; in fossis humidis.*OF. *Hydropiper; persicaria.* G. *Poirre d'eau.* GE.

Wasserpfeffer; flœhkraut; pfersichkraut. A. Water-polygonum; water-pepper or arsmart.

QUAL. Lutea; acris; urens.

VIRT. Diuretica; corrodens; rubefaciens.

USUS.

POLYGONUM PERSICARIA.

OF. *Persicaria. A. Spotted polygonum or persicaria.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLYPODIUM FILIX MAS. Radix.

CL. *Cryptog. O. bilices. In umbrosis, nemorosis.*

N. B. Planta 6 ad 7 pedum altitudinis: Frondibus bipinnatis; pinnis obtusis crenulatis; stipite paleaceo.

OF. *Filix mas. G. Fougère mâle. GE. Johanniskraut.*

A. *Male fern or male polypody. H. Polypodio he-lecho masculino.*

QUAL. Sapor ingratus, mucilaginoso-dulcis, stypticus, sub finem amaricans.

VIRT. Anthelminthica. Laetifera? Menagoga?

USUS. Tænia; lumbrici; rhachitis?

DOSIS *pulveris* . Gran. xxx-drach. j infantibus: draeh. ij-iii adultis, subjuncto cathartico.

POLYPODIUM FRAGRANS. Herba.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans.

USUS.

POLYPODIUM VULGARE. Radix mollis.CL. & O. *præced.* Perennis; in rimis petrarum.OF. *Polypodium.* G. *Polypode ordinaire; polypode de chêne des anciens.* GE. *Engelsüss.* A. *Common polypody.*

QUAL. Sapor dulcis, subnauseosus, tandem amarus.

VIRT. Expectorans; eccoprotica.

USUS.

POLYTRICHUM COMMUNE. Herba.CL. *Cryptog.* O. *Musci.*OF. *Adiantum aureum.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POPULUS BALSAMIFERA. Resina.

An balsamum?

CL. *Diæc.* O. *Octand.* Amer. *septentr.*N. B. JACQUIN *tacamahacam* ex *Fagara octandra* derivat.OF. *Gummi tacamahaca.* A. *Common tacamahac poplar tree.*

QUAL. Præstans: Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS. Copiosis; vomitus; hysteria.

POPULUS NIGRA. Gemmæ.A. *Black poplar tree.*

QUAL.

VIRT. Obtundens; emolliens; soporifera.

USUS. Diarrhœa; ambustura?

PORTULACA OLERACEA. Semen.CL. *Dodecand. O. Monog.*A. *Garden purslane.*QUAL. *Aquosa.*VIRT. *Refrigerans; lac coagulans.*USUS. *Stranguria?***POTENTILLA ANSERINA. Radix; herba.**CL. *Icosand. O. Polygyn. In fossis & pratis humidis.*OF. *Folia argentinæ s. anserinæ. A. Silver cinquefoil or wild tansy.*QUAL. *Insipida.*

VIRT. ?

USUS.

POTENTILLA REPTANS. Radix; herba.CL. & O. *præced. Perennis; in pratis humidis.*OF. *Quinquefolium; pentaphyllum. A. Common cinquefoil.*QUAL. *Styptica.*VIRT. *Adstringens.*USUS. *Diarrhœa; sub finem dysentericæ.***POTERIUM SANGUISORBA. Herba.**CL. *Monand. O. Polyand. Perennis; alpina.*OF. *Pimpinella italica rubra. A. Common burnet.*QUAL. *Odor subfragrans; sapor stypticus.*VIRT. *Adstringens.*

USUS.

PRIMULA VERIS. Radix; herba; corollæ.VARIET. A. *Officinalis.*CL. *Pentand. O. Monog. Perennis; in pratis.*

OF. *Flores paralyseos.* G. *Primevère.* GE. *Schlüsselblumen.* A. *Common cowslip.*

QUAL. *Plantæ recentis* : Odor fragrans. *Radicis* : Sapor amaricans.

VIRT. Nervina? Narcotica? *Radicis* : Errhina.
USUS.

PRUNELLA-VULGARIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Consolida minor.* A. *Common self-heal.*

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PRUNUS AVIUM. Fructus; gummi.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Cerasorum nigrorum fructus.* G. *Merisier.* A. *Small fruited cherry tree.*

QUAL. *nuclei* : Sapor et odor laurocerasum æmulans. *Fructus* : Sapor acidus.

VIRT.

USUS.

PRÆP. Aqua; alcohol, vulgo kirschwasser. (*Italorum marascino*).

PRUNUS CERASUS. Fructus; nuclei; gummi.

CL. & O. *praced.* *Arborea.*

OF. *Cerasorum rubrorum fructus.* G. *Cerisier.* GE. *Kirschen-baum.* A. *Cultivated cherry tree.*

QUAL. *fructus* : Sapor acidulo-dulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS *nucleorum* : Ad aquam stillatitiam parandam.

Gummi : Idem ac gummi *Mimosæ niloticæ*.

PRUNUS DOMESTICA. Fructus; pulpa.

CL. & O. *præced.*

Arborea.

OF. *Pruna damascena s. gallica.* G. *Prunes de damas.*

GE. *Pflaumen*; *zwetschgen.* A. *Common plum tree.*

QUAL. Sapor mucilaginoso - dulcis, acidulus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS. Febres; obstipatio.

PRUNUS LAURO-CERASUS. Folia.

CL. & O. *præced.*

Hortensis; *arbo. ea.*

OF. *Lauro-cerasus.* G. *Laurier-cerise.* GE. *Kirsch-*

lorbeerbaum. A. *Common laurel.* H. *Lauro real.*

QUAL. Venenata: In oleo volatili et principio narcotico residens; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; deobstruens.

USUS *aquæ* : Scirrhus; cancer? Obstructio hepatis? dysuria; Syphilis? Phthisis?

PRÆP. Aqua stillatitia. *Dosi* gutt. xxx - xl.

PRUNUS PADUS. Cortex.

CL. & O. *præced.*

Arborea.

A. *Common bird-cherry tree.*

QUAL. *corticis* : Sapor amarus, substypticus.

VIRT.

USUS *decocti vel extracti* : Intermittentes; syphilis?

DOS. In decoto unc. j ad libram j *aquæ*, omni mane sumend.

PRUNUS SPINOSA. Baccæ; flores; succus baccarum inspissatus.

CL. & O. præced.

Fruticosa.

OF. *Prunus sylvestris*; *acacia nostras* s. *germanica*: succus *acaciæ inspissatus*. G. *Prunellier*. GE. *Schlehendorn*. A. *Sloe tree*. H. *Endrino*.

QUAL. *Baccarum*: Sapor stypticus, acidulus. *Florum*: Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. *Baccarum*: Antiseptica; roborans; adstringens. *Florum*: Eccoprotica.

USUS *fructus*: Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa.

PRÆP. Aqua *florum*; succus *baccarum inspissatus*.

PSYCHOTRIA EMETICA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* Perennis; Mexicana.

Nota. Incertum est, an ad idem genus pertineat radix *ippecacuanhæ fuscæ* ex Brasilia allata.

OF. *Ipecacuanha vulgaris* s. *vera* s. *cinerea* s. *grisea*. GE. *Graue Brechwurzel*. A. *Ipecacuanha*.

QUAL. In principio resinoso residens: Odor nauseosus; sapor amaricans, leviter pungens.

VIRT. Emetica.

USUS Asthma spasmodicum; spasmi; ad præveniendam febrem puerperalem mox initio gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ omni quadrihorio (*Doulcet*) Menorrhagia; hæmoptysis; dysenteria; diarrhœa; pertussis.

DOS. *pulveris* granj-ij. scopo emetico; gran. xv-xx.

PRÆP. Pulvis sudorificus Doyeri; vinum *ippecacuanhæ*; trohisci.

PTERIS AQUILINA.

Radix.

CL. *Cryptog. O. Filic.**Perennis.*OF. *Filix fœmina. A. Common brake, or female fern.*

QUAL.

VIRT. Anthelminthica : Quibusdam eadem æstimatur ac Polypod. filicis maris.

DOSIS *pulveris* : Drach. semis- $\frac{1}{2}$ mane et vespere cum melle.

PTEROCARPUS DRACO.

Resina.

CL. *Diadelph. O. Decand. Arborea ; Americ. meridion. et Ind. orient.*

N. B. Resina promiscue ex hac planta et ex draconæna dracone et calamo rotang desumitur.

OF. *Sanguis draconis. G. Sang dragon.*

QUAL. Rubra ; inodora ; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia ; diarrhœa ; hæmorrhagiæ.

PTEROCARPUS SANTALINUS. Lignum.

CL. & O. *præced. Arborea ; Ind. orient.*OF. *Santalum rubrum. G. Santale rouge.*

QUAL. Saturate rubra ; tinctoria.

VIRT.

USUS.

PULMONARIA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Pentand. O. Monog. Perennis ; in sylvis.*OF. *Pulmonaria maculosa. A. Common lungwort.*

QUAL. Sapor subsalsus, mucilaginosus, amaricans.

VIRT.

USUS.

PUNICA GRANATUM. Floris petala; cortex fructus; semen.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Flores balaustiorum : Cortex Granatorum s. psydii s. malicorii.* G. *Le grenadier.* A. *Common pomme granate tree.*

QUAL. *rubra* : Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica; anthelminthica.

USUS *decocti vel infusi aquosi seu vinosi florum aut corticis externus* forma fôtus, injectionis, gargarismatis : Prolapsus; laxitas uvulæ; blennorrhœa. — *Internus* : Diarrhœa.

DOSIS *flor. vel corticis* : Unc. j ad libram j aquæ vel vini rubri.

PYROLA ROTUNDIFOLIA. *Herba.*

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Pyrola.* A. *Round leaved winter-green.*

QUAL. Sapor stypticus, amaricans.

VIRT. Adstringens.

USUS.

PYRUS COMMUNIS. *Fructus.*

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Arborea.*

OF. *Pyrus.* G. *Poire.* GE. *Birnen.* A. *Common pear tree.* H. *Peral commun.*

QUAL. Sapor dulcis, substypticus.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PYRUS CYDONIA. Fructus recens; semen; cortex.

CL. & O. *præced.*

Arborea.

OF. *Cydonia*. G. *Coins*. GE. *Quitten*. A. *Common quince tree*. H. *Peral membrillero*.

QUAL. *fructus* : Odor gratus; sapor acido-stypticus : *Seminis* : Mucilaginosus.

VIRT. Astringens; refrigerans. *Semin.* involvens. *Cort.* menagoga?

USUS.

PRÆP. Rob ex succo expresso cum saccharo inspissatum; mucilago seminum.

PYRUS MALUS.

Fructus.

CL. & O. *præced.*

Arborea.

OF. *Poma boistorfiensia*. G. *Pomme*. GE. *Apfel*. A. *Common apple tree*. H. *Peral menzana*.

QUAL. Sapor acido-dulcis.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *forma cataplasmatidis* : Ophthalmia; ulcera putrida. *Decocti* : Febres.

N. B. Succus ex pomis communibus, immaturis, (Anglis *crabs* dictis) expressus, in Anglia sub nomine *verjus* venditur.

Q.

QUASSIA AMARA. Lignum.

CL. *Decand. O. Monog. Arborea; Cayen. Surinam.*OF. *Quassia. G. Quassia. GE. Quassienholz. A. Quassy.*H. *Quasia amarga.*

QUAL. Eximia : Inodora ; sapor intense et pure amarus.

VIRT. Stomachica ; antacida ; antiseptica.

USUS decocti (melius infusi) triturando cum aqua vel vino : Dyspepsia ; intermittentes ; arthritis ; leucorrhœa.

DOS. Drach. ij - unc. semis infus. in libra j aquæ vel vini, cochleatim sumend. — Pulv. gr x.

PRÆP. Extractum.

QUASSIA SIMARUBA. Cortex.

CL. & O. *præced. Arborea ; Ind. occident.*OF. *Simaruba. G. Simarouba. GE. Ruhrrinde. A. Winged leaved quassia.*N. B. Quidam corticem simarubæ ex *Bursera gummifera* derivant.

QUAL. Inodora ; sapor pure amarus.

VIRT. Stomachica ; subadstringens ; diuretica.

USUS. Dyspepsia ; diarrhœa ; dysenteria atonica ; intermittentes.

DOSIS *pulveris* : Drach. semis. j. *Decocti* drach. ij - unc. semis ad libram j ß aquæ, ad colat. libra i. — Unc. semis-j sumenda omni bihorio vel trihorio.

QUERCUS CERRIS. Excrescentiæ a punctura insecti (*cynips quercus dicti*) ejusque nidum constituentes, *vulgo Gallæ.*

CL. *Monæc.* O. *Polyand.*

OF. *Gallæ turcicæ.* G. *Noix de Galles.* GE. *Gallaepfel.*
A. *Galls ; Turkey oak-tree.*

QUAL. Præstans : Styptica.

VIRT. Roborans ; adstringens.

USUS pulveris, decocti, unguenti : Varix ani ; prolapsus ; blennorrhœa.

QUERCUS ROBUR. Fructus seu glandes ; cortex ; folia ; cupola glandis.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Quercus.* G. *Chêne ordinaire.* GE. *Eiche.* A.
Common oak-tree.

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Roborans ; adstringens ; obstipans.

USUS decocti glandium assatarum : Tabes mesenterica infantum? Morbi cutis? -- *Externus foliorum, corticis & cupolæ glandis decoct. in vino rubro vel aqua forma fots, injectionis, gargarismatis : Prolapsus vaginæ, recti; relaxatio uvulæ; cyananche atonica; hæmorrhœæ; leucorrhœa; blennorrhœa. Internus in pulvere, infuso vinoso, vel decocto aquoso, præcipue cum amaris : intermittentes; blennorrhœa; diarrhœa.*

DOSIS : Unc. j ad libram j vini rubri vel aquæ, cochleatim sumend. — *Pulveris cupolæ glandis : Drach. semis.*

PRÆP. Unguentum ex unc. vij axungiae porcinae cum drachm j pulveris gallarum. — Tinctura et infusum aquosum præcipue pro examine aquarum mineralium; acidum gallicum.

QUERCUS SUBER.

Cortex.

CL. & O. præced.

Arborea; Europ. austr.

OF. *Cortex suberis*. G. *Liège*. A. *Cork-barked oak, or cork-tree*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *corticis* combusti mixti cum oleo fixo: Hæmorrhoids.

R.

RADIX BENGALE.

Obscura.

An eadem ac cassumuniar?

RADIX CALAGUALÆ.

———— CALAGUELLÆ.

} Obscura.

Peruvian.

QUAL.

VIRT. Diuretica; deobstruens?

USUS.

RADIX CASSUMUNIAR.

Obscura.

OF. *Radix cassumuniar* s. *Casumar* s. *Bengale* s. *Risagon*.

QUAL. Odor fragrans ; sapor aromaticus , amari-
cans , camphoratus.

VIRT. Stomachica ; nervina ; antispasmodica.

USUS.

RADIX CHYNLEN.

Obscura.

Chinens.

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia ; colica flatulenta.

RADIX COLUMBO.

Obscura.

Zeylon.

SYN. *Radix Calombæ s. Colombæ s. Calumbæ.*

QUAL. Intense amara.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia ; diarrhœa ; dysenteria. *Externus :*
Ulcers.

DOSIS. Gr. xx - xxx.

RADIX IKAN.

Obscura.

Chinens.

QUAL.

VIRT.

USUS.

RADIX LOPEZ.

Obscura.

Afric ; Ind. orient.

SYN. *Lopeziana radix.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Alvi profluvia chronica.

RADIX MATALISTA.

Obscura.

Americ.

QUAL.

VIRT. Cathartica.

USUS.

RADIX SERPENTARIÆ. *Vide Aristolochia.*

N. B. Ubi ad manus non est, eidem substitui posse radicem achilleæ millefolii nuper didicimus.

RADIX TIMAC.

Obscura.

Ind. occident.

QUAL.

VIRT. Diuretica?

USUS. Hydrops.

RANUNCULUS ABORTIVUS.

Folia.

CL. *Polyand. O. Polyg.*

QUAL. Acris; vesicans.

VIRT.

USUS. Syphilis?

RANUNCULUS ACRIS.

----- ALPINUS.

----- ARVENSIS.

----- BULBOSUS.

----- FLAMMULA.

----- ILLYRICUS.

----- LINGUA.

----- SCELERATUS.

----- THORA.

Folia,

seu

caulis

recens.

CL. & O. *praced.**In locis umbrosis.*

QUAL. Venenata : Acris ; corrodens.

VIRT.

USUS Foliorum ranunc. acris et ranunc. scelerati ,
et bulbi ranunc. bulbosi *externus* : Arthrodyn-
nia rheumatica. Carpo *adplicata* forma pulvis
quibusdam horis ante paroxysmum et ibi relicta
per 8 aut 12 horas : Intermittentes rebelles.

PRÆP. Aqua destillata ex Ranunculo flammula ,
et ran. lingua parata , emetieum præstantissi-
mum præbet.

RANUNCULUS FICARIA. Radix recens.

CL. & O. *proced.* Perennis.

OF. *Chelidonium minus.* GE. *Schollkrautwurzel.* A.

Pilewort crowfoot or lesser celadine.

QUAL. Subinsipida.

VIRT. Cosmetica ; diuretica.

USUS. ?

RAPHANUS SATIVUS. Radix recens ;

succus.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* Hortensis.

OF. *Raphanus.* G. *Radis.* GE. *Rettich.* A. *Common
garden raddish.*

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Stimulans ; diuretica ; resolvens ; rubefaciens.

USUS *succi expressi* : Scorbutus ; asthma ; raucedo ;
ischuria.

RHAMNUS CATHARTICUS. Baccæ ;

sucus inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

Arborea.

OF. *Spina cervina*. G. *Nerprun*. GE. *Kreuzbeeren*. A.
Purging buckthorn.

QUAL. Sapor nauseosus, amarus; odor ingratus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS *decocti* : Hydrops; cachexiæ; syphilis?

DOS. Drach. ij baccharum ad libram j aquæ.

PRÆP. Syrupus ex succo expresso et saccharo.

RHAMNUS FRANGULA. Cortex interior.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; in locis humidis, um-*
brosis, nemorosis.

OF. *Frangula*. G. *Aune noir; bourdaine*. GE. *Faul-*
baumrinde. A. *Black alder or berry-bearing alder*.
 H. *Artaclan*.

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; anthelmin-
 thica.

USUS. Hydrops; psora; vermès; varix ani.

DOS. Drach. semis - ij.

RHAMNUS ZIZYPHUS. Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Jujubæ*. A. *Shining-leaved rhamnus*.

QUAL. Mucilaginoso-dulcis.

VIRT. Lubricans; expectorans.

USUS. Tussis; stranguria.

PRÆP. Syrupus.

RHAMNUS JUJUBA. Baccæ.

CL. & O. *Præced.* *Ind. orient.*

A. *Blunt-leaved rhamnus*

QUAL. et VIRT. *præced.*

RHEUM PALMATUM.

Radix.

CL. *Enneand.* O. *Trigyn.* Perennis; *Asiæ septent.*; *passim hortensis.*

OF. *Rhabarbarum verum s. Sibericum s. Turcicum.*
G. *Rhubarbe.* GE. *Rhaharber.* A. *Officinal rhubarb.*
H. *Rnibarbo.*

QUAL. Lutca: In principio mucilaginoso-resinoso et salino peculiari (*oxalas calcis*) præcipue residens. Odor radiceis recentis nauseosus; sapor acris, amarus, substypticus, nauseosus.

N. B. Sal rhei, ex acido oxalico et calce constans, male pro selenite habitus fuit.

VIRT. Cathartica; roborans; antacida; stomatica; anthelminthica.

USUS. Diarrhœa; colica; dysenteria sub finem; rhachitis; obstructio viscerum abdom.

DOSIS *pulv.* Gran. x-drach. j. *Infus.* drach. j ad unc. vj-viij. aquæ.

PRÆP. Tinctura; syrupus; infusum aquosum alcalisatum *vulgo* tinctura aquosa.

RHEUM RHAPONTICUM.

Radix.

CL. & O. *præced.*

Perennis.

OF. *Rhaponticum.* G. *Rhapontic.* GE. *Rhapontik-wurzel.* A. *Rhapontic rhubarbe.*

QUAL. Odor et sapor magis stypticus, sed minus nauseosus præcedent.

VIRT. Adstringens; cathartica debilior præced.

USUS. Diarrhœa; leucorrhœa.

RHEUM UNDULATUM. (PALLAS.) Radix.

AN rhabarbarum Chinense? — In frustis longis ex India orientali allatum.

A. *Wave-leaved rhubarb.*

VIRT. Cathartica; rheo palmato fortior.

RHODIOLA ROSEA. Radix.

CL. *Diœc. O. Octand.* Perennis; alpina.

OF. *Rhodia radix.* G. *Rhodiola.* GE. *Rosenwurz.*

A. *Rose-root.*

QUAL. Fragrans odore roseo; rubicunda; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Leucorrhœa; cephalalgia.

RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

Stipites et herba.

CL. *Decand. O. Monog. Fruticosa; Asiæ septentr.; in montibus frigidis.*

OF. *Rhododendron chrysanthum.* G. *Rosage.* GE. *Sibirische schneerose.*

QUAL. In principio extractivo-amaro, adstringente et narcotico residens; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Sudorifica; adstringens: fere instar ledi.

USUS *infusi*: Arthrodynia arthritica; rigiditas articulorum post podagram; contractura; paralysis.

DOSES. Drach. ij—unc. semis ad unc. ix—xij aquæ calidæ per 24 horas digestæ. — Hujus infusi ana unc. ij sumend.

RHODODENDRON FERRUGINEUM.

VIRT. et USUS præced.

RHUS CORIARIA. Baccæ et semina.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea*; *Europ. austr.*OF. *Sumach.* A. *Elm-leaved sumach.*

QUAL. In principio acido intense adstringente residens; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; blennorrhœæ.

RHUS RADICANS. Folia.

VIRT. Acris; stimulans; diuretica.

USUS *extracti*: Phthisis pituitosa; melancholia; paralysis; herpes?

RHUS TOXICODENDRON. Folia.

USUS. Paralysis (ALDERSON); Herpes?

DOSIS *forma pulveris*: Gran. j—iv ter quaterve de die.

RIBES NIGRUM. Folia; baccæ recentes.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*OF. *Ribes nigrum.* G. *Cassis.* GE. *Schwarze Johannis beeren.* A. *Common black currant.*

QUAL. Odor teter: Sapor acidulo-stypticus.

VIRT. *foliorum*: Diuretica; sudorifica.USUS *infusi*: Rheumatismus; cynanche mucosa; dysenteria; morsura.

PRÆP. Roob fructus, et syrupus.

RIBES RUBRUM. Baccæ recentes; succus.

CL. *et O. præced.* *Fruticosa.*OF. *Ribes rubrum.* G. *Groseilles rouges.* GE. *Roth Johannis beeren.* A. *Red currant.* U. *Agracejo.*

QUAL. Sapor intense acidus.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres; scorbutus.

PRÆP. Roob; syrupus.

RICINUS COMMUNIS. Oleum ex semine
decorticato expressum.

CL. *Mouæc.* O. *Mouadelph.* Biennis; *Iudiæ utriusque.*

OF. *Cataputia major*; *ricinus major*; *Oleum ricini* s.
oleum palmæ christi s. *oleum de kerua.* G. *Huile*
de riciu. GE. *Palmoel*; *ricinusoeel.* A. *Common*
palma christi.

QUAL. *seminum*; *Oleosa.* *Corticis seminum*; *Acris*;
venenata.

VIRT. *olei fixi seminum decorticat*; *Leniter motum*
peristalticum ciens, *cathartica*; *anthelminthica.*

USUS *olei*: *Obstipatio*; *dysenteria*; *ileus*; *nephritis*;
colica plumbea; *tænia.*

DOSIS. *Unc semis-ij* in haustu *alcoholis diluti*
cum saccharo.

ROSA ALBA.

Petala.

CL. *Icosaud.* O. *Polygyn.* *Fruticosa*; *hortensis.*

QUAL. et VIRT. *Rosæ gallicæ.*

ROSA CANINA. *Fructus a semine libe-*
ratus.

CL. & O. *præced.*

Fruticosa.

OF. *Rosa sylvestris*; *Fructus cynosbati.* G. *Eglautier*
de chieu; *cynorrhodon.* GE. *Hagebutten*; *hahue-*
butten; *wilde rose.* A. *Wild briar*; *hiptree*, or
dog-rose.

QUAL. Odor fragrans; sapor dulci-stypticus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

PRÆP. Roob; conserva; decoctum.

ROSA CENTIFOLIA.

——— DAMASCENA.

} Petala.

CL. & O. præced.

Fruticosa.

A. Hundred leaved rose & damask rose.

QUAL. et VIRT. Sequentis.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

ROSA GALLICA.

Petala.

CL. & O. præced.

Fruticosa.

OF. Flores rosarum rubrarum. G. Fleurs des roses.

GE. Rothe rosen. A. Red officinal rose.

QUAL. Odor fragrans; sapor substypticus.

VIRT. Leviter adstringens.

USUS præcipue cosmeticus; Profluvia.

PRÆP. Infusum aquosum vulgo tinctura; conserva; mel; syrupus.

N. B. Fungi rosarum sunt exerescentiæ a punctura insecti, *Cyneps rosæ* dicti, ortæ.

ROSMARINUS OFFICINALIS. Folia;
summitates florentes.

CL. Diand. O. Monog. *Hortensis; fruticosa.*

OF. *Rosmarinus Hispanicus* s. *hortensis*: flores
anthos. G. *Romarin.* GE. *Rosmarin.* A. *Common*
rosemary. H. *Romero officinal.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans;
sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans ; nervina ; antispasmodica ; menagoga ; stomachica. *Externe* : Resolvens.

USUS *infusi* : Dyspepsia ; chlorosis ; hysteria ; tertiana ; asthenia nervosa.

PRÆP. Aqua ; alcohol ; oleum volatile.

RUBIA TINCTORUM.

Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.*

Perennis.

OF. *Rubia tinctorum.* G. *Garance.* GE. *Krappwurzel ; færbërroethe.* A. *Madder-root ; dyers madder.*

QUAL. Præstans : In extractivo adstringente residens ; rubra ; styptico-amara.

VIRT. Adstringens ; roborans ; diuretica ; urinam et ossa tingens.

USUS *decocti* : Pneumonitis notha ; morbi pulmonum et hepatis pituitosi ; rhachitis ; physconia abdomin. ; ieterus ; amenorrhœa.

DOS. Unc. j ad libram iij aquæ coctæ ad libram ij. Sumend. unc. iij ter quaterve de die.

RUBUS ARCTICUS. Baccæ ; seu fructus recens.

CL. *Icosand.* O. *Polygam.* *Fruticosa ; Perennis ; Norlandiæ.*

OF. *Baccæ Norlandiæ.* GE. *Norlandische Himbeeren.*

QUAL. Odor fragrans ; sapor acidulus.

USUS. Synochus ; febres biliosæ.

RUBUS CHAMÆMORUS. Fructus recens.

A. *Mountain bramble or cloud berry.*

QUAL. Inodora ; aquosa.

VIRT. Refrigerans.

USUS.

RUBUS IDÆUS.

Fructus recens.

CL. & O. præced.

Suffruticosa ; Perennis.

OF. *Fructus rubi idæi*. G. *Framboises*. GE. *Himbeeren*.

A. *Raspberry*.

QUAL. Sapor acidulo-dulcis ; odor gratus ; fragrans.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres ; scorbutus.

PRÆP. Aqua ; succus ; roob ; acetum.

RUMEX ACETOSA. Herba recens ; radix ; semen.

CL. *Hexandr*. O. *Trigyn*.

Perennis.

OF. *Acetosa vulgaris* s. *nostras*. G. *Oseille ordinaire*.

GE. *Sauerampfer*. A. *Garden sorrel*. H. *Acedera*.

QUAL. *Herbæ recentis* : Sapor acidus. *Radicis & seminum* Acido-austerus, amarus.

VIRT. Antiseptica.

USUS *herbæ recentis vel succi* : Scorbutus ; morbi cutis. *Herbæ contusæ* forma cataplasmatidis : ulcera serophulosa.

RUMEX ACUTUS. Radix ; herba ; semen.

CL. & O. præced.

Perennis ; in locis humidis.

OF. *Lapathum acutum* ; *oxylapathum*. G. *Patience*.

aiguë. GE. *Grindwurz*. A. *Sharp-pointed dock*.

QUAL. Styptica ; nauseosa ; sapor amaricans, acidulus.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti radicis* : Psora, aliique morbi cutis.
Extern. ulcera laxa.

RUMEX ALPINUS.

Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis; alpina; Europ. austr.
 OF. *Rhabarbarum monachorum.* A. *Alpine dock* or
monks rhubarb.

QUAL. Sapor amaro - austerus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Ulcera.

RUMEX CRISPUS.

Radix.

CL. & O. *præced.*

Perennis.

A. *Curid dock.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

RUMEX HYDROLAPATHUM. (*Hort. Kew.*)

Radix.

CL. & O. *præced.*

Perennis.

OF. *Lapathum aquaticum*; *hydrolapathum.* G. *Pa-*
tience aquatique. GE. *Wasser-ampfer.* A. *Water-*
dock.

QUAL. Sapor amarus, acris, stypticus.

VIRT. Adstringens; resolvens.

USUS *decocti* : Morbi cutis; stomachace? *Extern.*
forma lotionis : Ulcera.

DOSIS : Drach ij-unc. semis ad libram j aquæ.

RUMEX PATIENTIA.

A. *Patience dock* or *rhubarb.*

RUMEX SANGUINEUS.

Radix.

CL. & O. *præced.**Biennis.*OF. *Lapathum sanguineum*. A. *Bloody dock*.

QUAL. Sapor austerus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Dysenteria ; ulcera.

RUMEX SCUTATUS.

Herba.

CL. & O. *præced.**Biennis ; Europ. austr.*OF. *Acetosa rotundifolia*. A. *French - sorrel*.

QUAL. Sapor grate acidus.

VIRT. Refrigerans.

USUS.

RUSCUS ACULEATUS.

Radix.

CL. *Diæc.* O. *Syng.**Fruticosa ; alpina.*OF. *Ruscus ; bruscus*. GE. *Mausdorn - wurzel*. A.*Prickly butchers-broom.*

QUAL. Sapor subdulcis, dein amarus ; fere ut solani dulcamaræ.

VIRT. Roborans ; diuretica ; resolvens.

USUS *decocti* : Physconia abdom. ; morbi cutis ; icterus ; hydrops.

RUSCUS HYPOGLOSSUM.

Herba.

CL. & O. *præced.**Fruticosa ; Europ. austr.*OF. *Uvularia*. A. *Double leaved butchers - broom*.

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS. Laxitas uvulæ.

RUTA GRAVEOLENS. Herba; semen.

N. B. Colligerda antequam flores emittit.

CL. Decand. O. Monog. Suffruticosa, Perennis;
alpina; hortensis.

OF. *Ruta hortensis*. G. *Ruë sauvage*. GE. *Raute*;
weinraute. A. *Common rue*. H. *Ruta de olor*
pesado.

QUAL. Heroica: In oleo volatili residens; odor
teter; sapor nauscosus, acris, amaricans.

VIRT. Sudorifica; carminativa; antiseptica; anti-
spasmodica; menagoga; anthelminthica; phthi-
riaca; resolvens; rubefaciens.

USUS *internus* infusi, aut decocti aquosi vel vinosi:
Hysteria cum amenorrhœa; spasmi; cephalalgia;
singultus; epilepsia; flatulentia. *Externus* decocti
vinosi cum melle rosaceo: Ozæna et exulceratio
gingivarum putrida cum carie alveolarum den-
tium (PLENK). Forma fots aut cataplasmatiss:
Gangræna, ulcera putrida. — Halitus hominis
sani qui rutam masticavit, oculo aperto admissus
caligini seu debilitati visus e lectura assidua pro-
fuit. Eodem scopo vapor decocti per infundibu-
lum oculo admissus servire potest.

PRÆP. *ex herba*: Acetum; oleum volatile; aqua;
conserva; extractum ope alcoholis paratum.

S.

SAGUS SEU PALMA FARINARIA.
(RUMPHII). Farina medullæ.

Palma; Ind. orient.

LINNÆUS grana sagu ex Filice : *Cicas circinalis*
decto derivat.

OF. *Sagu seu sago grana.*

N. B. Grana trituratione medullæ cum aqua et ex-
siccatione parantur.

QUAL. Farinacea; mucilaginosa.

VIRT. Nutritiva.

USUS. Cum succo citri et aliquando cortice flavo
citri, cinnamomo et saccharo : Dysenteria; tabes.

SACCHARUM OFFICINARUM. Succus
plantæ expressus, inspissatus et crys-
tallisatus.

CL. *Triand. O. Digyn. Perennis; Ægypt.; Ind.*
orient. & occident.

OF. *Saccharum album; canthum. G. Sacre. GE.*
Zucker. A. Sugar : common sugar cane. H. Azucar.

QUAL. In principio acido et mucilaginoso residens :
Sapor gratus, salino - dulcis.

VIRT. Demulcens; antiseptica; nutriens.

USUS. Raucedo; tussis. *Extern.* pulvis oculo inflatus :
Macula corneæ.

PRÆP. Syrupus simplex; alcohol dilutum *Rhum*
dictum; acidum oxalicum. -- Saccharum est in-
grediens universale conservarum et syruporum.

SALIX ALBA.

——— AMYGDALINA. } Cortex ramulorum.
 ——— PENTANDRA etc. }

CL. *Diœc.* O. *Diand.**Arborea.*OF. *Salix.* G. *Saule.* GE. *Weidenbaum.* A. *Willow-tree.* H. *Sauce.*

QUAL. Sapor amaro-stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; stomachica.

USUS præcipue ut succedaneum cinchonæ: Intermit-
tentes, alique morbi in quibus cinchona officinalis
adhibetur.

N. B. Diversæ salicis species easdem fere virtutes
habent sed *Amygdalinam* cæteris efficaciorē
invenit C. KORTUM.

DOSIS *pulveris*: Gran. xx—drach. j. *Decocti*: Unc.
semis—j. in libra una semis aquæ coquendo ad libr. j.

PRÆP. Extractum.

SALVIA HORMINUM.

Semen.

CL. et O. *præc.**Perennis; hortensis.*VARIET. A. *Coma violacea.* B. *Rulra.*OF. *Semen hormini.* A. *Purple et red topped sage.*

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Ophthalmia.

SALVIA OFFICINALIS.

Folia; herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.**Perennis; hortensis.*OF. *Salvia.* G. *Sauge.* GE. *Salbey.* A. *Carden sage.*H. *Salvia.*

QUAL. In oleo volatili et extractivo adstringente residens; odor fortis, fragrans; sapor amaricans, substyptiens.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga. *Extern.*: Resolvens.

USUS *infusi vinosi*: Tumor mammarum ex lacte post ablactationem (VAN SWIETEN); leucorrhœa.

— *Infusi aquosi* forma gargarismatis: Cynanche mucosa; relaxatio gingivarum.

SALVIA SCLAREA.

Herba.

CL. et O. *præced.* Biennis; *Europ. austr.*

OF. *Sclarea*; *gallitrichum*. G. *Orrvale* ou *toute-bonne*.
A. *Common clary*.

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Fortior *præced.* nervina; errhina.

USUS. Leucorrhœa; colica; hysteria.

SALSOLA KALI aliæve species. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Europ. maritimæ austr.*

PRÆP. Soda.

SAMBUCUS EBULUS. Baccæ recentes;
cortex interior; folia; flores;
semen; radix.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Fruticosa.*

OF. *Ebulus*. G. *Hieble*; *sureau nain*. GE. *Attich*;
nieder hollunder. A. *Dwarf-clder*, or *danewort*.

QUAL. Odor teter, foetidus; sapor acris, nauseosus, amarus.

VIRT. Drastico-cathartica ; diuretica ; emetica ; narcotica.

USUS *decocti* cort. et foliorum : Hydrops ; psora ; leucorrhœa.

DOSIS foliorum vel corticis drachj-ij. *Succi baccarum* unc. semis-j.

PRÆP. Roob baccarum.

SAMBUCUS NIGRA. Cortex interior ; Turiones ; flores ; baccæ recentes.

OF. *Sambucus*. G. *Sureau ordinaire*. GE. *Hollunder* ; *flieder*. A. *Common black-berried elder*.

QUAL. et VIRT. corticis & turionum : Eadem ac prioris. *Baccarum* : Sapor grate acidulus.

VIRT. *florum* : Diaphoretica. *Extern.* resolvens.

USUS *infusi corticis vel turionum* : Hydrops ; erysipelas.

DOSIS *florum* , corticis vel turionum : Drach. ij-unc semis ad libr. j aquæ pro infuso.

PRÆP. Roob ex baccis recentibus : Febres.

SANGUISORBA OFFICINALIS. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* Perennis ; in pratis humidis.

OF. *Pimpinella Italica* ; sanguisorba. G. *Pimprénelle noire*. GE. *Schwarze bibernellwurzel*. A. *Common burnet-saxifrage*.

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens ; roborans.

USUS. Hæmorrhagiæ ; *sub finem* dysentericiæ.

SANICULA EUROPÆA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Perennis ; in pratis.

G. *Sanicle*. A. *Common sanicle*.

QUAL. Subinsipida ; inodora.

VIRT. Resolvens ?

USUS.

SANTALUM ALBUM.

Lignum.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* Arborea ; Ind. orient.

Idem ac *Sirium myrtifolium* Linn. esse videtur

(DRIANDER).

OF. *Santalum citrinum* s. *album*. G. *Santal.* GE.

Weisses, gelbes sandel-holz. A. *Yellow saunder.*

QUAL. Ligni citrini : In oleo volatili et principio resinoso residens ; odor fragrans, subambrosiacus ; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans ; sudorifica.

USUS. Rheumata.

SANTOLINA CHAMÆCYPARISSUS. Herba ; folia.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* Fruticosa ; Europ. austr.

OF. *Abrotanum montanum* ; *abrotanum femina* ; *santolina*. G. *Aurone femelle.* GE. *Zypressenkraut.* A. *Lavender-cotton.*

QUAL. Odor nidorosus ; sapor grate aromaticus, amarus.

VIRT. Roborans ; carminativa ; anthelminthica.

USUS. Leucorrhœa ; vermes.

SAPINDUS SAPONARIA.

Fructus.

CL. *Octand.* O. *Trigyn.* Arborea ; Brasil. & Jamaic.

OF. *Nuculæ saponariæ.* A. *Common soap-berry.*

QUAL. Spumescens, saponacea ; sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; deobstruens.

USUS *extracti vel tincturæ* : Chlorosis. (Lewis).

SAPONARIA OFFICINILIS. Radix; folia.

CL. *Decand.* O. *Digyn.* Perennis; hortensis; in pratis humidis, profundis.

OF. *Saponaria*. G. *Saponaire*. GE. *Seifenkraut*. A. Common soapwort. H. *Xabonera*.

QUAL. *radicis recentis* : Trita spumescens; saponacea; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Diuretica; anthelminthica.

USUS *decocti* : Morbi cutanei; blennorrhagia; icterus; syphilis? Ulcus phagedænicum? Leucorrhœa.

SATUREJA CAPITATA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Suffruticosa; Cretæ & Archipel.

OF. *Thymus Creticus*. A. *Ciliated sarory*.

QUAL. et VIRT. *Thymi* sed fortior.

USUS.

SATUREJA HORTENSIS. Herba.

CL. & O. *præced.* Annua; hortensis; Europ. austr.

OF. *Satureja*. G. *Sarricete*. GE. *Pfefferkraut*. A. Summer sarory. H. *Axearea*.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Nervina; stimulans; menagoga; stomachica; aphrodisiaca?

USUS. Anorexia; anaphrodisia.

SAXIFRAGA CRASSIFOLIA. Radix.

CL. *Decand.* O. *Digyn.* Perennis; alpina.

QUAL.

VIRT. Eximie antiseptica. (PALLAS).
USUS.

SAXIFRAGA GRANULATA. Radix; se-
men.

CL. & O. præced.

Perennis; alpina.

OF. *Saxifraga alba*. G. *Weisse steinbrechwurzel*.

A. *White saxifrage or sengreen*.

QUAL. Acris; pungens.

VIRT. Diuretica.

USUS.

SCABIOSA ARVENSIS. Herba; flores.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.*

Perennis.

OF. *Scabiosa*. G. *Scabieuse ordinaire*. GE. *Skabiose*.

A. *Field Scabious*.

QUAL. Sapor leviter amarus.

VIRT. ?

USUS. Morbi cutis; psora?

SCABIOSA SUCCISA. Radix.

CL. & O. præced. Perennis; in pratis humidis,
nemorosis.

OF. *Succisa*; *morsus diaboli*. A. *Devil's-bit scabious*.

QUAL. Sapor dulco-amaricans.

VIRT.

USUS.

SCANDIX CEREFOLIUM. Herba recens.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

Annua; hortensis.

OF. *Chærefolium*; *cerefolium*; *chærophyllosum*. G.

Cerfenil. GE. *Kærbelkraut*. A. *Garden cicely or*

chervil. H. *Perifollo*.

QUAL. Leniter odorifera ; aronatica.

VIRT. Diuretica ; deobstruens ; lactifera.

USUS. Hæmoptysis ? tabes ? hæmorrhoids ? physconia abdominalis.

SCILLA MARITIMA. Radix recens, vel
siccata.

CL. *Hexand. O. Monog.* Perennis ; *Europ. austr.*
ad littora maris arenosa.

OF. *Radix squillæ alba & rubra.* G. *Scille ; squille.*

GE. *Meerzwiebel.* A. *White and red rooted officinal squill or sea-onion.* H. *Cebolla albarruna.*

QUAL. Heroica : In principio acri volatili residens ; sapor intense amarus , nauseosus , acris.

VIRT. Diuretica ; expectorans ; emetica ; cathartica.

USUS. Hydrops ; icterus ; pneumonia notha ; asthma pituitosum (cum opio , aut aromate , aut hydragyro). *Externa.* Ventri adfric. Hydrops.

DOSIS *radicis recentis* : Gran v - xx. *Siccatae* :

Gr. ij-vj. --- In infuso drach. ij ad libr. j vini.

PRÆP. Infusum vinosum ; acetum ; oxymel scilliticum.

SCORZONERA HISPANICA. Radix.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* Biennis ; *hortensis.*

OF. *Scorzonera.* G. *Scorsonerie.* GE. *Skorzonerwurzel.*

A. *Garden-ripers grass or scorzonera.* H. *Escorzonera de España.*

QUAL. Olcracea ; mucilaginisosa.

VIRT. ?

USUS.

SCORZONERA HUMILIS.

Radix.

CL. & O. præced.

Perennis; in pratis apricis.

OF. Radix scorzonæræ. A. Dwarf vipers-grass.

N. B. Pharmacopolæ huic scorzoneram Hispanicam sæpe substituunt.

QUAL. Amaricans; lactescens.

VIRT.

USUS.

SCROPHULARIA AQUATICA. Folia.

CL. Didyn. O. Angiosp.

Perennis; in aquosis, paludosis; Europ. austr.

OF. Scrophularia aquatica. G. Grande scrofulaire.

GE. Wasserbetonie; wasserbraunwurzel. A. Water figwort.

QUAL. Odor debilis fœtidus; sapor amarus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS. Sennæ addita in infuso saporem ejus nauseosum corrigit.

SCROPHULARIA NODOSA. Radix.

CL. & O. præced.

Perennis; in fossis & humidis umbrosis.

OF. Scrophularia fœtida. GE. Kropfwurzel; braunwurzel. A. Knobby rooted figwort.

QUAL. Præstans: Odor teter, fœtidus, siccando avolans; sapor amaricans, nauseosus.

VIRT. Carminativa; anthelminthica; sudorifica.

USUS. Scrophula; varix ani; psora; cynanche.

SCUTELLARIA GALERICULATA. Herba.

CL. Didyn. O. Angiosp.

Perennis; ad stagna & fossas.

OF. *Herba tertianaria*. A. *Common skull-cap, or hooded willow-herb.*

QUAL. Odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT.

USUS.

SECALE CEREALE. *Seminis farina; fermentum panis.*

CL. *Triand. O. Digyn. Annua.*

OF. *Secale. G. Seigle. GE. Roggen. A. Rye. II. Centeno cereal, ò de pan.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens. *Fermenti* : Leniter irritans.

USUS fermenti panis pro sinapisinis.

SEDUM ACRE. *Herba recens; succus expressus.*

CL. *Decand. O. Pentag. Perennis, sempervirens.*

OF. *Sedum minus. G. Vermiculaire brûlante. GE. Hauslach, Maucrpfeffer. A. Wall stone-crop or pepper.*

QUAL. In principio acri residens; subcorrosiva.

VIRT. Diuretica; emetica.

USUS *herbæ recentis contusæ* : Cancer; ulcus phagedænicum.

SEDUM TELEPHIUM. *Radix; herba.*

CL. & O. *præced. Perennis.*

OF. *Telephium; crassula major. A. Common white orpine.*

QUAL. Sapor mucilaginosus, subacidus.

VIRT.

USUS. Varix ani; paronychia; scorbutus.

SEMECARPUS ANACARDIUM. Fructus.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Ind. orient.*OF. *Anacardium orientale* s. *anacardium verum officinarum.* G. *Noix a marquer.*QUAL. *nucis* : Oleosa. *Succi inter corticem fructus externum & internum* : acris, ad notanda lineæ characteribus nigro-fuscis utilis.VIRT. *Nuclei* : Nutriens : *Putaminis* caustica.

USUS. Succus acris cum oleo et saccharo in syphilitide adhibetur in India orientali; item in morosi et oblivione.

SEMEN ADIOWAEN. (BENGALIS). Obscura

*An Ammi Copticum?**Ind. orient.*

QUAL. Odor suaveolens; sapor gratus, aromaticus, quasi ex satureja et mentha piperita compositus.

VIRT. Excitans; stimulans; carminativa.

USUS. Asthenia nervosa; dyspepsia; flatulentia; cardialgia.

SEMEN AJAVÆ.

Obscura.

Ind. orient.

USUS. Arthritis vaga, atonica.

SEMPERVIVUM TECTORUM. Succus
herbæ recentis.CL. *Dodecand.* O. *Dodecag.**Perennis.*OF. *Sedum* s. *sempervivum majus.* GE. *Hauswurzel*; *grosser hauslauch.* A. *Common house-leek.*

QUAL. *succi* : Sapor acido-austerus ; acriusculus.

VIRT. Refrigerans ; adstringens.

USUS. Febres ; combustura ; aphtha ; clavus.

SENECIO VULGARIS. Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Herba senecionis. G. Senecion ordinaire. A. Common groundsel.*

QUAL. Sapor salsus ; oleraceus.

VIRT. Anthelminthica.

USUS forma cataplasmatidis scopo emolliendi et resolvendi. *Internus succi* : Vermes equorum (*Anglis Botts dicti*) ; lumbrici.

SERRATULA AMARA.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.*

A. *Sawwort.*

QUAL.

VIRT.

USUS *decocti* : Intermittentes ; syphilis ?

SESAMUM ORIENTALE. Oleum seminis
expressum.

CL. *Didyn. O. Angiosp. Annua ; Chinæ et Japon.*

OF. *Semen sesami. G. Grains de sesame. A. Oriental
sesamun, or oily grain.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emolliens.

USUS. Dolores ; pruritus ; marasmus ; phlegmone.

SESELI TORTUOSUM. Seimen.

CL. *Pentand. O. Digyn. Perennis ; Europ. austr.*

OF. *Seseli Massiliense. A. Hard meadow saxifrage.*

QUAL. Sapor acris ; odor aromaticus.

SIGESBECKIA ORIENTALIS. Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor amarus.

VIRT.

USUS. Stranguria; calculus? Podagra? Leucorrhœa?

SINAPIS ALBA. Semen; farina seminis.

CL. *Tetradyn. O. Siliq.* *Annua.*OF. *Semen erucæ s. sinapios albæ. G. Senevé blanc.*GE. *Weisser oder gelber senf. A. White mustard.*

QUAL. In principio acri cum oleo volatili et fixo residens.

VIRT. Rubefaciens; stimulans.

USUS *externus* in sinapismis. *Internus* idem ac sequentis.

SINAPIS NIGRA. Semen; farina seminis.

CL. *et O. præced.* *Annua; in campis sub tritico; hortensis.*OF. *Semen sinapeos nigræ. G. Senevé noir; grains de moutarde. GE. Schwarzer senf. A. Common black mustard. H. Mostaza nigra.*

QUAL. Eadem sed præstantior et acrior priori.

VIRT. Stimulans; subemetica; diuretica; cathartica.

Externe : Rubefaciens; vesicans.USUS *internus* : Dyspepsia; asthma pituitosum; obstipatio; scorbutus; hydrops; intermittentes; paralysis. *Externus* : Herpes; arthrodynia rheumatica.

DOSIS *seminum integrorum* : Drach. ij - unc. semis.

PRÆP. Serum Sinapium : Farina pro sinapismis.

SISON AMOMUM.

Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

OF. *Amomum vulgare. A. Field honeywort.*

QUAL. Sapor grate aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Flatulentia; sterilitas?

SISYMBRIUM NASTURTIIUM. Herba

recens; succus expressus.

CL. *Tetradyn. O. Siliqu. In rivis & locis humidis.*

OF. *Nasturtium aquaticum. G. Cresson de fontaine.*

GE. *Brunnen-kresse. A. common water-cresses.*

QUAL. In principio acri residens; sapor acris, amaricans; trita odorem pungentem spargens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; obstipatio.

PRÆP. Succus, dosi unc. ij; conserva.

SISYMBRIUM SOPHIA.

Semen.

CL. & O. *præced.*

Annua; in sabulosis.

OF. *Semen sophiæ. A. Flix-weed.*

QUAL. In principio acri residens; acris; fervida.

VIRT. Anthelminthica.

USUS.

SISYMBRIUM TENUIFOLIUM.

CL. & O. *præced.*

Biennis.

QUAL. et VIRT. Eadem ac Sisymb. nasturtii.

SIUM NINSI.

Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn. Perennis; Japonica.*OF. *Radix ninsi; ninzin; ninsing.*

QUAL. Sapor subdulcis, amaricans, suavis, subaromaticus.

VIRT. Cardiaca; impinguans.

USUS. Anaphrodisia? asthenia; marasmus?

SIUM NODIFLORUM.

Succus herbæ.

A. *Creeping water-parsnep.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Morbi cutis (WITHERING).

DOSIS succi : Unc. j-iv. Omni mane.

SMILAX CHINA.

Radix.

CL. *Diœc. O. Hexand. Perennis; Chinæ, Persiæ.*OF. *Radix Chinæ orientalis. G. Squine; esquine. GE.**Chinawurzel. A. Chinese smilax.*

QUAL. Inodora; sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Syphilis; podagra?

DOSIS. Unc. j ad libram j aquæ.

SMILAX SASSAPARILLA.

Radix.

CL. & O. *præced. Sarmentosa; Perennis; Peruv.**Mexic. Brasil.*OF. *Radix sassaparillæ. G. Salsepareille. GE. Sassa-**parilla. A. Sarsaparilla, or medicinal smilax. H.**Zarzaparilla.*

QUAL. Præstans : Sapor mucilaginosus, amaricans.

VIRT. Diuretica; diaphoretica; alterans.

USUS. Syphilis; cachexiæ; arthritis.

DOS. *pulveris* : Drach. j-ij. — In decocto unc. j
ad libr. ij aquæ coctæ ad libr. j.

SOLANUM DULCAMARA. Stipites re-
pentes.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* Sarmentosa; in locis hu-
midis, umbrosis.

OF. *Dulcamara.* G. *Douce - amère*; morelle grimpante.

GE. *Alpranken*; *bittersüss.* A. *Bitter-sweet*, or
common woody night-shade. H. *Solano dulce-*
amargo.

QUAL. *recentis* : Heroica : Odor teter, virosus;
sapor amaro-dulcis, nauseosus.

VIRT. Diuretica; alterans; resolvens.

USUS *decocti* : Anthrodýnia; morbi cutis; amenor-
rhœa; icterus; syphilis; dislochia; contusura.

DOSIS *stipitum recent. contusorum* : Unc. semis-ij
ad libram iij aquæ coctæ ad libras ij. Quotidie
sumatur libr. j-ij cum vel sine lacte.

SOLANUM NIGRUM. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua.*

OF. *Solanum vulgare.* G. *Morelle à fruit noir.* GE.
Nachtschatten. A. *Common nightshade.* H. *Solano*
nigro; *yerba mora.*

QUAL. Venenata : in principio narcotico residens;
Odor teter, virosus.

VIRT. Narcotica; diuretica; resolvens.

USUS. Idem ac papaveris somniferi. *Extern.* Proctalgia; phlegmone; paronychia; scirrhus; ulcus.
DOS. *pulveris* : Granj -vj.

SOLDANELLA ALPINA.

Folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.**Perennis.*A. *Alpine soldanelle.*

SOLIDAGO VIRGA AUREA.

Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis*; *alpina in montibus nemorosis.*OF. *Virga aurea*; *consolidu Saracenica.* G. *Verge d'or.* GE. *Heidnisch wund-kraut.* A. *Common golden rod.*

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Diuretica.

USUS. Ulcus; calculus.

SONCHUS OLERACEUS.

Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua*; *hortensis.*OF. *Sonchus.* G. *Laitron doux.* A. *Common sow-thistle.*

SOPHORA HEPTAPHYLLA. Radix; semen.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa*; *Ind. orient.*OF. *Anticholerica.*QUAL. *utriusque* : Sapor intense amarus.

VIRT.

USUS. Cholera; colica; dysuria.

SORBUS AUCUPARIA.

Baccæ.

CL. *Icosand.* O. *Trigyn.**Arborea.*A. *Mountain ash, or service tree.*

QUAL. *succi* : Sapor acido-amarus.

VIRT.

USUS *forma Roob* : Hydrops; calculus renalis; stranguria rebellis?

SORBUS DOMESTICA. Fructus seu baccæ.

CL. & O. *præced.*

Arborea.

OF. *Sorbus*. G. *Sorbier*.

QUAL. Sapor acido-acerbus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

SPARTIUM SCOPARIUM. Herba; summitates; semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Fruticosa; in arenosis, umbrosis.*

N. B. A quibusdam *Genista tinctoria* huic plantæ substituitur.

OF. *Genista*. G. *Génêt à palais*. GE. *Gins; psriemkraut*. A. *Common broom*. H. *Esparto*.

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Diuretica; cathartica.

USUS. Hydrops.

DOSIS *summitatum recentium* : Unc. semis ad unc. xvj aquæ coctæ ad unc. viij. Sumatur unc. semis omni bilorio, donec alvum et urinam moveat, et repetatur quotidie seu alternis diebus. (CULLEN).

PRÆP. Extractum; infusum, et decoctum.

SPIGELIA ANTHELMIA. Herba et radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; Ind. occident.*

A. *Annual worm-grass.*

QUAL. Tetra; fœtida.

VIRT. Narcotica; anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

SPIGELIA MARILANDICA. Herba.

CL. & O. præced. Perennis; Amer. septentr.

OF. *Spigelia* A. *Indian pink*; pinkroot or perennial worm-grass.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

USUS *pulveris, vel infusi aut decocti*: Lumbrici.

DOS. *pulveris*: Gran x. -- *In infuso*: Drach. ij ad libram j aquæ. -- *In decocto*: Unc. semis ad libram j aquæ.

SPILANHUS ACMELLA. Herba; semen.

CL. Syng. O. Polyg. æqual.

OF. *Acnella*. A. *Balm-leaved spilanthus*.

QUAL. Amara; sapore odoreque *Sigesbeckiæ*.

VIRT. Diuretica; menagoga.

USUS. Hydrops; ischuria; calculus; leucorrhœa.

SPINACIA OLERACEA. Folia.

CL. Diœc. O. Pentand.

Annua.

G. *Epinaid*. GE. *Spinat*. A. *Spinage*.

QUAL. Aquosa; oleracea.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

SPIRÆA FILIPENDULA. Radix, herba.

CL. Icosand O. Pentag. Perennis; in locis humidis, paludosis.

OF. *Filipendula*; *saxifraga rubra*. A. *Single flowered dropwort*, or *filipendula*.

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS. Leucorrhœa; hernia.

SPIRÆA ULMARIA. Radix; folia.

CL. & O. *præced.* Perennis; in pratis.

OF. *Ulmaria*; *barba caprina*. G. *Reine des prés*. GE. *Bocksbart*. A. *Meadow-sweet*.

QUAL. Odor fragrans; sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; sudorifica.

USUS Dysenteria; hernia?

STACHIS ANNUA.

———— RECTA.

} Herba.

CL. *Didyn*. O. *Gymnops*. In collibus petrosis, siccis.

OF. *Herba sideritidis*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

STACHIS SYLVATICA.

Herba.

OF. *Galiopsis*.

QUAL. Tetra; fœtida.

VIRT. Narcotica.

USUS.

STATICE LIMONIUM.

Radix.

CL. *Pentand*. O. *Pentag*. Ad littora maris.

OF. *Behen rubrum*. A. *Common sea thrift*, or *lander*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Asthenia; hæmorrhagiæ.

STILLINGIA SYLVATICA.

CL. *Monæc.* O. *Monadelp.*

VIRT.

USUS. Syphilis?

STRYCHNOS COLUBRINA. Radix; lignum radicis.

N. B. An eadem arbor ac strychnos nux vomica?

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Lignum colubrini vulgaris.*

QUAL. Suspecta: Sapor intense amarus, aeris.

VIRT. Emetica; sudorifica; anthelminthica; fatigans.

USUS. Intermittentes; vermes. — Morsura serpentum?

STRYCHNOS NUX VOMICA. Fructus seu nuces; lignum.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Nux vomica.* G. *Noix vomique.* GE. *Kræhenaugen.* A. *Poison-nut.* H. *Matta perros.*

QUAL. Venenata: Sapor intense amarus; odor virosus.

VIRT. Emetica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Intermittentes; dysenteria; cardialgia; amenorrhœa; tænia.

DOSIS *pulveris*: Gran v - xv. In tænia scrup. j.

STRYCHNOS VOLUBILIS. (PALLAS). Semen.

CL. *et O. præced.* *Arborea; Ind. orient.*

Ignatia amara (LINN. JUN.)

OF. *Faba Ignatii.* G. *Vomiquier; fève S. Ignace.*

GE. *Ignatius-bohne.* A. *Jesuits-bean.*

QUAL. Venenata : Sapor intense amarus.

VIRT. Narcotica; diuretica; sudorifica; anthelmintica.

USUS *pulveris, vel infusi* : Intermittentes rebelles; amenorrhœa; vermes; asthma; eclampsia.

DOSIS : Gran. v—xx.

N. B. Ejus antidotum est acetum.

STYRAX BENZOIN. (DRIANDER.) Balsamum concretum.

CL. *Decand. O. Monog. Arborea; Javæ, Sumatræ.*

OF. *Gummi benzoës; assa dulcis.* G. *Benjoin.* GE. *Benzoe.* A. *Benjamin; benzoïne.*

N. B. Purior albicans incisione exsudans mollis; vilior colorata durior est.

QUAL. In acido peculiari et principio resinoso residens : Sapor acris, pungens; odor fragrans, ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina; expectorans.

USUS *acidi* : Morbi pectoris pituitosi. *Externus* : Rubedo faciei. Item ad suffumigia et ad parandum acidum Benzoicum.

DOSIS *salis acidi* : Gran. xv ad drach. semis.

PRÆP. Acidum Benzoicum vulgo *flores Benzoës*; tinctura.

STYRAX OFFICINALIS. Balsamum con-
cretum.

CL. et O. præced. Arborea; Syriæ.

OF. Storax; gummi storacis; styrax calamita.

G. Storax. GE. Storax. A. Officinal storax.

QUAL. Sapor acris; odor fragrans, ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina.

USUS Idem ac præced. Externus: Ad suffimigia;
et emplastra.

SWIETENIA FEBRIFUGA (ROXBURGH).
Cortex ligni.

CL. Decand. O. Monog. Arborca; Ind. orient.

QUAL. Sapor amaro-adstringens.

VIRT. Roborans, cinchonæ æmula.

USUS. Febres intermittentes, atonicæ; ulcera.

SWIETENIA MAHOGANI. Cortex ligni.
Arbor. Ind. occident.

VIRT. et USUS præcedent.

SYMPHYTUM OFFICINALE. Radix.

CL. Pentand. O. Monog. Perennis; in pratis hu-
midis et cimiteriis.

OF. Symphytum; consolida major. G. Grande con-
soude. GE. Schwalbenwurz; schwarzwurzel.

A. Common comfrey. H. Symphyto officinal.

QUAL. Principio mucilaginoso scatens.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS decocti: Stranguria; dysenteria; nephritis;
hæmoptysis; hæmaturia.

T.

TAMARINDUS INDICA. Fructus; pulpa
fructus.

CL. Triand. O. Monog.

Arborea.

OF. *Fructus tamarindi*. G. *Tamarins*. GE. *Tamarinden*.

A. *Tamarind tree*.

QUAL. In acido et extractivo saccharino-mucilaginoso residens; sapor acidus.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *decocti vel seri lactis* : Febres inflammatoriæ et biliosæ; icterus; dysenteria.

DOSIS *in decocto* : Unc. ij ad libram j aquæ vel seri lactis.

PRÆP. Pulpa unc. j ij pro dosi. Serum lactis tamarindinum.

TAMARIX GALLICA. Cortex radicis;
folia.

CL. Pentand. O. Trigyn. Arborea; Europ. austr.

A. *French tamarisk*.

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

TANACETUM BALSAMITA. Herba.

CL. Syng. O. Polyg. superfl.

Europ. austr.

OF. *Balsamita*; *costus hortorum*; *mentha Romana*

seu *Saracenica*; *tanacetum hortense*. A. *Frauen-*

münze; *Römische münze*. A. *Cost-mary*.

QUAL. Præstans : Odor nidorosus , halituosus ;
sapor amarus , aromaticus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga.

USUS.

TANACETUM VULGARE. Herba ; flores ;
semen.

CL. & O. præced.

Perennis.

OF. *Tanacetum*. G. *Tanaisie*. GE. *Reinfahrenkraut* ;
wurmkraut. A. *Common tansey*.

QUAL. Præstans : In oleo volatili cum principio
amaro juncto residens : Odor nidorosus , hali-
tuosus ; sapor amarus , aromaticus. Luteo-
tinctoria.

VIRT. Stimulans ; carminativa. *Extracti* : Pure
amara , stomachica. --- *Seminum* : Anthelmin-
thica ? sudorifica.

USUS *infusi vinosi vel aquosi*, aut *extracti* : Dys-
pepsia ; intermittentes ; chlorosis ; leucophleg-
matia ; hydrops ; hysteria. --- *Infusi florum vel*
seminum forma enematis : Lumbrici.

DOSIS *herbæ* : Unc. j ad libram aquæ vel vini. ---
Seminum pulv. Gran. xx. Pro infuso drach. ij . iij
ad libram semis aquæ vel lactis.

PRÆP. Extractum.

TEUCRIUM CHAMÆDRYS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Perennis ; in montanis
siccis.

OF. *Chamædrys*. G. *Germandrée officinale*, petit chênz.

GE. *Aechter gamander* ; *germanderlein*. A. *Creeping*
or *Common germander*.

QUAL. Præstans : Odor aromaticus, fragrans ; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; sudorifica ; menagoga.

USUS *infusi* : Intermittentes ; arthritis ; chlorosis.

TEUCRIUM CHAMÆPITYS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua ; hortensis.*

OF. *Chamæpitys ; Jua orthritica.* G. *Petite ivette.*

GE. *Feldzypresse.* A. *Ground-pine germander.* H. *Pinillo.*

QUAL. Præstans : Odor resinosus ; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga ; discutiens.

USUS *infusi* : Arthrodynia ; arthritis.

DOS. Drach. ij-ijj ad libram j aquæ.

TEUCRIUM CRETICUM. Herba ; summitates.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Polium creticum.*

QUAL. Sapor amaricans, aromaticus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Icterus.

TEUCRIUM MARUM. Herba ; summitates.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa ; hortensis.*

OF. *Marum verum seu Syriacum.* G. *Marou.* GE.

Katzenkraut ; ambeikraut. A. *Marum germander ; syrian herb-masthiche or cat-thyme.*

QUAL. Heroica : In oleo volatili camphorino residens ; odor fragrans , camphoratus ; sapor acris , amarus.

VIRT. Nervina ; antispasmodica ; cardiaca ; errhina ; discutiens.

USUS *pulv. vel infusi* : Spasmi ; hysteria ; cachexiæ ; oblivio ; morbi soporosi ; anosmia ; asthma.

DOSIS *pulveris* : Gran. xx - xxx. In infuso aquoso vel vinoso drach. ij - iij ad libram j.

TEUCRIUM POLIUM. Herba ; summitates.

CL. & O. *præced.* Suffruticosa ; Europ. austr.

OF. *Polium montanum.* G. *Thim blanc des montagnes.*

A. *Poley* or white mountain germander.

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

TEUCRIUM SCORDIUM. Herba.

CL. & O. *præced.* Perennis ; in pratis humidis ; hortensis.

OF. *Scordium.* G. *Germandrée aquatique.* GE. *Lachenknoblauch.* A. *Water-germander.*

QUAL. Præstans : Odor alliaceus ; sapor aromatico-amarus , acris.

VIRT. Antiseptica ; stomachica ; sudorifica ; anthelmintica ; discutiens.

USUS *externus infusi vinosi vel acëtosì* : Ecchymoma ; gangræna ; ulcus.

THALICTRUM FLAVUM. Radix.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis; in pratis humidis.*
 OF. *Thalictrum.* G. *Rue des prés.* A. *Common meadow rue.*

QUAL. Sapor dulco-amarus.

VIRT. Eccoprotica.

THAPSIA ASCLEPIUM. Radix.

G. *Thapsie ou turbith bâtard.* A. *Deadly carrots.*

QUAL. Acris.

VIRT. Cathartica. N. B. Veteribus in usu.

THEA BOHEA. Folia.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Chinensis.*

OF. *Thea.* G. *Thé.* GE. *Thee.* A. *Broad et narrow leaved bohea-tea.* H. *The boheu.*

QUAL. Odor gratus; sapor substypticus.

VIRT. Adstringens. *Foliorum recent.* : Narcotica.

USUS. Physconia abdom.; uriasis *Japonensibus.*

N. B. Plures usum infusi hujus speciei quotidianum ferunt, dum sequentem ferre nequeunt.

THEA VIRIDIS. Folia.

G. *Thé vert.* GE. *Grüner thee.* A. *Green tea.*

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor substypticus.

VIRT. Excitans; adstringens.

USUS.

THEOBROMA CACAO. Nucleus seu fructus, et oleum concretum vulgo Butyrum dictum.

CL. *Polyadelph.* O. *Pentand.* *Arbor. Amer. merid.*

OF. *Fructus cacao: butyrum cacao.* G. *Cacao.* GE. *Kakaobohnen.* A. *Chocolate nut-tree.*

QUAL. Oleosa ; ægre rancescens.

VIRT. Demulcens ; involvens ; nutriens.

USUS. Tabes ; asthenia ; varix ani.

PRÆP. Oleum fixum concretum butyraceum. F_x
fructu tosto Choccolada.

THLASPI ARVENSE. Semen.

CL. *Tetradyn. O. Silicul. Annua ; in campis sub
tritico æstivo.*

OF. *Thlaspi. G. Monnoyère. GE. Bauren-senf.*

QUAL. In principio acri residueus ; odor alliaceus ;
sapor dulco-subacris.

USUS. Arthrodynia rheumatica.

THUYA ARTICULATA. Succus resinosus ex
trunco et ramis arboris exsudans, *Sanda-
raca* dictus (WAHL).

NATIVIS. *Elgrassa. Arbor. ; Afric. merid.*

OF. *Gummi s. resina sandaraca. N. B. False ut
videtur, hactenus ex juniperi specie derivata.*

THUYA OCCIDENTALIS. Folia ; lignum.

CL. *Monæc. O. Monadelph. Arborea ; Europ. et
Asiæ septentr.*

OF. *Arbor vitæ. A. American arbor vitæ tree.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Expectorans ; sudorifica.

USUS *decocti* : Hydrops ; rheumatismus ; tussis ;
intermittentes.

THYMUS SERPYLLUM. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp. Perennis ; in collibus siccis.*

OF. *Serpyllum* G. *Serpolet*. GE. *Quendel*; *feldkümmel*; *wilder poley*. A. *Common mother of thyme*, or *wild thyme*. H. *Tomillo serpol*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor substypticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; resolvens.

USUS. Cephalalgia crapulæ. Præcipuus ad balnea uterina.

PRÆP. Oleum volatile.

THYMUS VULGARIS. Herba.

CL. & O. præced. *Saffiuticosa*; *annua*; *hortensis*,
Europ. austr.

OF. *Thymus vulgaris*. G. *Thym*. GE. *Thymian*. A. *Garden-thyme*. H. *Tomillo vulgar*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga; carminativa; resolvens.

USUS. Leucoplegmata; coryza; epiphora.

TILIA EUROPÆA. Flores.

CL. *Polyand*. O. *Monog*. *Arborea*.

OF. *Tilia*. G. *Tillend*. GE. *Lindenbaum*. A. *Common lime-tree*. H. *Tilo*.

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Antispasmodica.

USUS *infusi*, *aquæ*; Spasmi.

PRÆP. Aqua.

TOLUIFERA BALSAMUM. Balsamum
incisione arboris obtentum.

CL. *Decand. O. Monog.* Amer. merid.

OF. *Balsamum tolutanum s. de tolu s. de carthagena.*

G. *Baume de tolu.* GE. *Tolutanischer balsam.* A. *Balsam of tolu.*

QUAL. In principio resinoso, acido benzoico juncto, residens; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. Blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; tabes pituitosa; ulcera; vulnera.

PRÆP. Tinctura; syrupus balsamicus.

TORDYLIUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* Annua; Europ. austr.

OF. *Seseli creticum.* G. *Bergkümmel.* A. *Officinal hartwort.*

QUAL. Subaromatica.

VIRT. Carminativa; diuretica.

USUS.

TORMENTILLA ERECTA. Radix.

CL. *Icosand. O. Pentag.* Perennis; in nemorosis.

OF. *Tormentilla.* G. *Tormentille.* GE. *Tormentilwurzel; birkwurzel; Ruhrwurzel; Blutwurzel.* A. *Common tormentil; or upright septfoil.*

QUAL. Præstans: Styptica; rubra.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS. Menorrhœa; diarrhœa. Cum gentiana; Intermitteutes.

TRAGOPOGON PRATENSE. Radix.

CL. Syngen. O. Polyg. *æqual*.OF. *Tragopogon*; *barba hirci*. GE. *Bocksbart-wurzel*.A. *Yellow goat's beard*.QUAL. *Lactescens*; *amaricans*.

VIRT. ?

USUS. *Tussis*; *stranguria*.

TRAPA NATANS. Fructus.

CL. *Tetrand*. O. *Monog*. In aquis stagnantibus.OF. *Nuces aquaticæ*; *tribuli aquatici*. GE. *Wasser-nüsse*; *stachelnüsse*. A. *Floating water cultrops*.QUAL. *Farinosa*; *dulcis*.VIRT. *Nutrients*; *obstipans*.

USUS.

TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS.

Flores; herba.

CL. *Diadelph*. O. *Decand*. *Biennis*; *hortensis*, in Campis.OF. *Melilotus albus* & *citrinus*. G. *Melilot*. GE. *Steinklee*. A. *Common melilot-trefoil*.QUAL. In oleo volatili residens; odor gravis, fragrans; sapor *âcris*, *amaricans*, *mucilaginosus*.VIRT. *Emolliens*; *resolvens*.USUS *forma cataplasmati*; *Tumores*.PRÆP. *Emplastrum*.

TRIFOLIUM REPENS.

Flores.

CL. & O. *præced*.*Perennis*.OF. *Trifolium album*.

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT. ?

USUS. Arthritis?

TRIGONELLA FÆNUM GRÆCUM.

----- MONSPELLIENSIS. Semen, ejusque farina.

CL. *Diadelph. O. Decand.*

Annua; hortensis.

OF. *Fænum græcum. G. Fénugrec. GE. Bockshornsaamen. A. Common & Monspellian fenu greek.*

QUAL. Farinacea; mucilaginosæ; odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Emolliens; lubricans.

USUS. Dysenteria; diarrhœa; ophthalmia. *Externus* farinæ: ad cataplasmata.

TRITICUM ÆSTIVUM.

} Semen; farina;
amylum; fures.

----- HYBERNUM.

CL. *Triand. O. Trigyn.*

Annua.

OF. *Triticum. G. Farine du froment: amidon: son. GE.*

Weizenmehl: krasmehl, staerke: Kleyen. A.

Winterwheat: Wheat flour: Startch: Bran.

QUAL. Farinacea; mucilaginosæ; insipida.

VIRT. Emolliens; nutriens; acescens.

USUS *farinæ*. Ad cataplasmata. *Amyli* in eneniate:

Dysenteria; tenesmus; stranguria. *Decocti fursum*: Tussis ab acris; *externus* in balneis.

DOSIS *Amyli*: Drach. jss ad unc xij aquæ coctæ ad unc. vj pro eneniate.

PRÆP. Amylum; farina; fures.

TRITICUM REPENS.

Radix.

CL. & O. præcd.

Perennis.

OF. *Radix graminis*. G. *Chiendent des boutiques*. GE. *Quecken*; *grasswurzel*. A. *Quickgrass*; *dogsgrass*; *couchgrass*. H. *Trigo rastrero*.

QUAL. Dulcescens; inodora.

VIRT. Diuretica; desobstruens.

USUS *Decocti vel extracti* : *Physconia* abdomin.;
intermittentes; icterus.

DOSIS : Unc. ij- iij ad libram ij aquæ coctæ ad
libram j.

PRÆP. Extractum.

TROPÆOLUM MAJUS.

Herba.

CL. Octand. O. Monog.

Annua; *hortensis*.

OF. *Herba nasturtii Indici*. A. *Indian cress* or *tropæolum*.

QUAL. Acris.

VIRT. Diuretica.

USUS. Scorbutus.

TUSSILAGO FARFARÀ. Radix; herba;
flores; folia; succus foliorum.

CL. Syng. O. Polyg. superfl. *Perennis*; in *argillosis*
& *Campis humidis*.

OF. *Tussilago*. G. *Tussilage*; *pas d'âne*. GE. *Huflat-
rich*. A. *Common coltsfoot*. H. *Tussilago*.

QUAL. *totius plantæ* : Sapor amaricans, mucilagi-
nosus.

VIRT. Expectorans.

USUS *succi foliorum tempore veris expressi* : Scrophula. (CULLEN). *Decocti vel succi* : Morbi pectoris ; tussis catarrhalis ; tabes.

DOSIS : Unc. j ad libram j aquæ. --- *Succi* unc. ij-
iij de die.

TUSSILAGO PETASITES. Radix.

CL. & O. *præced.* Perennis ; in pratis humidis.

OF. *Radix petasitidis.* G. *Pétasite.* GE. *Schweiss-
wurzel ; pestilenzwurzel.* A. *Great coltsfoot or
butter-bur.* H. *Sombrera.*

QUAL. Sapor amarus, subacris.

VIRT. Expectorans ; diaphoretica.

USUS *decocti* : Morbi pectoris.

U.

ULMUS CAMPESTRIS. Cortex interior ramulorum et arboris junioris.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Arborea.

OF. *Ulmus.* G. *Orme.* GE. *Ulmenbaum ; küstenrinde.*

A. *Elm-tree bark.* H. *Alamo.*

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans ; adstringens ; diuretica ; alterans.

USUS *decocti* : Lepra aliique cutis morbi ; ulcera
phagedænica ; arthritis ; hydrops.

DOSIS. Unc. j-ij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

URTICA DIOICA. Radix ; herba ; suc- cus expressus.

CL. *Monœc.* O. *Tetrand.* Perennis.

OF. *Urtica major*. G. *Grande ortie*. GE. *Brenn-nessel*. A. *Common nettle*. H. *Ortiga mayor*.

QUAL. *Urens tactu* ; insipida.

VIRT. *Succi* : Alterans ?

USUS *urticationis externus* : Paralysis ; asthenia.

Internus succi : Hæmoptysis ; hæmorrhoids ; phthisis ? Icterus.

DOSIS *succi* : Unc. j - ij.

URTICA PILULIFERA.

Semen.

CL. & O. *præced.*

Annua ; *Europ. austr.*

OF. *Urtica Romana*. A. *Roman nettle*.

QUAL. *herbæ* : *Urens tactu* ; insipida. — *Seminum* : Oleosa.

VIRT. Diuretica.

USUS. Rubeola ? nephritis ? hæmorrhagia ?

URTICA URENS.

Semen.

CL. & O. *præced.*

Annua.

G. *Ortie grièche*. A. *Lesser, or stinging nettle*.

VIRT. *Decocti* : Anthelminthica ?

UVARIA ZEYLANICA.

Lignum.

CL. *Polyand.* O. *Polygyn.*

G. *Bois d'ébène*. GE. *Ebenholz*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

V.

VACCINIUM MYRTILLUS. Baccæ re-
centes.

CL. *Octand. O. Monog.* Suffruticosa.

OF. *Baccæ myrtillorum. G. Airelle anguleuse; myrtilles. GE. Heidelbeeren. A. Common bill-berries, or whorthle-berries. H. Arandano.*

QUAL. Sapor acido-stypticus.

VIRT. Subadstringens; antiseptica.

USUS. Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa; scorbutus.

PRÆP. Syrupus; Roob.

VACCINIUM OXYCOCCOS. Baccæ re-
centes; succus expressus.

CL. & O. præced. Fruticosa; Perennis.

OF. *Baccæ oxycoccos. G. Airelle canneberge. GE. Moosbeeren. A. Common cranberry, or moorberry.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

PRÆP. Syrupus.

VACCINIUM VITIS IDÆA. Baccæ re-
centes.

CL. & O. præced. Suffruticosa.

OF. *Baccæ vitis idææ. G. Airelle ponctuée. GE. Preusselbeeren; kronsbeeren. A. Red billberry or whortleberry.*

QUAL. Acida.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres acutæ.

PRÆP. Roob.

VALERIANA CELTICA.

Radix.

CL. Triand. O. Monog. *Perennis; alpina, in montibus altioribus Europ. austr.*

OF. *Nardus celtica : spica celtica; spica Indica.* GE. *Speikwurzel.*

QUAL. Oder fragrans, aromaticus; sapor acris, salino-amaricans, aromaticus.

VIRT. Antispasmodica; diuretica; anthelminthica.

USUS præcipuus in Turcia ad Balnea.

VALERIANA OFFICINALIS.

Radix.

CL. & O. præced. *Perennis; in pratis humidis & Sylvis.*

OF. *Valeriana sylvestris seu minor.* G. *Valeriane.*

GE. *Wilde Baldrianwurzel; katzenwurzel.* A. *Wild or officinal valerian.* H. *Valerian officinal.*

QUAL. Præstans : In olco volatili residens; odor hircinus; sapor amaricans, aromaticus : Felibus grata.

VIRT. Eximie antispasmodica; narcotica; anthelminthica; menagoga; diuretica.

USUS *pulv. vel infusi* : Epilepsia; hysteria; convulsio; hypochondriasis; hemicrania; amaurosis incipiens; amenorrhœa; vermes; hæmoptysis; ulcus.

DOSIS *pulveris cum pauxillo macis* : Gran xx-xxx ter quaterve de die. In infuso aquoso unc. semiis-ij ad libram j aquæ.

PRÆP. Tinctura; dosi unc. semis-j.

N. B. Primo vere antequam folia explicata sunt colligenda, cavendum ne ex locis nimis humidis aut tempore anni improprio colligatur et ne cum radice valerianæ dioicæ inertī confundatur.

VALERIANA PHU.

Radix.

CL. & O. præced.

Perennis; Europ. austr.

C F. *Phu; valeriana major seu hortensis.* GE. *Grosse baldrianwurzel.* A. *Garden valerian.*

QUAL. et VIRT. præcedent. sed debilior.

VERATRUM ALBUM.

Radix.

CL. *Polyg. O. Monæc.*

Perennis; alpina.

N. B. Tempore verno colligenda.

OF. *Helleborus albus.* G. *Hellébore blanc; veratre.*

GE. *Weisse niesswurzel.* A. *White veratrum or hellebore.* H. *Veratro blanco; vede gambre blanco.*

QUAL. Venenata: Odor nauseosus, ingratus; sapor salino-acris, amaricans.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; menagoga; errhina; phthiriaca.

USUS *internus pulveris ablato cortice externo*: Hydrops; epilepsia; morbi cutis rebelles; mania; melancholia; dyspepsia; quartana. *Externus forma pulveris, decocti vel unguenti*: Psora; tinea. Scopo errhino: Apoplexia; copiosis.

DOSIS *pulveris*: Gran iij-xx. In infuso aquoso vel vinoso, aut alcohole diluto Gr. xx-drach. iij ad libram j. -- *Extracti*: Gr. ij. -- *Radicis* drach. j in unc. xx aceti infusa, initio dosi cochlearis unius

omni secunda aut tertia hora; dein bis, tandem semel de die, maniam violentam sustulit intra tres septimanas.

N. B. Antidotum veratri est infusum coffeæ.

VERATRUM NIGRUM. Radix.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedent.

VERATRUM SABADILLA? (RETZIUS).

Semen cum capsulis.

CL. & O. præced.

Mexicana.

OF. Semen sabadillæ; Cevadilla G. Cévadille.

QUAL. Venenata: sapor amarus, acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; emetica; anthelminthica; phthiriaca.

USUS. Vermes.

DOSIS Infanti duorum ad quatuor annos gr. ij.---

A quatuor ad octo annos gr. v. Ab octo ad duodecim annos gr. x.—Et ultra pro constitutione et ætate gr. xij - xv cum melle, subjungendo catharticum omni quinto die (SCHMUCKER).

VERBASCUM NIGRUM. Radix.

CL. Pentand. O. Monog.

Perennis.

OF. Verbascum. GE. Schwarze wollkrautwurzel. A. Black mullein.

QUAL. Mucilaginoso; insipida.

VIRT. Emolliens.

USUS. Paronychia.

VERBASCUM THAPSUS. Folia; flores.

CL. & O. præced. Biennis; in locis desertis, petrosis.

OF. *Verbascum*. G. *Niolen*; *bouillon blanc*. GE.

Weisses wollkraut; *himmelbrand*; *königskerze*.

A. *Great broad leaved mullein*. H. *Gordolobo*.

QUAL. *Mucilaginosa*; *satuo-amaricans*.

VIRT. *Emolliens*; *involvens*.

USUS. *Tussis*; *proctalgia*; *varix ani*.

DOSIS *infusi* : *Unc. j ad libram j aquæ*.

VERBENA OFFICINALIS.

Herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

Annua.

OF. *Verbena*. G. *Verveine*. GE. *Eisenkraut*. A. *Officinal vervain*.

QUAL. *Subinsipida*; *inodora*.

VIRT. *Leviter adstringens*.

USUS. *Ophthalmia infantum*?

VERONICA BECCABUNGA. Herba recens.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

Perennis.

OF. *Beccabunga*. G. *Véronique cressonée*. GE. *Bachbungen*. A. *Brooklime speedwell*.

QUAL. *Subinsipida*, *inodora*.

VIRT. ?

USUS. *Scorbutus*?

VERONICA OFFICINALIS.

Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; *in locis siccis, nemorosis*.

OF. *Veronica*. G. *Véronique*. GE. *Ehrenpreis*; *grundheil*. A. *Officinal speedwell*.

QUAL. *Sapor amaricans*, *substypticus*.

VIRT. *Subadstringens*; *expectorans*.

USUS *infusi* : *Tussis*; *tabes*; *morbi pectoris pituitosi*; *cachexiæ*.

VICIA FABÆ.

Flores; semen.

CL. *Diadelph. O. Decand.**Hortensis.*OF. *Faba.* GE. *Sauebohnen; welsche bohnen.* A. *Common garden bean.*QUAL. *florum recent.* Odor fragrans. — *Seminis:*
Farinacea.VIRT. *florum:* Cosmetica.USUS *farinæ seminum:* Pro cataplasmatibus emol-
lientibus.

VINCA MINOR.

Herba; folia.

CL. *Pentind. O. Monog.**Perennis.*OF. *Vinca pervinca.* GE. *Immergrün; wintergrün.*
A. *Small periwinkle.*

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Scrotum corrugans. Eundem effectum pecu-
liarem præstant *alchemilla vulgaris*, *anthemis*
pyrethrum, *hedera helix*, fotu externe adplicata.USUS *infusi:* Morbi pectoris. Forma gargaris-
matis: Cynanche.

VIOLA CANINA.

Radix.

CL. *Sing. O. Monog.**Perennis.*ANG. *Dogs violet.*

VIRT. Emetica; cathartica.

DOSIS. Scrup. j - drach. semis.

VIOLA IPECACUANHA?

Radix.

CL. & O. *præced.**Brasiliensis.*OF. *Ipecacuanha alba.*QUAL. et VIRT. Eadem ac *psycotriæ emeticæ*,
sed minus certa.

VIOLA ODORATA. Flores recentes; radix; semen.

CL. & O. *præced.* Perennis; hortensis.

OF. *Viola*; *violaria*. G. *Violette odorante*. GE. *Vio-
len*. A. *Sweet-scented violet*; *sweet violet*.

QUAL. *Florum*; Fragrans.

VIRT. *Radicis & seminis*: Emetica; diuretica.

USUS *florum*: Pro syrupo cœrulco parando.

DOS. *Radicis & seminis*: In pulvere drach. semis j.

In decocto drach. ij-iiij ad libr. j aquæ.

PRÆP. Syrupus.

VIOLA TRICOLOR. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua*; in campis et hortis.

VAR. A. *Viol. tricolor arvensis*. B. *Viol. tricolor
hortensis repens*.

OF. *Herba Trinitatis*; *Jacea*. G. *Pensée* GE. *Frey-
samkraut*. A. *Three-coloured violet*; *pansies* or
heart's-case; *three coloured garden violet*. H. *Tri-
nitaria*; *pensamientos*.

QUAL.

VIRT. Diuretica; cathartica.

USUS *pulv. vel decocti*: Crusta lactea; achores in-
fantum; tinea.

DOSIS *pulveris*: Gr. viij-xxx. In decocto drach. j-i
herbæ recentis, vel drach. semis-j herbæ siccata
ad libr. j lactis.

VISCUM ALBUM. Rami lignosi cum
foliis.

CL. Diæc. O. *Tetrand.* Fruticosa; parasitica.

OF. *Viscus quercinus*; *viscum quernum*. G. *Guy de chêne*. GE. *Mistelholz*; *vogel-leim*. A. *White or common misletoe*. H. *Visco blanco*.

QUAL. *recentis*: Odor nauseosus. *Siccatæ*: Mucilaginosæ.

VIRT. Inviscans; lubricans.

USUS. Epilepsia; chorea; convulsio? Dysenteria?

DOSIS *pulveris*: Drach. semis- $\frac{1}{2}$.

VITEX AGNUS CASTUS. Semen.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Arborea*; *Europ. austr.*

OF. *Agnus castus*. A. *Chaste-tree*.

QUAL. Odor nidorosus; sapor acris, calidus.

VIRT.?

VITIS APYRENA. Baccæ siccatæ.

N. B. *Varietas vitis viniferæ*.

OF. *Uvæ Corinthiacæ*; *passulæ minores*. G. *Raisins de Corinthe*. GE. *Korinthen*; *kleine rosinen*. A. *Currants*.

QUAL. Sapor grate dulcis, saccharinus.

VITIS VINIFERA. Baccæ recentes et siccatæ; folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa*.

OF. *Uvæ*; *uvæ passæ*; *passulæ majores*; *zibebæ*. G. *Vigne*; *raisins*; *raisins de Damas*. GE. *Weintrauben*; *zibeben*; *grosse rosinen*. A. *Common vine*; *raisins*.

QUAL. Sapor grate dulcis, acidulus. *Foliorum*: Substypticus.

VIRT. *fructus* : Nutriens ; antiseptica ; eccoprotica ;
deobstruens : *Foliorum* : Subadstringens.

USUS. Tussis ; stranguria ; icterus ; physconia abdominalis ; tabes.

PRÆP. Succus è baccis immaturis expressus, vulgo *Omphacium* (*G. verjus*).

Liquor ex uvis maturis expressione et fermentatione paratus, variæ qualitatis, vulgo *Vinum*.

Vinum Rhenanum : Acidulum.

Vinum campaniæ : Acido carbonico scatens.

Vinum album regionum australium : Alcohole fœtum.

Vinum rubrum : Alcohole et principio adstringente abundans.

Liquor ex vino, fermentatione obtentus, acidus, vulgo *Acetum*.

Liquor ex vino, destillatione obtentus, *Alcohol* ; vulgo *spiritus vini*.

Alcohol dilutum, vulgo spiritus vini tenuis. *G. eau-de-vie*. *GE. Brandwein*. *A. Brandy*.

Alcohol, vulgo spiritus vini rectificatus.

Alcohol concentratum, vulgo spiritus vini rectificatissimus.

W.

WINTERA AROMATICA.

Cortex.

CL. Polyand. O. Polyg. *Arborea* ; terræ *Magellanicae*.

OF *Cortex winteranus* ; *cortex winteri* ; *cortex magellanicus* ; *Winterania aromatica* ; *drymus granadensis* ; *drymus winteri*.

QUAL. In oleo volatili cum principio resinoso juncto residens; odor fragrans; sapor intense acris, pungens, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dysenteria; asthenia.

DOSIS *pulveris* : Gran. v-xv. In infuso vinoso drach. j-jß ad libram j. vini.

WINTERA CANELLA. (PALLAS).

N. B. CANELLA ALBA. (LINN.) Cortex interior.

CL. & O. *præced.* Arborea; Ind. occident.

OF. *Canella alba*; *winterania canella*.

QUAL. Sapor acris, subamarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS *pulver. vel infusi vinosi* : Dyspepsia; asthenia.

DOSIS *pulv.* : Gran. x. In infuso drach. j-ij ad libr. j vini.

X.

XANTHIUM STRUMARIUM. Folia recentia; semina.

CL. Monæc. O. Pentand. *Annua*; in humidis arenosis.

OF. *Xanthium*. GF. *Spitzkletten*. A. Lesser *xanthium* or burdock.

QUAL. Luteo-tinctoria; sapor amarus, subacris.

VIRT.

USUS *seminum & succi foliorum* : Scrophula; bronchocele; herpes; erysipelas.

DOSIS. Unc. semis.

Z.

ZOSTERA MARINA.

Fibræ radicis.

CL. *Gynand. O. Polyand.*

OF. *Pila marina.*

QUAI.

VIRT.

USUS *cinerum radicis ustæ* : Scrophula; bronchocele.







